

510.07

F 85

11441.11

LIBRARY OF CONGRESS




3 9153 00126116 5

Date Due

ŒUVRES
DE FERMAT.

PARIS. — IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS,
Quai des Grands-Augustins, 55.

—



Francis Bacon

Herlitz Druckerei

VARIA OPERA
MATHEMATICA
D. PETRI DE FERMAT,
SENATORIS TOLOSANI.

Accesserunt selectæ quædam ejusdem Epistolæ, vel ad ipsum à plerisque doctissimis viris Gallicè, Latinè, vel Italicè, de rebus ad Mathematicas disciplinas, aut Physicam pertinentibus scriptæ.



T O L O S Æ,

Apud JOANNEM PECH, Comitiorum Fuxenium Typographum, juxta
Collegium PP. Societatis JESU.

M. DC. LXXIX.

ŒUVRES DE FERMAT

PUBLIÉES PAR LES SOINS DE
MM. PAUL TANNERY ET CHARLES HENRY
Sous les Auspices
DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

TOME PREMIER.

ŒUVRES MATHÉMATIQUES DIVERSES. OBSERVATIONS SUR DIOPHANTE.



PARIS,
GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES
DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Quai des Grands-Augustins, 55.

M DCCC XCI

TABLE DES MATIÈRES

DU PREMIER VOLUME (3).

AVERTISSEMENT... IX

PREMIERE PARTIE.

PLAQUES MATHÉMATIQUES DIVERSES.

Lieux plans d'Apollonius.

Apollonii Pergaei libri duo de locis planis restituti. Liber primus.	V	6
Liber secundus.	V	29

Contacts sphériques.

De contactibus sphaericis.....
N. 12

Fragments géométriques.

Solutio problematis a Domino Pascal propositi	P	76
Porismata duo	P	74
Porismatum Euclideorum renovata doctrina et sub forma Isagoges recentioribus Geometris exhibita	V	76
Propositio D. de Fermat circa parabolam	V	84
Loci ad tres lineas demonstratio	M	87

Lieux plans et solides.

Ad locos planos et solidos Isagoge.....	V	91
Appendix ad Isagogen topieum, continens solutionem problematum solidorum per locos.....	V	103

⁽¹⁾ Les lettres majuscules placées devant les renvois indiquent que la pièce est tirée : A des *Farrago Opera*, D du Diophante de 1670, C des *Lettres de Descartes*, P des *Oeuvres de Pascal*, E du traité de Lalouyère sur la Cyclone, M de sources manuscrites.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages
<i>Lieu en surface.</i>	
Isagoge ad locos ad superficiem, carissimo Domino de Carcavi.....	M 111
<i>Dissertation tripartie.</i>	
De solutione problematum geometricorum per curvas simpleissimas et uniuersique problematum generi proprie convenientes, dissertation tripartita....	V 118
<i>Maxima et minima.</i>	
I. Methodus ad disquirendam maximam et minimam.....	V 133
De tangentibus linearum curvarum.....	V 134
II. Centrum gravitatis parabolici conoidis, ex eadem methodo.....	V 136
III. Ad eamdem methodum : <i>Volo medi methodo etc.</i>	V 140
IV. Methodus de maxima et minima.....	M 147
V. Ad methodum de maxima et minima appendix.....	M 153
VI. Ad eamdem methodum : <i>Doctrinam tangentium etc</i>	V 158
VII. Problema missum ad Reverendum Patrem Mersennum 10 ^e die Novembris 1642,.....	M 167
VIII. Analysis ad refractiones.....	C 170
IX. Synthesis ad refractiones	C 173
<i>Méthode d'élimination.</i>	
Novus secundarum et ulterioris ordinis radicum in Analyticis usus.....	V 181
Appendix ad superiorem methodum	V 184
<i>Problème d'Adrien Roman.</i>	
Ad Adriani Romanii problema, Viro clarissimo Christiano Huggenio P. F. S. T. M 189	
<i>Questions de Cavalieri.</i>	
Ad Bon. Cavalierii questiones responsa.....	M 195
<i>Propositions à Lalouière.</i>	
Ad Laloveram propositiones.....	L 199
<i>Dissertation M. P. E. A. S.</i>	
De linearum curvarum cum lineis rectis comparatione, dissertation geometrica.....	V 211
Appendix ad dissertationem de linearum curvarum cum lineis rectis comparatione.....	V 238
<i>Méthodes de quadrature.</i>	
De aspirationum localium transmutatione et emendatione, ad multimodam curvilinearorum inter se vel cum rectilineis comparationem, cui annexitur proportionis geometricae in quadrandis infinitis parabolis et hyperbolis usus... .	V 255
De cissoidae fragmentum	M 285

DEUXIÈME PARTIE.

OBSERVATIONS SUR DIOPHANTE.

		Pages	D
<i>Observationes Domini Petri de Fermat</i>			
I.	Ad definitionem VI Cl. Gasparis Bacheti Porismatum Libr. III.	291	
II.	Ad questionem VIII Diophanti Alexandrini Arithmeticorum Lib. II.	n	
III.	Ad question. X Lib. II.	n	
IV.	Ad question. X Libr. III.	n	292
V.	Ad question. XI Libr. III.	n	n
VI.	Ad question. XVII Libr. III.	n	n
VII.	Ad commentariorum in question. XXII Lib. III.	n	293
VIII.	Ad commentarium in question. II Libr. IV.	n	297
IX.	Ad eundem commentarium	n	298
X.	Ad commentarium in question. XI Libr. IV.	n	300
XI.	Ad question. XII Libr. IV.	n	n
XII.	Ad commentarium in eandem questionem.	n	304
XIII.	Ad question. XVII Libr. IV.	n	n
XIV.	Ad question. XVIII Libr. IV.	n	302
XV.	Ad question. XX Libr. IV.	n	n
XVI.	Ad question. XXI Libr. IV.	n	303
XVII.	Ad question. XXIII Libr. IV.	n	304
XVIII.	Ad commentarium in question. XXII Libr. IV.	n	305
XIX.	Ad question. XXXV Libr. IV.	n	306
XX.	Ad commentarium in question. XLIV Libr. IV.	n	n
XXI.	Ad commentarium in question. XLV Libr. IV.	n	307
XXII.	Ad question. III Libr. V.	n	308
XXIII.	Ad question. VIII Libr. V.	n	309
XXIV.	Ad question. IX Libr. V.	n	310
XXV.	Ad commentarium in question. XII Libr. V.	n	n
XXVI.	Ad eundem commentarium.	n	311
XXVII.	Ad commentarium in question. XIV Libr. V.	n	314
XXVIII.	Ad question. XIX Libr. V.	n	315
XXIX.	Ad question. XXIV Libr. V.	n	318
XXX.	Ad question. XXV Libr. V.	n	321
XXXI.	Ad question. XXX Libr. V.	n	326
XXXII.	Ad question. XXXI Libr. V.	n	327
XXXIII.	Ad question. XXXII Libr. V.	n	n
XXXIV.	Ad commentarium in question. III Libr. VI.	n	n
XXXV.	Ad question. VI Libr. VI.	n	329
XXXVI.	Ad question. VII Libr. VI.	n	330
XXXVII.	Ad questiones VIII et IX Libr. VI.	n	331
XXXVIII.	Ad questiones X et XI Libr. VI.	n	n
XXXIX.	Ad question. XIII Libr. VI.	n	332
XL.	Ad question. XIV Libr. VI.	n	333
XLI.	Ad questiones XV et XVII Libr. VI.	n	n

TABLE DES MATIERES.

	Pages
XLI.	D 333
XLII.	" 334
XLIII.	" 336
XLIV.	" 338
XLV.	Appendix " 340
XLVI.	Ad problema XX commentarii in ultimam questionem Arithmeticae Diophanti " 341
XLVII.	Ad commentarium in propositione IX Diophanti De multangulis numeris " 341
XLVIII.	Ad propositionem XXVII Bacheti Appendix de numeris polygonis Libr. II " 342
XLIX.	Ad propositionem XXXI Bacheti Appendix Libr. II " 342

APPENDICE.

I.	Dédicace du Diophaute de 1670 D 345
II.	Préface du Diophaute de 1670 D 347
III.	Dédicace des Varia Opera V 350
	Pièces de vers latins annexées à la dédicace :
	1 ^e <i>Aurea Pierio etc.</i> V 352
	2 ^e <i>Dum Padere fontes etc.</i> V 353
	3 ^e <i>Ode. Vnde corda maleens etc.</i> V 354
IV.	Préface des Varia Opera V 355
V.	Eloge de Monsieur de Fermat, Conseiller au Parlement de Toulouse. Du Journal des Scavans, du Lundi 9 février 1665 DV 359
VI.	Observation de Monsieur de Fermat sur Synesius DV 362
VII.	Lettre de P. Fermat à M. de Ranchin. — Observations sur Polyen. DV 366
VIII.	Lettre de Samuel Fermat à Pellisson DV 373
IX.	Lettre de P. Fermat à Boullian (24 novembre 1655). — Observations sur Frontin. (<i>Camusat</i>) 380
X.	Lettre de Huet aux Fermat. — Caen, 3 décembre 1659. M 386
XI.	Lettre de P. Fermat à Huet. — Toulouse, 27 décembre 1659. M 388
XII.	« Cede Deo, seu Christus moriens », poésie de P. Fermat dédiée à Balzae V 390
XIII.	Notes critiques de P. Fermat sur les Harmoniques de Manuel Bryenne. M 394
	Variantes et notes critiques 393
	Errata 396
	Table de concordance entre l'édition des Œuvres de Fermat de 1679 et la présente édition 397
	PLANCHES : Portrait de Fermat et fac-similé du titre des <i>Varia opera</i> IV-V
	Fac-similé de l'écriture de Fermat XIX

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME PREMIER.

AVERTISSEMENT.

I.

Bibliographie des travaux de Fermat avant les publications de son fils.

Lorsque, le 12 janvier 1665, dans le cinquième mois de sa soixante-quatrième année, Pierre de Fermat mourut à Castres, où l'avait appelé son service de conseiller au parlement de Toulouse, il était tenu pour le plus grand géomètre de l'Europe (¹), mais ce n'était guère par la voie de l'imprimerie que son nom s'était répandu dans le monde savant.

Lui-même n'avait d'ailleurs fait imprimer qu'une seule dissertation géométrique, et encore avait-il gardé l'anonyme (²); cet opuscule parut en 1660, comme annexe d'un volume publié à Toulouse, sur la cycloïde, par le Père jésuite Lalouyère. Ce dernier faisait en même temps connaître, comme étant dues à Fermat (mais publiées sans son aveu), diverses propositions intéressantes sur lesquelles l'attention n'a jamais, que nous sachions, été appelée depuis lors (³).

Dans l'éloge que Lalouyère fait à cette occasion de son illustre concitoyen, il rappelle (⁴) diverses mentions de ses travaux insérées par Mersenne dans les *Cogitata physico-mathematica* de 1644, et il cite l'une de ces mentions énumérant un certain nombre de traités manuscrits envoyés par Fermat à ses amis de Paris (⁵). Des autres, l'une (*præfat. ad Mechanica*, n° 4), sans désigner expressément Fermat, reproduisait la plus grande partie

(¹) Lettre de Pascal à Fermat, du 10 août 1660 (n° 108 de la Correspondance de Fermat, dont la publication suivra celle du présent volume).

(²) Voir ci-après page 211, note 1, et page 199, note 1.

(³) Voir ci-après pages 199 suiv.

(⁴) Voir ci-après page 200, note.

(⁵) Ce texte de Mersenne (lequel fait partie d'un *Magni Galilai et nostrorum Geometrarum Elogium utile*) est exactement le suivant :

« Taceo varios illos ἔργα τεχνῶν, de maximis et minimis, de tangentibus, de locis planis, solidis, et ad sphærām pereruditos, quos clarissimus Senator Tholosanus D. Fermatius hue

d'une lettre transmise à Cavalieri par l'intermédiaire de Mersenne (¹); la seconde (*in Ballisticis*, p. 57) donnait des détails, tirés de lettres aujourd'hui perdues, sur les travaux de Fermat relatifs aux spirales (²); la troisième enfin (*in Analysi*, page 385) précédait les énoncés des propositions des *Lieux plans d'Apollonius*, d'après la restitution du géomètre de Toulouse (³).

Dans ses Ouvrages antérieurs (depuis 1636) ou postérieurs, Mersenne a encore fait d'autres emprunts à la Correspondance de Fermat; mais alors le plus souvent il emploie des périphrases qui ne permettent pas toujours de distinguer sûrement ce qui appartient aux divers géomètres avec lesquels il était en relation. On ne pourra donc que rapprocher, des diverses lettres de Fermat, certains extraits des œuvres de Mersenne concernant les mêmes sujets (⁴).

ad nos misit. » (F. Marini Mersenni Minimi Cogitata physico-mathematica. In quibus tam naturae quam artis effectus admirandi certissimis demonstrationibus explicantur. Parisiis. sumptibus Antonii Bertier, viâ Iacobæ. M.DC.XLIV. Cum privilegio Regis. — première pagination, p. 193.)

(¹) Voir ci-après, page 195, note 1.

(²) Voir, dans le second volume, l'appendice au n° 3 de la Correspondance.

(³) Universæ Geometrie mixtaque Mathematicæ synopsis et bini refractionum demonstratarum tractatus. Studio et Operâ F. M. Mersenni M. Parisiis, apud Antonium Bertier, viâ Iacobæ, sub signo Fortune. M.DC.XLIV. Cum privilegio Regis.

En analysant la collection de Pappus, Mersenne avait déjà (p. 383) donné les énoncés du Traité des *Contactes sphériques* de Fermat (*ci-après*, pages 52 suiv.):

« Sexdecim Problematis tractatum hunc (de tactiōibus) Vieta comprehendit in Apollonio Gallo, sed cùm in planis substiterit, illum ad Sphaerica Problemata Clarissimus Fermatius 15 Problematis extendit, que Vietais subjungemus. »

Page 385, parlant des Porismes d'Euclide, Mersenne dit :

Huius autem tractatus Restitutio Clarissimi Domini Fermati postulat open, quia 2 sequentes de locis planis libros adeo fortius redintegravit. »

Les énoncés des *Lieux plans d'Apollonius* (*voir ci-après*, pages 3 suiv.) suivent sur les pages 386 à 388. Mersenne ajoute enfin :

« Omittit locos ad superficiem eius Isagogen vir idem Cl. amicis communem fecit, et alia quæ utinam ab eo tandem impetremus. »

(⁴) En dehors des citations qui précédent, Mersenne a nommé Fermat :

1^e Page 9 de la première préface de *l'Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique* (*voir* n° 4 de la Correspondance de Fermat).

2^e Dans la *Seconde partie de l'Harmonie universelle*, Paris, 1637, livre VIII, p. 61 (*voir* n° 2 de la Correspondance).

3^e Page 215 des *Novarum observationum physicoumathematicarum F. Marini Mersenni Monum* (Tomus III. Quibus accessit Aristarchus Samius de mundi systemate. Parisiis. sumptibus Antonii Bertier, viâ Iacobæ sub signo Fortune. M.DC.XLVI). Cum privilegio Regis), dans le récit d'un voyage au midi de la France.

« Cum autem vivos potius quam mortuos (^a) quererem, unus absuit Clarissimus Ferma-

^a Mersenne parlait auparavant de tenebreux qu'il avait vus à Toulouse

La plus ancienne mention imprimée d'un opuscule manuscrit de Fermat n'est, au reste, point due à Mersenne; elle concerne la *Methodus ad disquarrendam maximam et minimam* (*ci-après*, pages 133-136), et doit être cherchée dans le *Brouillon projet d'exemple d'une manière universelle du S. G. D. L. touchant la pratique du trait à preuves pour la coupe des pierres en l'Architecture*, imprimé à Paris en août 1640.

« Puisq'nun reste de page et l'occasion y convient, alin qu'après ce Brouillon il n'y ait plus en eecy d'abusez que ceux qui le voudront bien estre, on ne doit pas croire à tout esprit, n'y à toute apparence; à tout esprit, en croyant que tous ceux qui font en particulier une grande monstre de plusieurs belles pensées en soient toujours les authenrs, on void escritte à la main une belle maniere de trouver les touchantes aux courbes, ensuitte des plus grands et plus petits, laquelle est avérée estre de monsieur de Fermat, très digne conseiller de parlement de Tholozé, et la premiere descouverte de la ligne qu'engendre un point en la diametrale d'un cercle roulant sur une droite est de mousieur de Roberval, très digne professeur royal aux mathématiques (¹). A toute apparence, etc. » (*Oeuvres de Desargues réunies et analysées* par M. Poudra, Paris, Leiber, 1864, tom. I, pages 354-355.)

Cette même méthode de Fermat, sur laquelle l'attention avait d'ailleurs été appelée par le bruit d'une polémique à ce sujet entre lui et Descartes, fut exposée sous son nom par P. Hérigone en 1642 (*voir ci-après*, page 171, note 1), lequel mentionna également ses traités manuscrits des *Lieux plans d'Apollonius* et de l'*Introduction aux lieux plans et solides*.

En 1646, la réputation du conseiller au parlement de Toulouse est assez établie pour qu'un étranger, Fr. van Schooten, le cite entre Descartes et Roberval au premier rang des géomètres (²).

tius, Geometrarum Coryphaeus: quem tamen Burdigalam redux, ductore integerrimo, doctissimoque senatore, Domino d'Espagnet, velut avulsum Bergeraeo, triduo amplexus sum (^a). Vin seire quo loco? Ubi S. Emilio Brito denatus est anno 767. Ubi coemeterium templo satis amplio ex unico lapide constructo incumbit; ubi latomus quisque excisos a prædicti Domini lapidicina, quovis die, to lapides parallelogrammos excindit, et quadrat. quorum latitudo 1, longitudo 2 pedum: cùmque centum lapides quadravit, 7 libras recipit. »

(¹) L'accusation d'indélicatesse que formule ici Desargues à mots couverts paraît dirigée contre Beaugrand, lequel l'avait attaqué dans une lettre imprimée du 20 juillet 1640 (*Oeuvres de Desargues*, t. II, p. 378).

(²) Francisei à Schooten Leydensis, de Organica Conicarum Sectionum in plano Des-

(^a) Ce passage a été reproduit jusqu'à ce dernier mot parmi les mentions honorifiques de Fermat insérées par son fils en tête des *Diophante* de 1670 et des *Varia* de 1679.

On verra ci-après (page 77, note 2) en quels termes élogieux Boulliau parlait de Fermat dans ses *Exercitationes geometricæ* de 1657, à l'occasion de son opuscule manuscrit sur les Porismes d'Euclide.

La même année, les rééditeurs des *Deipnosophistes d'Athènée*, Jean-Antoine Huguetan et Marc-Antoine Ravaud à Lyon, inséraient, sous les initiales P. F. S. T., une remarque critique⁽¹⁾ qui prouvait que la sagacité du célèbre géomètre s'exerçait également avec fruit dans le domaine de l'érudition.

Mais ce fut l'année suivante que, pour la première fois, des lettres de Fermat parurent sous son nom :

1^e D'abord une série importante dans le *Commercium epistolicum de Quaestionibus quibusdam Mathematicis nuper habitum inter Nobilissimos Viros : D. Gulielmum Vice comitem BROUNCKER, Inglam; D. Kenelmum DIGBY, item Equitem Anglum; D. FERMATUM, in supra Tholosatum Curia Judicem Primarium; D. FRENCIUM, Vobilem Parisinum; una cum D. Joh. WALLIS Geomet. Prof. Oronii; D. Frane, a Schooten, Math. Prof. Lugduni Batavorum: Hisque. (Edidit JOHANNES WALLIS, S. Th. D. in celeberrima Oxoniensi Academia Geometriae Professor Savilianus. — Oxonii, Excudebat A. Lichfield, Acad. Typograph., Impensis Tho. Robinson. — M. DC. LVIII) — n°s 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 96 de la Correspondance.*

2^e Une longue lettre adressée à Gassend dans le tome VI *Petri Gassendi Opera omnia in VI Tomos divisa.* (Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson et Joan. Bapt. Devenet. M. DC. LVIII) — n° 62 de la Correspondance.

En 1658 encore, dans l'*Histoire de la Roulette* (anonyme)⁽²⁾ et en janvier 1659, dans les *Lettres de L. Dettonville, contenant quelques-unes de ses inventions de Géométrie*⁽³⁾, le nom de Fermat apparaît avec quelques indica-

criptione, Tractatus Geometris, Opticis, praesertim verò Gnomicis et Mechanicis utilis. Qui subiecta est Appendix de Cubicarum Equationum resolutione. Lugd. Batav. Ex officina Elzeviriorum A. 1656. (Reproduit comme Livre IV des *Exercitationes Mathematicæ* de 1657 : préface, page 302.)

« Aliarum autem linearum curvarum superioris generis descriptiones quod attinet, eas in medium afferre non fuit nostri instituti, cum in lucernis merito eximiis Viris, D. des Cartes, D. de Fermat, Senatori Tholosano, et D. Robervallo, Mathematum in Academia Parisiensi Regio Professori, relinquere. Qui præterea carum tangentes, quadrationes et centra invenire, quibus Geometram mirifice ditare valeant, et (meo judicio) vix lucem visura sunt, nisi Philomathematicorum precibus et persuasionibus ab iis in Reip. Literarie bonum extorquentur. »

(1) *Voir* ci-après, page 378, note 1.

(2) *Oeuvres de Pascal*, 1779, t. V, p. 165 et 179. — *Voir* au n° 29 de la Correspondance de Fermat, et ci-après, page 202, note 1.

(3) *Oeuvres de Pascal*, t. V, p. 208, dans la lettre de Carcavi à Dettonville : « On a

tions sur ses travaux, de même que dans le *Traité des ordres numériques*, trouvé en 1662 imprimé dans les papiers de Pascal, sans qu'il eût encore été publié (¹).

En 1664 enfin, Saporta insérait, dans sa traduction du *Traité de la mesure des eaux courantes de Castelli*, une Observation de Fermat sur un passage de Synesius (²).

Telles furent, du vivant de Fermat, les rares publications auxquelles donnèrent lieu ses écrits et les mentions imprimées que nous avons pu trouver de ses travaux. Après sa mort et avant les volumes édités par son fils, nous n'avons à signaler que l'*Éloge de Monsieur de Fermat* (³), inséré dans le *Journal des Savants* du 9 février 1665, et dû au moins à l'inspiration, sinon à la plume de Carcavi, et, en 1667, la publication par Clerselier du dernier volume des *Lettres de M^r Descartes*, lequel contient une importante correspondance entre Fermat, Mersenne et Descartes d'une part, Fermat, Clerselier, Rohaut et La Chambre de l'autre (⁴).

» bien envoyé celle des problèmes que vous aviez déclarés être les plus faciles, savoir :
 » le centre de gravité de la ligne courbe et la dimension des surfaces des solides, laquelle
 » M. Wren nous envoya dans ses lettres du 12 octobre et M. de Fermat aussi dans les
 » siennes, où il donne une méthode fort belle et générale pour les dimensions des surfaces
 » rondes. » — Ce travail de Fermat est perdu.

(¹) *Oeuvres de Pascal*, t. V, pages 65-67. — Voir au n° 42 de la Correspondance de Fermat.

(²) Voir ci-après, pages 362 suiv. et n° 118 de la Correspondance de Fermat (pour la dédicace de Saporta).

(³) Voir ci-après pages 359 suiv.

(⁴) N° de la Correspondance de Fermat 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 67, 86, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 112, 113, 114, 115. Voir également ci-après les deux pièces p. 170 et 173. — Les *Lettres de M. Descartes* peuvent également donner lieu à nombre d'extraits intéressants Fermat, quoique tirés de lettres qui ne lui étaient pas destinées.

II.

Le Diophante de Samuel Fermat (1670).

En 1670, Samuel Fermat fit paraître, à ses frais et sans privilège, une édition in-folio de Diophante sous le titre :

DIOPHANTII ALEXANDRINI ARITHMETICORVM LIBRI SEX,

ET DE NUMERIS MVLTANGVLIS LIBER AVVS.

CLM COMHEVTRHS C. G. BACHETI L. C.

et observationibus D. P. de FERMAT Seuatoris Tulosani.

Accessit Doctrinae Analyticae invenitum nouum, collectum

ex varijs eiusdem D. de FERMAT Epistolis.⁽¹⁾

Tolosae. Exudebat BERNARDUS BOSC, è Regione Collegij Societatis Iesu.

M.DC.LXX.

Dans cette édition, le feuillet du titre est suivi de cinq autres non paginés qui contiennent :

Pages 1 à 3, une dédicace à Colbert (*voir ci-après Appendice*, p. 345 suiv.);

Pages 4 et 5, une préface *Lectori Benevolo* (App., p. 347 suiv.);

Pages 6 à 7, l'*ÉLOGE DE MONSIEUR DE FERMAT, Conseiller au Parlement de Toulouse, Du Journal des Seavans, du Lundy 9 Février 1665* (App., p. 359 suiv.);

Page 7 (ligne 22) et page 8, *OBSERVATION DE MONSIEUR DE FERMAT sur Syncus, rapportée à la fin de la traduction du livre de la mesure des eaux courantes, de Benedetto Castelli* (App., p. 363 suiv.);

Page 9, deux extraits de Lettres de Descartes à Fermat, tirées de l'édition de Clerselier :

LETTRE DE MONSIEVR DESCARTES A MONSIEVR DE FERMAT, pag. 347, tom. 3 des Lettres de Monsieur Descartes.

AVIRE LETTRE DE MONSIEVR DESCARTES A MONSIEVR DE FERMAT, pag. 348, tom. 3 des Lettres de monsieur Descartes.

(*Voir ces lettres dans le second volume de cette édition, sous les n°s 32 et 34 de la Correspondance de Fermat*)

— Au-dessous une vignette signée *Rabault fecit* et représentant Orphée, avec l'inscription : OBLOQVITVR NUMERIS SEPTEM DISCRIMINA VOCVM.

Page 10, trois extraits sous les titres :

P. HÉRIGONE, tom. 6. *Cursus Mathematici*, p. 68. *De Maximis et Minimis* (*voir ci-après*, p. 171, note 1).

D. ISMAEL BULLIARDVS Exercitatione de Porismatibus (*voir ci-après*, p. 77, note 2).

R. P. MARINVS MERSENNS ORDINIS MINIMORVM Reflectionum Physicomathematicarum, pag. 215 (*voir plus haut*, page xi, note α).

Après ces feuillets non numérotés, viennent trois paginations différentes :

La première contient d'abord, de 1 à 36, un Traité intitulé :

DOCTRINE ANALYTICAE INVENTVM NOVVM, Collectum à R. P. Jacobo de Billy, S. I. Sacerdote, ex varijs Epistolis quas ad eum diversis temporibus misit D. P. de Fermat Senator Tolosanus.

Une traduction de ce Traité sera publiée dans un volume de *Complément* à la présente édition.

Suit, pages 37 à 64, d'après l'édition de Diophante donnée par Bachet en 1621, le Traité :

CLAVDI GASPARIS BACHETI SEBYSIANI IN DIOPHANTVM PORISMATVM LIBER PRIMVS (p. 37). **Liber Secundus** (p. 44). **Liber tertius** (p. 53).

La seconde pagination (1 à 34) reproduit l'édition de Bachet, texte grec, traduction latine et commentaires, pour les six livres des *Trithmétiques de Diophante*.

La troisième reproduit de même (pages 1 à 18) l'édition de Bachet pour le livre *Des nombres polygones de Diophante* et (pages 19 à 42) pour le Traité :

CLAVDI GASPARIS BACHETI SEBYSIANI APPENDICIS AD LIBRVM DE NUMERIS POLYGONIS LIBER PRIMVS (p. 19). **Liber Secundus** (p. 29).

Au bas de la page 42 se trouve l'annotation suivante :

« Ne vacarent paginae sequentes, placuit has Epistolas adjicere varijs referatas D. P. de FERMAT in quosdam Graecos authores obsernationibus, quarum nonnullae ad Mathematicas pertinent disciplinas. »

Suivent les deux lettres :

P. 43 à 45 : VIRO CLARISSIMO D. DE RANCHIN P. FERMAT S. P. D. (ci-après *Appendice*, p. 366 suiv.).

P. 46 à 48 : VIRO D. DE PELLISSON S. FERMAT S. P. D. (*App.*, p. 373 suiv.).

Comme reproduction de l'édition de Bachet, celle de Samuel Fermat est passablement fautive; l'intérêt qu'elle offre provient donc essentiellement des annotations que Pierre Fermat avait inscrites sur les marges d'un exemplaire aujourd'hui perdu du Diophante de Bachet, annotations que son fils a reproduites à leur place, en caractères italiques et chacune sous le titre : *OBSERVATIO D. P. F.*, la seconde seule sous celui : *OBSERVATIO DOMINI PETRI DE FERMAT.*

Ce sont ces *Observations sur Diophante* qui constituent la seconde Partie du présent volume. On leur a naturellement adjoint, sous des caractères différents, les textes auxquels elles se rapportent spécialement.

III.

L'édition des *Varia Opera* (1679)

Neuf ans plus tard, Samuel Fermat publiait des Œuvres de son père l'édition que nous désignons sous le nom de *Varia*, et dont le frontispice, ainsi que le portrait de Fermat placé en regard, se trouve reproduit en tête du présent Volume.

Cette édition a été réimprimée en 1861, par héliotype, avec l'addition au bas de la page de titre :

Novo invento usi iterum expresserunt R. Friedlaender et Filius,
BEROLINI, MDCCCLXI.

mais sans le portrait de Fermat.

La Table de concordance qui termine ce Volume donne le détail des pièces contenues dans l'édition de 1679, avec les renvois à la présente, qui pourra la remplacer absolument.

Samuel Fermat s'abstint volontairement de reproduire les lettres de son père déjà publiées par Clerselier dans la Correspondance de Descartes. Il y renvoie d'ailleurs par une note de la page 156 :

« Ceux qui ont le troisième Tome des Lettres de M. Descartes y pourront voir plus au long les objections de M. de Fermat contre la Dioptrique de M. Descartes et divers écrits sur ce sujet depuis la page 167, jusques à la page 356. »

Il reproduisit, au contraire, la plupart des lettres à Digby que Wallis avait déjà fait connaître; on ne conçoit donc guère pourquoi il a omis deux de ces lettres et une troisième à Frenicle.

Quant aux pièces inédites qu'il publiait, il ne semble avoir eu, comme originaux, qu'un nombre relativement restreint de lettres adressées à Fermat. Pour le reste, il n'a certainement possédé, en thèse générale, que des copies plus ou moins fautives, et qu'il n'obtint d'ailleurs qu'à grand'peine.

Il est difficile de croire que Carcavi, après ce qu'il avait fait insérer dans l'Éloge de Fermat du *Journal des Savants*, ait refusé à son fils les copies des pièces qu'il possédait, au moins de celles qui étaient détaillées dans l'Éloge précédent. Il n'en est pas moins certain que, s'il n'opposa pas un refus absolu, il ne donna pas copie de tous les opuscules qu'il avait entre les mains, et qu'il ne voulut rien communiquer des nombreuses lettres que Fermat lui avait personnellement adressées.

Parmi les correspondants de Fermat qui vivaient encore, lorsque son fils s'occupa de réunir ses écrits, Roberval seul paraît avoir directement répondu aux demandes de communication. Mais il choisit avec soin, pour sa plus grande gloire personnelle, ce qu'il envoyait, et, loin de fournir des copies fidèles, refondit complètement, par exemple, la lettre du 16 août 1636, autrefois écrite en son nom et en celui d'Étienne Pascal⁽¹⁾.

La plus grande partie des autres lettres publiées par S. Fermat semble provenir de copies réunies par l'érudit Thoinard qui, d'après la correspondance de Samuel et de son ami Justel, montra un louable et rare empressement.

IV.

Les autographes de Fermat.

Après la publication des *Varia*, les collectionneurs qui conservaient des pièces inédites de Fermat purent, comme Jacques Ozanam ou Auzout, en user pour leur compte particulier; mais, à part deux exceptions, rien de nouveau ne fut imprimé jusqu'en 1839.

En 1734, Camusat publia dans le Tome premier de l'*Histoire critique des Journaux par M. C***, à Amsterdam, chez J.-F. Bernard*, une lettre latine de Fermat à Ismaël Bonillau (ci-après, *Appendice*, p. 380 et suiv.).

Lors de la préparation de l'édition des *Œuvres de Blaise Pascal*, 1779,

(1) N° 8 de la Correspondance. — Un trait curieux de l'histoire des papiers de Roberval est que, parmi les écrits de lui qui ont été insérés dans les anciens *Mémoires de l'Académie des Sciences*, figure sous son nom, tome VI (pages 241 à 246 de l'édition de 1730), l'*Appendix ad Isagogen Topicam* de Fermat, déjà publiée dans les *Varia* (ci-après, p. 103 suiv.).

Bossut retrouva, dans les papiers conservés par la famille de l'auteur des *Pensées*, quelques autographes de Fermat qu'il comprit dans ce qu'il publia (¹). Depuis, ces autographes ont été perdus ou dispersés dans des collections particulières, sauf trois, qui se trouvent reliés dans un recueil des opuscules mathématiques de Pascal, conservé à la Réserve des imprimés de la Bibliothèque Nationale, sous la cote V-848-3.

D'autres originaux de lettres écrites à Mersenne étaient, avant la Révolution, conservées dans le Tome IV d'un recueil formé à la Bibliothèque des Minimes et qu'Arbogast a pu utiliser, comme on le verra plus loin.

La Bibliothèque Nationale possède seulement, comme autographes de Fermat appartenant au département des manuscrits :

1° Une lettre au Père de Billy (nº 102) dans le manuscrit fonds latin 8600, f° 13. Publiée par Libri dans le *Journal des Savants* de septembre 1839, d'après une copie d'Arbogast.

2° L'original de l'opusculle *Doctrinam tangentium* (*ci-après* p. 158 et suiv.), fonds français, nouv. acq. nº 3280, f° 112-116. Imprimé dans les *Varia* d'après une copie. — Même MS., f° 108-109, une lettre à Huet (*ci-après*, p. 386).

3° Trois lettres et un mémoire adressé au chancelier Séguier (nºs 64, 65, 66, 111) : fonds français nº 17388, f° 71; nº 17390, f° 113 à 115; nº 17398, f° 433. Publiéés, comme la lettre à Huet, par M. Charles Henry (*Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat*, 1880, p. 63 à 72 et 77).

4° Dans le manuscrit fonds grec nº 2460, les annotations sur Manuel Bryenne, dont nous devons la découverte à M. Henri Omont et qui sont publiées *ci-après*, pages 394 et suiv.

La Bibliothèque de l'Université de Leyde conserve dans la Collection Huygens nº 30 deux lettres autographes de Fermat au mathématicien hollandais. En les publiant (*Recherches*, etc., p. 77 et suiv., 211 et suiv.), M. Charles Henry a devancé la splendide édition des *Oeuvres complètes de Christiaan Huygens*, publiées par la Société hollandaise des Sciences, qui contient d'ailleurs d'autres matériaux à utiliser pour la Correspondance de Fermat (²).

(¹) *Voir ci-après*, pages 70 et 74 et en outre les n°s 69, 71, 73, 74, 100, 107 de la Correspondance. — L'autographe du n° 71 a passé à la vente Fillon le 16 février 1877. Cens de la Bibliothèque Nationale sont les originaux du n° 100 et des deux pièces imprimées dans le présent Volume, pages 70 et 74. Mais, ne les ayant déconvertis que tout récemment, nous n'avons pas les utiliser que pour les Variantes à la fin du Volume.

(²) L'une de ces lettres, concernant le problème d'Adrien Romain, est insérée dans le présent Volume, pages 189 suiv., l'autre est classée sous le n° 109 de la Correspondance de Fermat. Quant à la troisième lettre signée Fermat et publiée par M. Ch. Henry (*Recherches*, etc., p. 78-79) avec une pièce de vers en l'honneur d'Huygens, il a été reconnu

ermet



112

Doctrinam tangentium auctoritatem tradita metatur
de intentione maxima et minima cuius beneficis
ablimantur questiones omnes dioritica. Et famosa illa
proclama quae apud Pappum in prefatione lib. 7.
difficilis ablimantur, salve dicuntur faciliter
ablimantur.

Sicut curva in quibus tangens inveniuntur, proprietas
~~curvorum~~ proprietas vel p[ro]p[ri]etatis tantum illa ablimatur
vel curva; sed aut alijs curvis quoniam obilit[er]
implicata.

Vridi cajui iam ~~per~~ statutum est frangto quod qui
conatus nuntiavit officio suu[m]o, sed famam tandem
intervenit est.

Considemus nunc in p[ro]p[ri]etate eiusdem curva
illia sua positione data. Quarecumq[ue] diametro
solidat actione applicata resupinetur. Dicitur; iam
inveniatur tangenter sufficiens ad datum in curva
punctum: proprietas h[ab]entiam curva. non in curva
amplius. Id in invenienda tangentem vel actione qualitatibus
confidemus. Et Eli[as] (quae monit doctrina de maxima
et minima homogeneis) est dicens et qualitas qua
tumque concordis tangentis cum diametro illudatur.
Id est ipsa tangenter.

Exempli quae olim multipliciter addidit addatur si
plant tangentis afferat cuius situs fideliter invenitur;

figatur
xt.

Nous donnons ci-contre un *fac-similé* de la première page de l'écrit *Doctrinam tangentium etc.* Il pourra servir au besoin à reconnaître l'écriture de Fermat. S'il est difficile d'espérer actuellement la déconversion de lettres ou d'opuscules autographes, l'impossibilité n'en est nullement démontrée; mais il est un autre ordre de recherches sur lequel nous appelons l'attention des érudits.

Fermat, qui n'avait point de cahiers de notes et ne conservait pas de manuscrits, inscrivait des remarques sur les marges des livres qui lui appartenaient, et il devait le faire, quelle que fût la nature de ses livres. Or il est difficile de croire qu'il y ait eu destruction complète de tous les Ouvrages qui ont fait partie de la bibliothèque d'un homme qui n'était pas seulement un mathématicien de premier ordre, mais qui s'intéressait à toutes les questions scientifiques et qui était un humaniste très distingué. Il semble donc que l'examen de l'écriture des notes inscrites sur les exemplaires des Ouvrages du temps pourrait amener la constatation de leur passage entre les mains de Fermat et conduire à des décovertes intéressantes⁽¹⁾.

Il est à remarquer que les recherches faites dans ce sens à Toulouse n'ont amené que la déconversion, par Libri, à la Bibliothèque de la Ville, d'un exemplaire de la première édition du *Dialogue de Galilée des Massimi Sistemi*⁽²⁾. Sur le premier feuillet de garde est écrite (au-dessus d'une note de Carey : « Ce billet est de Monsieur de Fermat, Conseiller au Parlement, qui m'a fait présent de ce livre ») la dédicace suivante :

« Peut-être croirés-vous que pour me mettre en réputation et *per purgar.*
» comme on dit, *la mala fama*, je pretens m'eriger en donneur de livres,

par M. P. Tannery qu'elle ne pouvait avoir été écrite que par Samuel de Fermat: le savant éditeur des Œuvres de Huygens, M. Bierens de Haan, a constaté sur l'autographe la vérité de nos conjectures.

(1) Rappelons à ce sujet que des recherches méthodiques de ce genre, instituées en Italie, par les soins de M. Favaro, ont abouti pour la publication des *Œuvres de Galilée* à des résultats précieux. Si le défaut d'un point de départ, comme était le catalogue de la bibliothèque de Galilée, retrouvé par le savant professeur de l'Université de Padoue, nous a empêchés d'entreprendre de pareilles recherches pour Fermat, nous n'en espérons pas moins que notre appel sera entendu. Nous accueillerons avec reconnaissance toutes les communications qui nous seraient faites à ce sujet et nous pourrons les publier dans un volume complémentaire à la présente édition.

(2) Dialogo di Galileo Galilei, Linceo matematico sopraordinario dello studio di Pisa, e filosofo, e matematico primario del Serenissimo Gr. Duca di Toscana. Dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due Massimi sistemi del Mondo Tolemaico, e Copernicano. Con privilegi. In Fiorenza, par Gio. Batista Landini, MDCCXXII. Con Licenza de Superiori (Bibl. de Toulouse ¹⁸³E nouv. classement; ancien n° 2217).

« Vous en croirés ce qu'il vous plaira, mais si c'estoit par hasard vostre
 « pensee, apprenés donc, Monsieur, que vous n'avés pas touché au but. Je
 « ne songe, en vous offrant les Dialogues italiens du Système de Galilée, qu'à
 « faire une action de justice et à vous rendre maistre de l'ouvrage d'un auteur
 « qui ne passeroit, s'il vivoit, que pour vostre disciple (¹). Recevés donc ce
 « présent comme vous estant deu, et ne me considerés point en ce rencontre
 « comme un adroit negotiateur, mais comme un bon juge qui rejette comme
 « une tentation l'idée de vostre grande et fameuse bibliothèque et ne se sou-
 « vient que de la passion qu'il a d'estre tout à Vous. »

V.

Le premier projet d'édition complète et les papiers de Libri.

A défaut des autographes de Fermat, on possède diverses copies, plus ou moins anciennes, de pièces ou de lettres soit déjà publiées, soit inédites.

L'attention fut pour la première fois appelée sur ces copies, lorsque Libri, dans un article du *Journal des Savants* de septembre 1839, annonça qu'il venait d'acquérir d'un libraire de Metz, par l'intermédiaire du capitaine d'artillerie (depuis général) Didion, un lot de manuscrits provenant de la bibliothèque de François et ayant antérieurement appartenu à Arbogast. D'après les détails qu'il donnait sur le contenu de ces manuscrits, en particulier sur les matériaux inédits réunis et copiés par Arbogast, d'après ce qu'un article subséquent (*Journal des Savants*, mai 1841) révéla sur les conditions défécunées dans lesquelles s'était faite l'édition de 1679, aucun assentiment ne pouvait être refusé à l'idée de réunir, dans une publication d'ensemble, les œuvres déjà imprimées ou encore inédites du grand géomètre de Toulouse. Villemain, alors Ministre de l'Instruction publique, prit l'initiative d'un projet de loi, présenté le 28 avril 1843, pour faire cette publication aux frais de l'Etat. Lorsque ce projet fut été consacré par le vote des deux Chambres, Libri fut naturellement chargé, en 1844, de diriger la nouvelle édition, et on lui adjoignit un jeune mathématicien, Despeyrous (mort, le 6 août 1883, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse). La collaboration n'aboutit

(¹) Pour comprendre ce singulier éloge, il faut savoir que, quoique Carcavi n'eût rien publié sur la matière, il n'en avait pas moins profondément spéculé sur les systèmes astronomiques. Son action en faveur de la conception de Copernic, pour prudente qu'elle ait été, fut certainement très efficace dans le milieu scientifique où il vivait à Paris. Le langage de Fermat atteste, d'ailleurs, que les idées de son ami étaient indépendantes de celles de Galilée.

guère qu'à un résultat (*Journal des Savants*, novembre 1845), une mission de Despeyrous pour recherches à Vienne, Libri ayant constamment refusé de lui donner communication des pièces inédites qu'il avait entre les mains, et prétextant d'un autre côté de nombreuses occupations comme motifs de retards dans l'accomplissement de la tâche qu'il prétendait se réservier. Le 6 juin 1846, une lettre du Ministre de l'Instruction publique, alors Salvandy, le relevait de cette tâche; bientôt après commençait, sur les détournements de livres et de manuscrits dont on le soupçonnait, la longue enquête secrète qui devait aboutir, le 4 février 1848, au dépôt du rapport du juge d'instruction Boucley.

Immédiatement après la révolution de 1848, Libri quittait la France et emportait dix-huit caisses de livres et manuscrits; les papiers qui purent être saisis à son domicile échurent à la Bibliothèque Nationale, où tous ceux qui concernaient Fermat furent réunis dans le manuscrit fonds français, nouv. acq., n° 3280; la publication projetée fut abandonnée et l'idée n'en devait pas être reprise avant trente ans.

En 1879, à la suite d'études entreprises à Paris et d'enquêtes dans les principales bibliothèques de l'Europe, M. Charles Henry publia dans le *Bulletin Boncompagni* un travail que nous avons déjà eu l'occasion de citer d'après le tirage à part :

Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat, suivies de fragments inédits de Bachet et de Malebranche, par Charles Henry. — Extrait du Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, Tome VII, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 1879. — Rome, imprimerie des Sciences mathématiques et physiques, Via Lata, n° 3, 1880. — (216 pages gr. in-4^e.)

A la suite de cette publication, le prince Baldassare Boncompagni fit connaître, dans une lettre adressée, le 27 mai 1881, à M. Charles Henry, qu'il avait acquis deux manuscrits renfermant les pièces inédites énumérées par Libri en 1839 et qu'il était disposé à les communiquer aux savants qui voudraient entreprendre une nouvelle édition des Œuvres de Fermat. Ces deux manuscrits, qui seront minutieusement décrits plus loin, comme étant une des bases essentielles de notre travail, furent dès lors reconnus comme ayant effectivement été possédés par Libri et comme correspondant à ce qu'il avait signalé de plus important dans son acquisition de Metz. Mais Libri n'ayant jamais fait connaître exactement quelles pièces de Fermat il avait entre les mains, ayant d'autre part inséré dans le *Catalogue of the Manuscripts at Ashburnham-place* des mentions qui pouvaient faire croire à l'existence, dans le fonds cédé par lui au célèbre collectionneur anglais, de très nombreuses

pièces intéressant la publication projetée à nouveau, il était essentiel de vérifier ce qui en était.

Cette vérification ne put être faite avant l'acquisition, par la Bibliothèque Nationale, du fonds Libri de la collection Ashburnham. Elle a en grande partie déçu les espérances que l'on avait pu concevoir⁽¹⁾; on n'a retrouvé, sous le n° 1858 de Libri⁽²⁾, qu'une seule chemise de pièces provenant de Fermat. Le dépouillement de ces pièces, que, grâce à l'obligeance de M. Léopold Delisle, nous avons pu faire dès le commencement de l'année 1888 et avant le classement nouveau, nous a fait reconnaître :

1^e Une seule pièce non connue d'ailleurs (*voir ci-après*, page 87, note 1), sur le lieu à trois lignes;

2^e D'anciennes copies de l'*Art locos planos et solidos isagoge*, avec l'*Appendix* (page 91, note 1) de la *Methodus ad disquirendam maximam et minimam* (page 133) et du *Novus secundarum et ulterioris ordinis radicum in analyticis usus* (page 181), opuscules déjà imprimés dans les *Faria Opera*:

3^e Une copie d'une lettre de Fermat à Carcavi, laquelle se trouve plus complète dans le manuscrit de la Nationale, fonds latin 11196, n° 68 de la Correspondance. -- (Publiée par M. Ch. Henry, *Recherches*, etc., pages 193 à 195.)

Des anciennes copies, celle de l'*Isagoge* est d'ailleurs seule à offrir un véritable intérêt.

VI.

Le manuscrit Arbogast-Boncompagni.

Parmi les autres sources manuscrites qui ont été utilisées pour cette édition, nous devons signaler, en premier lieu, les deux volumes très importants appartenant au prince Baldassare Boncompagni, à Rome, lequel les a généreusement mis à notre disposition.

Le premier de ces manuscrits, que nous désignerons par la lettre A, est un volume haut de 27^{cm}, large de 21^{cm}, comportant une reliure italienne récente en basane blanche décorée de filets d'or, laquelle présente au dos une

⁽¹⁾ Notamment le n° 1893 du Catalogue précité n'a pas été retrouvé; Libri ne paraît pas l'avoir livré à lord Ashburnham; dans le n° 1860, malgré les indications du même catalogue, rien de Fermat n'a été trouvé.

⁽²⁾ Ce numéro était représenté par trois portefeuilles où étaient classées des feuilles séparées. Les pièces sont aujourd'hui réparties entre les manuscrits : fonds latin, nouv. acq. 2339, 2340, 2341; fonds français, nouv. acq. 3173, 3176. Celles relatives à Fermat se trouvent dans le premier de ces cinq manuscrits.

vitole imprimée : *Fermat, Opuscules et lettres*. Outre deux feuillets de garde (en tête et à la fin), on compte, dans ce volume, 83 feuillets numérotés au crayon de 1 à 82 (le n° 50 manquant, et, deux feuillets étant numérotés : 12 bis et 13 bis, ainsi que le mentionne, au reste, une annotation au crayon sur le second feuillet de garde). Ce numérotage au crayon a été fait dans la bibliothèque du prince Boncompagni.

Sur le feuillet 1 est écrit de la main de Libri :

Lettres de Fermat | par ordre | comme dans la liste de dé (sic) Arbogast | plus la lettre au père Billy et celle à Carcavi. | Plus une copie de la lettre imprimée (anonyme) de Frenicle [corrigé de « Fermat »] à Digby | où il est fait mention d'un | autre écrit imprimé précédemment (1657) | par Frenicle [corrigé de « Fermat »].

Puis, de la même main, mais d'une écriture plus récente, de même que les corrections indiquées ci-dessus :

(Voyez *Comm. ep. de Wallis.*)

En haut de la page est la signature « E. Lepelle de Bois-Gallais », et sur tous les feuillets suivants le visa correspondant : E. L. B. G.; ce qui permet d'établir que l'ensemble a été vendu, à Londres, par Libri en pièces détachées. Le prince Boncompagni l'a acquis, déjà relié, du comte Giacomo Manzoni, le 17 janvier 1876.

F° 2 commence (fini f° 5) de la main d'Arbogast, qui remplit tout le reste du volume, l'*Indication des opuscules mathématiques et lettres de Fermat qui se trouvent en manuscrit dans le Tom. IV des lettres écrites au P. Hervenne par des savans conservé à la Bibliothèque des ci-devant Minimes à Paris* (¹).

(¹) Nous reproduisons cette liste, qui a été déjà publiée, avec quelques incorrections, par Libri dans le *Journal des Savants* de septembre 1839. On remarquera qu'elle comporte 14 numéros pour les opuscules et 20 pour les lettres, en dehors de quelques pièces ne concernant pas Fermat.

« N° 1. Le traité des contacts sphériques, en latin, sans titre, 31 pages in-folio, très belle écriture, peu serrée, et les figures faites en grand. Cette copie (²) ne diffère pas de l'opuscule imprimé dans les *Opera Varia* en 1679. Il y a sur la première page : *Opus D. de Fermat.*

N° 2. *Iugoge ad locos ad superficiem*, en latin, in-4°, 17 pages : belle copie et très lisible.

Cet opuscule, duquel Fermat faisait beaucoup de eas, n'a jamais été imprimé.

N° 3. *Ad methodum de maximis et minimis appendix*. Commence par ces mots : *Qua plerunque in progressu questionum occurunt asymmetriae, etc., et finit par ceux-ci : et*

(²) « Cette copie » a été corrigé de « Cet opuscule ».

C'est ce que Libri appelle *la liste d'Erbogast*, et l'on trouve effectivement, à la suite et par ordre, les 20 lettres de cette liste, toutes inédites, qui occupent les feuillets 6 à 41 du manuscrit.

ipso tangentes indigeant; 3 pag. in-folio; copie d'une main inconnue. Cet opuscule n'a pas (^a) été imprimé.

N° 4. Opuscule sur la méthode des tangentes, commencée par ces mots : *Doctrinum tangentium antecedit jamdudum habita methodus de inventione maximae, etc.*, et finit par ceux-ci : *fusius aliquando expletibimus et demonstrabimus*; 14 pag. in-folio, belle copie. écriture peu serrée. Cet opuscule a été imprimé dans les *Opera Varia*.

N° 5. *Id methodum de maximis et minimis appendix;* 4 pages $\frac{1}{2}$ in-4^e, écriture de Fermat. C'est le même opuscule que n° 3.

Suivent 10 pages in-folio, écriture de Mersenne, très serrée, souvent difficile à lire. Ces pages contiennent de suite (^b), savoir :

N° 6. *De maximis et minimis*, par Fermat, commencée par ces mots : *Outre le papier envoyé à R. et P., pour suppléer, etc.*; $\frac{1}{2}$ pag. in-folio, dont nous n'avons pu lire les trois dernières lignes (inédit); il paraît que c'est l'extrait d'une lettre à Mersenne.

N° 7. *Méthode des maximis expliquée et envoyée par M. F. à (c) M. des C.*, commencée par ces mots : *La méthode générale pour trouver les tangentes, etc.*, et finit par ceux-ci : *aux cônes de même base et de même hauteur*; 3 pag. in-folio (inédit).

N° 8. Extrait d'une lettre de M. Fermat. Commencée par ces mots : *N'importe de dire qu'il faut faire deux opérations*. Cette lettre, dont on trouve (^d) plus bas le commencement de l'original, relate sur la méthode des tangentes, en réponse (^e) aux objections de Descartes (^f).

Le commencement de la lettre manque dans cet extrait, mais il y a (^g) 2 lignes $\frac{1}{2}$ de plus à la fin (^h) que dans le fragment original, qui finissent par ces mots : *Je crois qu'il y trouvera plus de facilité qu'en la siennne.* $\frac{1}{2}$ pag. in-folio (inédit).

N° 9. *Appendix ad Isagogeum topicam continens solutiones problematum solidorum per locos*, commencée par ces mots : *Patuit methodus, etc.*, et finit par ceux-ci : *per rectas et circulos expedire*; 2 pag. in-folio (imprimé dans les *Opera Varia*).

N° 10. Opuscule sur la méthode des tangentes, commencée par ces mots : *Doctrinam tangentium antecedit, etc.*; le même que n° 4. 2 pag. $\frac{1}{2}$ in-folio (imprimé).

N° 11. *Des nombres des parties aliquotes de F.* Commencée ainsi : *Propos. (i).* Tout nombre impair non carré est différent d'un carré, etc., et finit par ces mots : *sont beaucoup éloignez l'un de l'autre*; $\frac{3}{4}$ pag. in-folio (inédit); remarquable par la méthode qui s'y trouve pour (^j) trouver les nombres premiers. Il paraît que cette pièce est l'extrait d'une lettre de Fermat à Mersenne ou à Frenicle.

N° 12. *Pour les nombres premiers de M. Fermat, à Fren.*, commencée par ces mots : *Soit*

^a Le mot *encore* a été rayé après *pas*.

^b Ces mots *de suite* ont été ajoutés en interligne.

^c Avant « *M. F. à* », sont les mots rayés « *Fermat à* ».

^d Après le mot *trouvez*, est écrit, puis rayé, « *le com* ».

^e Après le mot *réponse*, est écrit, puis rayé, « *à D.* ».

^f La phrase suivante commence par les mots *Ici manque*, rayés.

^g Le mot *dans* a été rayé devant le chiffre.

^h Les mots *à la fin* sont ajoutés en marge.

ⁱ Ce mot *Propos* avait d'abord été écrit après « *de F.* ». Il y est rayé.

^j Ce mot *pour* est déjà écrit, puis rayé, après *méthode*.

La lettre à Billy annoncée par Libri ne se trouve, au contraire, qu'à la fin du volume (f° 82), copiée par Arbogast avec ce titre :

Lettre de Fermat au P. Billy. Se trouve aux manuscrits de la Bibliothèque Nationale à Paris, n° 8600; c'est la seule lettre de Fermat qui soit dans ce recueil de lettres adressées au P. Billy.

F° 45-48 on trouve, au contraire, l'*Extrait d'une lettre de Fermat à Car-*

par exemple la progression double, etc., finit par ceux-ci : peine à me dédire : $\frac{1}{2}$ pag. in-fol. (inédit) Il paraît que c'est l'extrait d'une lettre de Fermat à Frenicle.

On trouve présentement sur deux demi-feuilles séparées, pliées chacune in-4°, écriture de Mersenne, serrée, souvent difficile à lire, savoir :

N° 13. Exposition détaillée et (^a) démonstration de la méthode des *minimis* et *maximis*, avec la manière dont l'Auteur y est parvenu. Cette (^b) opuscule est sans titre. Son commencement est : *Dou s̄y nciseos et austrophes Vietue methodum expenderem, etc.*, il finit par ces (^c) mots : *summa trium harum (^d) rectarum sit minima quantitas*; 4 pages in-4°. Cette pièce, une des plus importantes des œuvres de Fermat (^e), n'a jamais été imprimée.

N° 14. *Id methodum de minimis et maximis appendix.* C'est la même pièce que n° 3 et 3. Elle est ici sur 3 pages in-4°.

Suivent les lettres originaires de Fermat, savoir (toutes ces lettres sont *inédites*) (^f) :

1^e lettre à Mersenne, en latin, sans date, *Reverende pater, quamvis id agam ut pro OEdipo domum (^g) restituam, etc.*, 4 pages in-folio, écriture de Fermat.

2^e lettre à Mersenne, Tolose, 26 avril 1636; 2 pages in-folio, écriture de Fermat.

3^e lettre à Mersenne, Tolose, 25 décembre 1640; 5 pages in-4°, écriture de Fermat

4^e lettre à Mersenne, du 15 juin 1641; 1 $\frac{1}{2}$ pages in-4°, écriture de Fermat.

5^e lettre à Mersenne, Tolose, 13 janv. 1643; 2 pages in-4°, écriture de Fermat.

6^e lettre à Mersenne, Tolose, 16 févr. 1643; 2 pages in-4°, écriture de Fermat.

7^e lettre à Mersenne, Tolose, 7 avril 1643; 3 pages in-4°, écriture de Fermat.

8^e lettre à Mersenne, Tolose, 10 août 1638; 2 pages in-4°.

9^e lettre à, *Copie de la lettre de M. Fermat, du 26 décembre 1638.* Commence ainsi : 1^e Pour les nombres, je peu trouver par ma méthode, etc., et finit par : *de Géométrie qui vallent celle-ci*; écriture de Mersenne. 1 $\frac{1}{2}$ page in-4°. Cette copie, ou cet extrait de la lettre de Fermat faite par Mersenne, est écrite sur ce qui restait de blanc à la lettre précédent. L'écriture est difficile à lire.

10^e pièce ou lettre, sans inscription, commence par ces mots : *Dudum est ex quo ad*

(^a) Le mot *la* a été rayé après *et*.

(^b) Arbogast avait d'abord voulu écrire *Cette pièce*. Les trois premières lettres du mot *pièce* se trouvent, en effet, rayées après *Cette*, qui n'a pas été corrigé.

(^c) Le mot *ceux*, rayé, precede *ces*.

(^d) Le mot *harum* est déjà écrit, puis rayé, avant *trium*.

(^e) Les mots de *Fermat* sont écrits en interligne à la place des mots *du recueil*, qui sont rayés.

(^f) Les mots entre parenthèses ont été ajoutés après coup. Arbogast avait d'abord écrit « (*in dit*) » après la notice des lettres 1, 2, 3, à la fin pour la première, avant « *écriture de Fermat* » pour les deux autres. Il a rayé ensuite ces mentions.

(^g) *Lisez Davant.*

cav. — d'après la copie de Bouillaud, conservée dans les Manuscrits de Bouillaud, Lettres de différentes personnes Bibliothèque nationale.

La chemise de cette lettre avec le titre *Lettre à Carcavi* de la main de Libri est actuellement le f° 95 du manuscrit de la Nationale : *Fonds français n° 3280 nouv. acq.* (voir plus haut, page xvi) que nous désignerons par la lettre A₁.

Eutin la copie par Arbogast de la lettre imprimée de Frenicle manque, de même, dans le manuscrit A et occupe les folios 96-98 de A₁.

Au folio 49 de A, qui est une chemise portant le titre : *Isagogē ad locos ad superficiem*, Libri a écrit au-dessous de cette mention :

Opuscules mathématiques de Fermat inédits. Ce sont les n°s 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13 de la liste d'Arbogast.

Le n° 10 est ajouté, au crayon bleu, à cette nomenclature.

On trouve, en effet, dans leur ordre régulier, les opuscules en question sur les f° 51 à 81 du manuscrit dont le contenu se trouve ainsi épuisé.

Il convient de remarquer que le n° 10 n'est nullement inédit. Libri n'avait pas en primitivement l'intention de le comprendre dans le recueil devenu aujourd'hui la propriété du prince Boncompagni; c'est même certainement

similitudinem parabolæ, etc.; et finit par ceux-ci : ex animo rogamus; 3 $\frac{1}{2}$ pages in-4^e. écriture de Fermat (inédite). Il paraît que c'est une réponse de Fermat à des questions faites par Cavalieri, et qu'il a (^a) envoyé cette réponse à Mersenne, pour la faire parvenir soit à Cavalieri, soit à Torieelli (^b).

11. Fragment de (^c) lettre à Mersenne; commencé ainsi : *J'avois déjà fait un mot d'écrit pour m'expliquer, etc., finit par ces mots : habeat minimum proportionem, datatur;* 2 pages in-4^e, sans date (c'est le commencement de la lettre dont le n° 8 est un extrait; cet extrait, sans contenir le commencement, a 2 $\frac{1}{2}$ lignes de plus à la fin), écriture de Fermat.

12. *Invenire cylindram marini ambitus in data sphera.* Cette solution géométrique est sans figure, sur 2 pages in-4^e, écriture de Fermat, elle (^d) appartient à la lettre suivante.

13. Lettre à Mersenne, du 10 nov. 1642 : 1 $\frac{1}{2}$ page in-4^e, écriture de Fermat (^e).

14^e Lettre à Mersenne, Tolose, 1 sept. 1643 : 2 pages in-4^e, écriture de Fermat.

15. Fragment final d'une lettre à Mersenne, Tolose, 15 juillet 1636 : 1 $\frac{1}{2}$ pages in-4^e; écriture de Fermat.

Il se trouve sur 1 page in-4^e une lettre de Picot à Mersenne, sans date, qui contient

^a Le mot *acq.* est en interligne.

^b Arbogast ayant ajouté la mention : *Écriture de L.*, qu'il a rayée.

^c Ce mots fragment de sont ajoutés en interligne.

^d Le mot *parrot* est rayé après *elle*.

^e Libri a ajouté en marge : *verso v.*

par négligé qu'il l'a emporté à Londres en 1648, tandis qu'il faisait à Paris des pièces qu'il aurait voulu, au contraire, conserver pour ce recueil.

Des opuscles inédits de la liste d'Arbogast, les n°s 6, 7, 11, 12, qui sont en français, figureront dans la Correspondance de Fermat sous les n°s 26, 31, 37, 43. Les autres se trouvent dans le présent Volume.

Quant aux 20 lettres inédites, les n°s 10 et 12 sont insérés ci-après, pages 195 et 167; pour les autres, la correspondance sera la suivante avec notre édition :

N°s de la liste d'Arbogast. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20

N°s de la Correspondance
de Fermat. 12 1 15 47 52 55 56 33 36 30 51 60 6 54 46 98 59 35

VII.

Le manuscrit Vicq-d'Azyr-Boncompagni.

Nous désignerons par la lettre B le second manuscrit que le prince Boncompagni a bien voulu nous communiquer et qu'il a acquis dans les mêmes conditions que le précédent.

la solution de Descartes touchant le centre de percussion. Cette solution est imprimée dans les lettres de Descartes.

16^e lettre à Mersenne, sans date, commencée ainsi : *Je vous rends mille grâces, etc.*, 2 pag. in-4^o, écriture de Fermat.

17^e lettre à Mersenne, Tolose, 26 mars 1641; 1 $\frac{1}{4}$ page in-4^o, écriture de Fermat (^a).

18^e lettre à Mersenne, sans date, commencée ainsi : *J'ai appris par votre lettre que ma réplique à M. Descartes, etc.; 2 $\frac{1}{3}$ pages in-4^o, écriture de Fermat.*

19^e lettre à Mersenne, sans date, commencée par ces mots : *Tous m'écrivez que la proposition de mes questions impossibles, etc.; 3 pag. in-4^o, écriture de Fermat.*

Il se trouve un mémoire latin sur la métallurgie et la docimasie.

20^e lettre à Mersenne, 22 oct. 1638; 9 pages in-4^o, écriture de Fermat; le commencement, qui traite d'affaires particulières, manque; importante (^b).

Fin.

N^a. — A la suite des lettres de Fermat se trouvent 168 pages in-4^o de lettres de Lehenneur à Mersenne; elles roulent particulièrement sur les objections de Fabry et de Cazré

(^a) Libri a ajouté en marge, puis rayé : *avec n° 4*

(^b) Le mot *Cette* se trouve écrit, puis rayé, avant *importante*

C'est un Volume haut de 29^{cm}, large de 21^{cm}.5, relié en peau de porc et portant au dos l'inscription :


Copie | de lettres | de | Fermat | de | Descartes | et Traduction | d'un Discours | de | Galilée.

Sur le plat de la couverture est au milieu le chiffre 1, en haut, à gauche, le chiffre 4. Ces deux mêmes chiffres sont reproduits au milieu du premier feuillet (de garde).

Lorsque le Volume s'est trouvé entre nos mains, nous avons également reconnu, sur le même plat, quelques traces de lettres effacées. L'emploi du tannin nous a permis de revivisier, en haut, l'inscription « *Le Citoyen*

contre les démonstrations de Galilée sur la descente des graves; quelques observations sur la dispute entre Roberval et Descartes. Letemneur marque qu'il est allé voir de Beaune à Blois et que *superat presentia famam*; il fait le récit de l'entretien qu'il eut avec lui, quoiqu'il fût très malade, et qu'on lui eût coupé le pied, il communique à Mersenne le problème suivant qui venait de lui être proposé, et dont il n'avait pu encore trouver la solution.

Un cercle étant donné comme BCD, et une ligne FG dehors, tirer de ses extrémités F,



G deux lignes droites à la circonference convexe ou concave comme en F ou en G, dont l'angle soit coupé en deux parties égales par le diamètre.

Ces lettres contiennent peu de choses intéressantes; on peut en tirer quelques traits ou quelques anecdotes concernant l'histoire des sciences. On y voit, par exemple, que le jeune Huygens avait fait un écrit ayant ou en 1647 pour défendre et démontrer, à sa manière, les propositions de Galilée sur la descente des graves.

Toutes ces lettres sont de 1647 et 1648.

Avant les lettres de Fermat, on trouve à la tête de (^a) ce volume une longue lettre de Tho. Hobbes à Mersenne, du (^b) 5 nov. 1640, en 56 pages in-folio. »

^a. Les mots à la tête de sont une correction du mot dans
Le mot *dans* est ajouté en interligne.

Mauduyt » d'une écriture passablement fine et, vers le milieu, la note suivante :

N. B. à ventose
Ce volume faisait
partie du paquet de
papiers trouvés chez
Vieq d'Azir, après sa
mort, et renvoyés à la
Bibliothèque de la
ci-devant Académie
des Sciences comme
lui appartenant.

Cette note, qui est de la main facilement reconnaissable d'Arbogast, n'avait pas été écrite directement sur la couverture, mais bien sur un carré de papier collé dessus. Ce carré de papier a probablement été enlevé par Libri, entre les mains duquel le Volume est passé, comme le prouvent surabondamment les annotations qu'il y a inscrites en marge des lettres de Descartes.

Quoique ce Volume soit passé entre les mains d'Arbogast, il ne l'a pas utilisé pour ses copies, comme le montre la collation des pièces identiques de A et de B.

Ce dernier manuscrit comprend 118 feuillets numérotés (au crayon), mais c'est en réalité un recueil factice et nous n'avons à décrire que la partie qui concerne Fermat et qui vient en tête.

Cette partie comprend trois cahiers, le premier de 8 feuillets, le deuxième et le troisième de 12; les trois derniers feuillets sont entièrement blancs.

Le n° 2 inserit au bas de la première page du premier cahier et la forme du début, sans titre et tout au haut de la page, prouvent l'existence antérieure d'un autre cahier précédent, qui est aujourd'hui perdu. Toutefois les traces d'encre qui se sont produites, au moment de la reliure, sur le feillet de garde et le revers de la couverture, montrent que la perte a précédé la formation du recueil factice.

L'écriture est du dix-septième siècle, serrée et peu lisible.

Voici le détail des pièces contenues dans ce manuscrit; les unes sont des extraits de lettres déjà imprimées dans les *Varia*; d'autres sont des copies de lettres figurant dans la liste d'Arbogast; quelques-unes enfin ne sont pas connues d'ailleurs.

1. F° 2^o. Extrait d'une lettre du III^{me} no^{bre} 1636 à M. de Roberval pour la quadrature de la parabole (*Varia*) = n° 13 de la Correspondance de Fermat.
2. F° 2^o. Extrait d'autre lettre du même du 4 juin 1648 au R. P. M. = n° 63.
3. F° 2^o. Extrait d'autre lettre du XX^{me} fevrier 1639 au R. P. M. = n° 37.

1. F^e 3^e. Extrait d'autre lettre du 1^{er} avril 1640 au R. P. M. (en partie dans les *Faria*). = n° 38.
2. F^e 5^e. Autre lettre au R. P. M. (*Faria*) = n° 49.
3. F^e 6^e. Autre lettre au même = n° 39.
4. F^e 7^e. Extrait d'autre lettre du 18^e octobre 1640 à M. F. (*Faria*) = n° 43.
5. F^e 8^e. Extrait d'autre lettre (*Faria*) = n° 42.
6. F^e 9^e. Extrait d'une lettre du 31 may 1643 à M. D. F. = n° 38.
7. F^e 10^e. Copie de lettre du 29^{me} octobre 1638 (2^e lettre de la liste d'Arbogast) = n° 35.
8. F^e 11^e. Epistola D^{me} de Fermat ad R. P. Mersennum (Arbogast, 1^e lettre) = n° 12.
9. F^e 14^e. (Arbogast, 16^e lettre) = n° 34.
10. F^e 15^e. (Arbogast, 1^e lettre) = n° 47.
11. F^e 15^e. (Arbogast, 2^e lettre) = n° 4.
12. F^e 17^e. (Arbogast, 3^e lettre) = n° 31.
13. F^e 17^e. (Arbogast, 1^e lettre), *ci-après*, page 167.
14. F^e 18^e. (Arbogast, 10^e lettre), *ci-après*, page 195.
15. F^e 19^e. (Arbogast, 3^e lettre) = n° 33.
16. F^e 21^e. (Arbogast, 18^e lettre) = n° 28.
17. F^e 21^e. (Arbogast, 7^e lettre) = n° 56.
18. F^e 22^e. (Arbogast, 19^e lettre *en partie*) = n° 59.
19. F^e 22^e. (Arbogast, 1^e lettre) = n° 60.
20. F^e 23^e. (Arbogast, 6^e lettre) = n° 53.
21. F^e 23^e. (Arbogast, 17^e lettre) = n° 46.
22. F^e 24^e. (Arbogast, 8^e lettre) = n° 33.
23. F^e 25^e. (Arbogast, 9^e lettre) = n° 36.
24. F^e 25^e. (Arbogast, 15^e lettre) = n° 6.
25. F^e 26^e. (Arbogast, 11^e lettre) = n° 30.
26. F^e 26^e. Lettre de M^r Fermat (à Frenicle) = n° 48.
27. F^e 28^e. Frenicle répond (tiré d'une lettre imprimée dans les *Faria*) = n° 49.
28. F^e 28^e. Copie d'une lettre du père Mersenne et de la réponse de M^r de S^t Martin
conseil du Grand Conseil.
29. F^e 29^e. Lettre de Mons^r Pujos au père Mersenne.

Ces deux dernières pièces seront publiées dans le Volume de *Complément*.

VIII.

Les manuscrits de la Nationale, etc.

Les autres manuscrits utilisés par nous, appartenant à des bibliothèques publiques et ayant déjà été étudiés par M. Charles Henry dans ses *Recherches*, n'ont pas besoin d'une description aussi complète que les précédents.

Nous n'avons d'ailleurs à nous étendre un peu longuement que sur le n° 3280 fonds français nouv. acq., désigné par nous sous la lettre A₁ et formé, comme nous l'avons dit, avec les papiers relatifs à Fermat qui ont été achetés en 1848 chez Libri.

Nous avons déjà noté plus haut l'existence, dans ce manuscrit, de l'original : *Doctrinam tangentium etc.*, et de deux feuillets ayant fait partie du recueil d'Arbogast; ce sont là des pièces que Libri a certainement laissées par mégarde en France, tandis qu'il négligeait le reste de « l'énorme cahier » qu'il a dit avoir acquis à Metz.

Ce reste occupe les feuillets 91 à 98 et 120 à 192 du manuscrit A₁, où il est facile de reconnaître l'écriture d'Arbogast. On peut y distinguer :

1^o Divers brouillons des copies au net contenues dans le manuscrit A, savoir la lettre n^o 9 et les opuseules 13, 6, 7, 11, 12 de la liste d'Arbogast (textes publiés par M. Ch. Henry, *Recherches*, 2^e partie, n^os 15, 17, 18, 19, 21, 22);

2^o Des copies ou extraits de quelques pièces déjà imprimées dans les *Varia*;

3^o Des extraits (ou notes tirées) des Ouvrages de Descartes (en particulier de ses Lettres), Fagnano, Mersenne, Wallis, Hérigone, Viète, Albert Girard, Euler, Lagrange;

4^o Des essais de démonstrations sur diverses questions traitées par Fermat;

5^o Des notes bibliographiques sur divers manuscrits de la Nationale ou sur des Ouvrages mathématiques imprimés;

6^o Une copie, tirée de l'un de ces manuscrits, de la *Proposition de M. de Roberval qui sert à trouver les centres de gravité envoyée à M. Fermat le 1^{er} avril 1645*.

En somme, Arbogast ne semble pas, malgré ses recherches sérieusement poursuivies, être arrivé à découvrir aucune autre pièce inédite de Fermat que celles du manuscrit A.

En dehors de documents qui n'intéressent guère que l'histoire du projet de publication sous le gouvernement de Louis-Philippe, le manuscrit A₁ contient encore les copies faites à Vienne par Despeyrous (f^os 25 à 90) de la correspondance entre Fermat et Clerselier, etc., d'après les minutes de ce dernier et des copies faites par ou pour lui.

La Bibliothèque Nationale nous a encore fourni, abstraction faite des originaux mentionnés plus haut, quelques copies anciennes éparses dans divers manuscrits :

Fonds latin 7226 : f^os 34 et suiv. Copies de lettres de Roberval à Fermat du 11 octobre 1636 et du 16 août 1636, déjà imprimées dans les *Varia*, mais la seconde avec un texte complètement refondu.

Fonds latin 11196 : f^os 46 à 53. *Nodus secundarum et ulterioris ordinis*

radicum in analyticis usus (*ci-après*, p. 181) — ¹ 54. Lettre de Fermat à Carcavi (*voir plus haut*, sur les papiers du fonds Libri).

Fonds latin 11197 : ¹ 17 à 20. Copie de la lettre n° 12 de la liste d'Arbogast (*ci-après*, p. 167) — ¹ 20^o. Extrait de la lettre de Fermat à Mersenne du 3 juin 1636 (la première lettre des *Faria*).

Fonds français 80955, Cahier 17 : ¹ 65. Copie de la lettre de Fermat à Pascal du 29 août 1654 (imprimée dans les *Oeuvres de Pascal*) — ¹ 78. Copie d'une lettre sans adresse ni nom d'auteur, mais que M. Ch. Henry a reconnue comme écrite par Fermat à Carcavi et qu'il a publiée (*Recherches*, pages 197 à 200, n° 76 de la Correspondance).

La Bibliothèque de l'Université de Leyde possède, dans le manuscrit n° 997 Burmann Q.22, copie de deux lettres échangées entre Huet et Fermat (*ci-après*, pages 386 et 388) publiées par M. Ch. Henry (¹) (*Recherches*, pages 73-77).

Nous avons déjà signalé les autographes de Fermat que possède la même bibliothèque dans la collection Huygens. La correspondance de Carcavi de cette collection a été publiée par M. Ch. Henry soit dans ses *Recherches* (pages 213 à 216), soit dans son *Pierre de Carcavy* [pages 14 à 40 du tirage à part (²)]. Elle renferme d'importants extraits des lettres de Fermat à Carcavy ; l'un d'eux est publié ci-après, page 285, les autres formeront les n°s 77, 78, 101, 103, 106, 110 de la Correspondance de Fermat.

IX.

Plan de la nouvelle édition.

Telles sont les sources imprimées et manuscrites qui ont été à notre disposition pour la préparation de la présente édition ; il nous reste à exposer

(¹) La lettre de Huet est également copiée dans le manuscrit de la Nationale, fonds latin 11433. Nous avons dit que l'original de celle de Fermat subsiste dans notre manuscrit A₁, f° 108 et 109.

(²) Pierre de Carcavy, intermédiaire de Fermat, de Pascal et de Huygens, bibliothécaire de Colbert et du Roi, directeur de l'Académie des Sciences, par M. Charles Henry. — Extrait du *Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche*, tomo XVII, maggio, giugno 1884. — Rome, imprimerie des Sciences Mathématiques et Physiques, Via Lata n° 3, 1884.

le plan qui a été adopté par la Commission de publication (¹) et à expliquer certaines dispositions particulières.

L'édition doit comprendre trois volumes : le premier renfermant d'une part les *Oeuvres mathématiques diverses*, et de l'autre les *Observations sur Diophante*, les deux suivants seront consacrés à la *Correspondance de Fermat* qui sera classée par ordre chronologique et contiendra aussi bien les lettres qu'il a écrites que celles qu'il a reçues.

Tous les opuscules de Fermat étant en latin, un écrit de lui en français appartient nécessairement à sa correspondance; mais il a rédigé dans la langue savante même un certain nombre de lettres, plus soignées que les autres, plus exclusivement mathématiques ou qu'il pensait devoir être, plus que les autres, copiées et communiquées. Comme d'autre part ses opuscules affectent parfois la forme épistolaire, et qu'ils n'étaient pas destinés à une autre publicité que ses lettres écrites en latin, comme aussi les fragments isolés composés dans cette langue ont été au moins envoyés par lui avec ses lettres, quand ils n'en ont point été simplement extraits, on peut parfois hésiter pour classer une pièce latine, soit dans les opuscules, soit dans la correspondance.

Pour se mettre en garde contre tout reproche d'arbitraire à cet égard, il eût fallu pouvoir affecter le premier Volume à tous les écrits latins de Fermat; mais cette solution n'était guère praticable, car il arrive à notre géomètre de passer, dans la même lettre et parfois sur le même sujet, d'une langue à l'autre. On serait également tombé dans le grave inconvénient de détruire assez souvent l'unité d'un groupe de lettres et de rompre le fil chronologique de la correspondance.

On a donc préféré se borner à conserver le cadre général des *Varia Opera*, en y rattachant tous les morceaux qui y ont paru trouver une place plus naturelle que dans la Correspondance, où ils auraient été isolés et la plupart à une date incertaine.

L'ordre chronologique des opuscules ne pouvant d'ailleurs dans bien des

(¹) La publication des Oeuvres de Fermat a fait l'objet d'une proposition de loi présentée le 16 février 1882; cette loi a été votée par la Chambre le 13 mai, par le Sénat le 4 juillet, et promulguée le 13 juillet 1882. L'impression a été confiée à MM Gauthier-Villars et fils, imprimeurs-éditeurs, qui se sont chargés de ce travail moyennant une souscription à 200 exemplaires.

La principale cause du retard apporté à la publication est due à l'espérance, aujourd'hui reconnue comme illusoire, de trouver des matériaux importants dans les manuscrits de lord Ashburnham (fonds Libri), manuscrits dont il n'a pas été possible de prendre connaissance avant l'acquisition de ce fonds par la Bibliothèque Nationale.

cas être rigoureusement établi, il fallait adopter un ordre méthodique. Celui des *Varia*, n'ayant aucune valeur réelle, ne pouvait servir de point de départ; on s'est arrêté aux principes suivants :

Constituer une série de groupes dont l'ordre représentât le développement des idées de Fermat, tel qu'il apparaît du moins si l'on prend dans chaque groupe l'écrit le plus ancien et si l'on range cet ensemble par ordre de dates;

Adopter dans l'intérieur de chaque groupe le classement chronologique pour les opuscules les plus importants; rejeter à la fin du groupe les fragments (généralement mal datés) et les ranger par ordre de questions.

On reconnaîtra facilement dans la Table des matières ci-avant les groupes qui ont été ainsi formés et qui, au reste, étaient déjà tous représentés dans les *Varia Opera*; on peut les dénommer comme suit : 1^e Géométrie à la manière des anciens; 2^e Géométrie analytique (inventée et développée indépendamment de Descartes); 3^e Méthodes des maxima et minima et des tangentes (origine du calcul différentiel); 4^e Théorie des équations (notamment une méthode d'élimination générale); 5^e Quadratures (origine du calcul intégral).

La langue dont s'est servi Fermat et la désuétude où sont tombés, même dans le latin que lisent encore les mathématiciens, un grand nombre des termes techniques dont il se sert, ont paru rendre désirable une traduction française; la Commission a jugé qu'il serait préférable de ne la publier qu'à part des Œuvres de Fermat dans un Volume spécial de *Complément*, où l'on donnera également des traductions : d'une part, de l'*Inventum novum* rédigé par le P. de Billy d'après les lettres que lui avait adressées Fermat et publié dans le *Diophante* de 1670; de l'autre, du *Commercium epistolicum* de Wallis; aucun de ces deux Ouvrages n'a, en effet, de titres suffisants pour figurer dans les Œuvres mathématiques ou dans la Correspondance de Fermat, et leur réimpression n'offre pas d'intérêt véritable; leur connaissance est cependant indispensable pour l'histoire scientifique de Fermat.

Le *Complément* comprendra encore, dans le même but historique, les nombreux extraits que l'on peut tirer, relativement au géomètre de Toulouse, des lettres de Descartes et divers autres témoignages des contemporains, en particulier de Mersenne.

Enfin, la Commission a jugé que les éditeurs devaient limiter leurs notes au minimum indispensable pour l'intelligence du texte (renvois compris) et les renseignements bibliographiques; mais elle a décidé la rédaction de trois index : l'un des noms propres; le deuxième de la langue mathématique de Fermat; le troisième des matières.

X.

Remarques pour la lecture du texte.

Le présent Volume ne contenant que des écrits latins, nous n'avons à parler aujourd'hui que des règles qui ont été admises pour la constitution du texte en cette langue.

L'édition des *Varia* est d'une singulière incorrection; les originaux font défaut, à une seule exception près, qui permet d'ailleurs (*voir* page 159 note 2) de constater que Fermat les écrivait assez précipitamment pour ne pas éviter certains *lapsus calami*; enfin les copies laissent également plus ou moins à désirer.

Dans ces conditions, on a supposé que le texte de Fermat devait, ayant toutes choses, être correct, soit pour le sens, soit pour la langue, et partant où il a paru corrompu, on s'est efforcé de le restituer en se conformant le plus possible aux indications des sources et aux habitudes de l'auteur. Diverses additions, soit de mots, soit de membres de phrase omis, ont paru nécessaires; elles ont été faites entre crochets d'intercalation <>. Les crochets [] indiquent, au contraire, les passages suspects d'interpolation, genre de corruption auquel les copies n'ont pas échappé par suite des notes qui y ont été ajoutées.

On n'a tenu aucun compte de la ponctuation des *Varia*, qui est aussi défectueuse que possible, ni même de la division en alinéas que comporte cette édition. Les sources manuscrites ont été seulement consultées sous ce rapport. On a cherché avant tout à rendre la lecture facile, en adoptant une ponctuation régulière et conforme à nos habitudes modernes, et en multipliant les alinéas.

Une autre innovation a été introduite dans le même but : la mise à la ligne de tout ce qui est équation ou peut être considéré comme tel. Il est à peine utile de dire que cette disposition typographique n'est pas en général indiquée par les sources; mais nous n'avons eu aucun scrupule à l'adopter, et nous pensons qu'elle pourrait être utilement imitée en général dans les rééditions des anciens auteurs mathématiques.

En ce qui concerne les notations et abréviations, nous avons cherché à déterminer pour chaque opuscule le mode qui semblait avoir été le plus généralement suivi par Fermat, et nous y avons conformé tout ce qui en différait. Il est à remarquer que, dans les anciennes copies et dans les *Varia*,

on n'a attaché aucune importance à l'emploi de notations que Fermat, fidèle aux errements de Viète, a généralement évitées; mais, d'autre part, on ne doit nullement supposer qu'il ait suivi dans tous ses écrits régulièrement le même système d'abréviations. La règle que nous avons adoptée nous a paru concilier ce qui était dû au respect des anciennes notations et à la facilité de la lecture; car, pour celle-ci, il est en tout cas essentiel que l'on ne passe pas brusquement d'un genre d'abréviation à un autre.

Pour l'orthographe latine, nous avons adopté celle qui est encore aujourd'hui la plus usuelle, malgré les dernières tentatives de réforme; tout d'abord nous avons distingué l'*i* et le *j*, l'*u* et le *c* comme le faisaient déjà les Elzevirs⁽¹⁾, par exemple dans l'édition de Viète de 1646; puis, pour chaque mot particulier, tout en ayant grand soin de restituer certaines formes que Fermat paraît avoir affectionnées et que les copistes ont d'ordinaire négligées, nous avons adopté l'orthographe la plus usuelle, et seulement pour les cas ambigus, nous avons cherché l'usage le plus fréquent dans les sources relatives à chaque opuscule. Cependant, pour la facilité de la lecture, nous n'avons pas hésité à substituer partout *quam* à *cum*, qui semble pourtant bien avoir été l'orthographe de Fermat.

En tout cas, pour que l'édition nouvelle pût entièrement remplacer les *Varia* dans toute recherche sur ce point, l'orthographe de l'ancienne édition, ainsi que celle des autres sources, a été notée scrupuleusement, en même temps que les corrections, dans les variantes rejetées à la fin du Volume. Ces variantes contiennent également quelques notes critiques et remarques qui complètent les annotations mises au bas des pages du texte.

L'accentuation a été indiquée partout où elle a paru utile pour faciliter la lecture; on a suivi à cet égard le modèle donné par Friedrich Hultsch dans sa traduction de Pappus.

Les pièces qui figurent dans l'Appendice ont été réimprimées sans aucun changement, à part quelques corrections indiquées en notes.

M. Paul Tannery s'est plus spécialement chargé de l'établissement du texte et de la rédaction des notes de ce premier Volume; M. Charles Henry s'est plus particulièrement occupé de recueillir et de collationner les documents.

Sans l'offre gracieuse du prince Baldassare Boncompagni, sans sa singulière complaisance pour nous, la présente édition n'aurait pu être entre-

⁽¹⁾ Le *Diaphante* et les *Varia* de Samuel Fermat offrent à cet égard des divergences et des irrégularités; mais en général la distinction n'est pas faite dans le premier de ces Ouvrages; elle l'est au contraire dans le second.

prise; le monde savant lui en doit une reconnaissance dont nous ne pouvons être ici que les trop faibles interprètes; nous devons aussi un tribut de remerciements à nombre de personnes qui ont bien voulu nous prêter leur concours et nous fournir divers renseignements; nous avons tout particulièrement à nommer M. Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque Nationale, qui a facilité nos recherches avec tant de bienveillance; M. Henri Omont, bibliothécaire au département des manuscrits du même établissement, à qui nous devons, entre autres choses, la déconversion d'une pièce inédite, imprimée dans l'Appendice; M. Bierens de Haan, M. Antonio Favaro qui dirigent respectivement, l'un à Leyde, l'autre à Padoue, les rééditions des Œuvres de Huygens et de Galilée et qui nous ont assuré leur précieux concours pour des collations que nous ne pouvons faire nous-mêmes; enfin M. de la Ville de Mirmont, de la Faculté de Bordeaux, qui a bien voulu rechercher pour nous la provenance de quelques citations classiques faites par Fermat sans nom d'auteur.

ŒUVRES MATHÉMATIQUES DIVERSES.

APOLLONII PERGÆI

LIBRI DUO DE LOCIS PLANIS RESTITUTI.

< LIBER PRIMUS. >

Loci plani quid sint, notum est satis superque : haec de re scripsisse libros duos Apollonium testatur Pappus (¹), eorumque propositiones singulas initio libri septimi tradit, verbis tamen aut obscursis aut sane interpreti minus perspectis (graecum enim codicem (²) videre non licuit). Hanc scientiam, totius, ut videtur, Geometriae pulcherrimam, ab obliuione vindicamus et Apollonium *de locis planis* disserentem Apolloniis Gallis, Batavis et Illyricis (³) audacter opponimus, certam

(¹) *Pappi Alexandrini mathematicæ collectiones a Federico Commandino Urbinate in latinum conversæ et commentariis illustratae.* — Pisauri, apud Hieronymum Concordianum, MDLXXXVIII. — (D'autres tirages à Venise *apud Franciscum de Franciscis Senensem*, 1589, et à Pesaro, 1602.)

C'est à cette traduction de Commandin que Fermat a emprunté textuellement les énoncés (ci-après entre guillemets) des propositions qu'il a cherché à restituer. Voir, dans les variantes, la correspondance établie sous la rubrique *Co.*

(²) Le texte grec de la préface du Livre VII de Pappus a été édité pour la première fois, en 1706, par Halley (*Apollonii Pergæi de sectione rationis libri duo ex Arabicо MSto latine versi*, etc., Oxford). Mais pour apprécier la valeur de la divination de Fermat, il faut recourir à l'édition complète : *Pappi Alexandrini Collectionis quæ supersunt e libris manus scriptis edidit latina interpretatione et commentariis instruxit Fridericus HULTSCH*. Berlin, Weidmann, 1876-1877-1878 (Vol. II, pages 662-669 pour le texte des propositions, et pages 852 à 865 pour les termes relatifs aux *Lieux plans* d'Apollonius).

(³) Francisci Vietae *Apollonius Gallus seu exsuscitata Apollonii Pergæi περὶ ἀπλόνων Γεω-*

gerentes fiduciam non alibi praecarius quam hoc in opere, Geometria miracula elneare. Quod ut statim fatearis, hic exordior.

Propositiones libri primi haec sunt :

PROPOSITIO I.

« *Si duar lineæ agantur, vel ab uno dato puncto, vel a duobus, et vel in rectam lineam, vel parallela, vel datum continentis angulum, vel inter se datum proportionem habentes, vel datum comprehendentes spatium : contingat autem terminus unius locum planum positione datum, et alterius terminus locum planum positione datum continget, interdum quidem ejusdem generis, interdum vero diversum, et interdum similiter positum ad rectam lineam, interdum contrario modo,* »

Hac propositio in propositiones octo dividit commode potest, et quaevis ex iis in multiplices casus : obscuritatem interpreti præbuisse videtur interpunctionum defectus; imo et Pappus ipse hoc loco propter nimiam brevitatem videtur non vacavisse obscuritate. Singula, dum secamus in octantes, ita revelamus :

I. PROPOSITIO. — *Si a dato puncto in rectam lineam duar lineæ agantur, datam habentes proportionem, et terminus unius contingat locum <planum> positione datum (hoc est : aut rectam, aut circumferentiam circuli positione datam), alterius terminus contingat rectam aut circuli circumferentiam positione datam.*

Esto datum punctum A (fig. 1), per quod agantur in directum rectæ AB, AF, in proportione data, et sit, verbi gratia, punctum B in

metria. — Ad V. C. Adrianum Romanum Belgam. — Paris, Leelere, 1600. — (Reproduit pages 325-346 de l'édition des Œuvres de Viète par Schooten, Leyde, Elzévirs, 1646.)

Wilebordi Snellii R(odolphi) F(ilio). περὶ λόγου ἀποτομῆς τῷ περὶ γωνίας ἀποτομῆς resuscitata Geometria. Leyde, Plantin, 1607. — Apollonius Batavus seu exsuscitata Apollonii Pergæi περὶ διπλασιῶν τοπίος Geometria. Leyde, Dorp, 1608.


Marini Ghetaldi, Patritii Ragusensis : Apollonius redivivus seu restituta Apollonii Pergæi inclinationum Geometria. — Supplementum Apollonii Galli seu exsuscitata Apollonii Pergæi tractionum Geometriae pars reliqua. — Venise, 1607.

On peut ajouter le Supplementum Apollonii redivivi publié par Alexander Anderson à Paris, en 1612.

recta linea HCBD positione data : Aio punctum F esse quoque ad rectam positione datam.

A puncto A demissa in rectam HD perpendiculari AC, dabitur punctum C. Producatur CA ad E, et fiat ratio CA ad AE aequalis data; dabitur igitur recta AE et punctum E. Per punctum E, parallela rectae HD

Fig. 1.



ducatur GEF; dabitur positione, et in ea erit punctum F, quia omnes rectae per datum punctum parallelas secantes in eamdem rationem dividuntur. Patet ergo quamenque rectam, per punctum A transcurrentem et datis positione parallelis terminatam, in datam secari proportionem.

Esto deinde datum punctum B (*fig. 2*) et circulus positione ICN.

Fig. 2.



cujus centrum A. Jungatur BA, in puncto I circumferentiam secans, et producatur IB ad BE, ut sit ratio IB ad BE aequalis data. Continuetur in F, et fiat

$$AI \text{ ad } EF \text{ ut } IB \text{ ad } BE,$$

et centro F, intervallo FE, describatur circumferentia circuli EDZ, quam patet, ex constructione, positione dari : Aio rectas omnes, per punctum datum B transcurrentes et utrimque circumferentiis datorum positione circulorum terminatas, in datam secari rationem.

Ducta enim, verbi gratia, CBD, jungantur CA, DF; est

$$\text{ut } IB \text{ ad } BE, \text{ ita } AI \text{ ad } EF;$$

ergo

ut tota BA ad BF, ita AI sive AC ad EF sive FD;

et sunt æquales anguli ABC, FBD ad verticem. Patet itaque triangula esse similia, atque ideo

ut CB ad BD, ita BA ad BF, hoc est in ratione data.

Quum igitur a dato puncto B ducantur in directum due rectæ, BC, BD, verbi gratia, in data ratione, quarum BC tangit circumferentiam positione datam, tanget quoque BD aliam circumferentiam positione datam.

Si producantur rectæ donec ad concavas circulorum circumferentias pertingant, idem eveniet.

Monemus porro nos minima quæque in demonstrationibus non docere, quum statim pateant, imo et easus diversos non persequi, quum ex adductis minimo possint negotio derivari.

2. PROPOSITIO. — *Si a dato puncto ducantur in directum due rectæ, datum continent spatiū, contingat autem terminus unius locum planum positione < datum >⁽¹⁾, tanget pariter et terminus alterius.*


Esto datum punctum A (*fig. 3*), data primum recta BC positione, in quam demittatur perpendicularis AC; dabitur ergo et punctum C. Producatur, et fiat spatio dato æquale rectangulum CAE. Super diametro AE descripto circulo ADE, aio rectas omnes, per punctum A ductas et illinc rectæ, hinc circumferentiā circuli (quem patet dari positione) terminatas, ita ad punctum A secari ut rectangulum sub partibus æquetur spatio dato.

Nam sit, verbi gratia, recta DAB. Junet à DE, quum sit angulus ADE in semicirculo rectus, et anguli BAC, DAE ad verticem æquales, erunt

⁽¹⁾ Le mot *datum* a été restitué ici et ailleurs, partout où il a paru improbable que Fermat l'ait consciemment sous-entendu. Mais il faut observer que Pappus dit souvent seulement θέση et Commandin *positione*, pour signifier *donné de position*; Fermat avait donc pu prendre la même habitude.

triangula DAE, ACB similia, atque ideo rectangulum BAD rectangulo CAE dato aequale.


Fig. 3.



Quum igitur per punctum A dueantur duæ rectæ AB, AD in directum, et terminus unius, nempe AB, tangat rectam BC positione datum, tanget et terminus alterius locum planum, hoc est circulum ADE, positione datum.

Sed detur punctum V (*fig. 4*) et circulus BIGH positione, ejus

Fig. 1.



centrum E. Jungatur EV et producatur in B; dabitur VB. Producatur in F, ut sit rectangulum BVF æquale dato, cui etiam æquetur rectangulum GVX. Super diametro XF, circulus describatur XKF, quem

quidem dari positione patet : Aio rectas, per punctum V transeuntes et duobus cirenlis terminatas, ita secari in V ut rectangulum sub segmentis dato aequale efficiant.

Ducatur enim, verbi gratia, AVKI : aio rectangulum AVK aequari dato.

Sumatur centrum circuli minoris O; recta autem AVKI secet eundem cirenum in R; jungantur rectae RO, AE. Posuimus rectangulum GVX aequari BVF; erit ergo

$$GV \text{ ad } VB \text{ ut } FV \text{ ad } VX,$$

et componendo, et sumendo antecedentium dimidia, et per conversionem rationis,

$$\text{ut } EB \text{ sive } EA \text{ ad } EV, \text{ ita } OX \text{ sive } OR \text{ ad } OV.$$

Et habent duo triangula OVR, VEA communem angulum EVA; erunt ergo similia, et

$$\text{ut } AV \text{ ad } RV, \text{ ita } AE \text{ ad } RO, \text{ sive } EB \text{ ad } OX, \text{ <et> } VE \text{ ad } VO.$$

Quum ergo

$$\text{ut } EB \text{ ad } OX, \text{ ita } VE \text{ ad } VO,$$

ergo

$$\text{ut } EB \text{ ad } OX, \text{ ita reliqua } VB \text{ ad reliquam } VX,$$

atque ideo

$$\text{ut } AV \text{ ad } RV, \text{ ita } BV \text{ ad } XV.$$

Similiter probabimus

$$\text{ut } GV \text{ ad } VF, \text{ ita } IV \text{ ad } KV;$$

erit igitur vicissim

$$\text{ut } GV \text{ ad } VI, \text{ ita } FV \text{ ad } VK.$$

Ut autem

$$FV \text{ ad } VK, \text{ ita } VR \text{ ad } VX$$

(quia rectangula KVR, FVX in circulo sunt aequalia), et

$$\text{ut } VR \text{ ad } VX, \text{ ita probavimus esse } VA \text{ ad } VB;$$

erit igitur

ut FV ad VK , ex una parte, ita VA ad VB .

Rectangulum igitur KVA rectangulo FVB dato æquale.

Ex alia vero parte erit

ut GV ad IV , ita VR ad VX ,


atque ideo rectangulum IVR rectangulo GVX dato æquale.

Quum igitur per punctum V ducantur duæ lineæ in directum AV et VK , comprehendentes spatium datum, et terminus unius, nempe VA , contingat circulum positione datum, tanget et terminus alterius locum planum, hoc est circulum XKF , positione datum.

3. PROPOSITIO. — *Si a dato \angle puncto $>$ ducantur duæ lineæ, datum continentes angulum et datam proportionem habentes, contingat autem terminus unius locum planum positione \angle datum $>$, contingat et terminus alterius.*

Esto primo datum punctum H (fig. 5) et recta linea AF positione,

Fig. 5.



in quam demissa perpendicularis HB dabitur. Fiat angulo dato æqualis angulus BHE et sit BH ad HE in ratione data; dabitur recta HE positione, et punctum E . A puncto E ad rectam HE exitata perpendicularis infinita DEG dabitur positione. Sumatur quodlibet punctum in recta AF , ut C , et junctâ HC , fiat angulo dato æqualis $CHH : Aio$ rectam HC ad HH esse in ratione data.

Nam, quum sint æquales anguli BHE , CHH , dempto communi CHE ,

erunt aequales BHC, EHH; et sunt anguli ad B et E recti : sunt igitur similia triangula HBC, HEI et


$$\begin{array}{l} \text{ut HB ad HC, ita HE ad HH,} \\ \text{et viceversa} \quad \text{ut HB ad HE, ita HC ad HH} \end{array}$$

habet rationem datam.

Quum igitur, a dato puncto H, ductae fuerint duas lineas HC, HH, in dato angulo CHH et in data ratione, et altera, nempe HC, ad punctum C contingat rectam positione \angle datam \angle , contingat et terminus alterius locum planum, nempe rectam DG, quam dari positione probatum est.

Sed tangatur circulus : esto punctum A (fig. 6), datus circulus

Fig. 6.



positione HE, ejus centrum F. Jungatur FA secans circulum in I, et fiat angulus $\angle IAD$ aequalis dato, et ratio IA \angle ad \angle AD data: dabitur AD positione, et punctum D. Producatur et fiat

$$\text{ut IA ad AD, ita IF ad DC.}$$

Centro C descripto circulo DB, quem patet dari positione, sumatur quodvis punctum in priore circulo, ut E, et junctâ EA, fiat angulo dato aequalis EAB, et sit punctum B in secundo circulo : Ait esse AE ad BA in ratione data.

Jungantur FE, BC. Probabimus, ut supra, aequales angulos FAE, CAB

et similitudinem triangulorum FAE, CAB; iisdem rationibus, quibus jam in priore propositione ejusque secunda figura usi sumus, arguemus, eritque

$$AF \text{ ad } EA \text{ ut } AC \text{ ad } AB,$$

et viceversa


$$\text{ut } AF \text{ ad } AC, \text{ hoc est ut } AE \text{ ad } AB, \text{ ita } AE \text{ ad } AB.$$

Dabitur ergo ratio AE ad AB, et patet tum sensus, tum consequentia propositionis.

4. PROPOSITIO. — *Si a dato puncto ducantur duas lineas, datum continentes angulum et datum comprehendentes spatium, contingat autem terminus unius locum planum positione datum, contingat et terminus alterius.*

Sit datum punctum G (fig. 7), recta positione data AC, in quam

Fig. 7.



ducatur perpendicularis GB; esto angulus datus BGE, et spatium datum sub BG in GE. Super GE describatur semicirculus GEF, et sumpto in recta positione data quovis puncto, nt D, junctaque DG, fiat angulo dato aequalis DGF: Aio rectangle sub DG in GF aequari dato.


Jungatur FE. Probabimus, ut in propositione praecedente, aequalitatem angulorum BGD, EGF. Sed recti ad B et F sunt aequales; non latebit igitur triangulorum BGD, EGF similitudo, neque rectangle BGD in GE, et GD in GF aequalitas, neque veritas propositionis.

Si igitur, etc.

Sed sit datum punctum A (fig. 8), et circulus positione HGE.

Ducatur, per ipsius centrum, AEH secans circumferentiam in punctis E, H. Sit angulus datus HAB, et spatium datum rectangulum sub HA in AI, vel \angle sub EA in AB. Super recta IB descripto semicirculo (¹), quem quidem patet dari positione, satisfiet quæstioni : nam ducta GEA,

Fig. 8.



verbi gratia, et facto angulo GAD, dato æquali, aio rectangulum GAD, vel FAC, æquari dato.

Nam quum rectangula HAI, EAB æquentur, erit

$$\text{ut } HA \text{ ad } AE, \text{ ita } AB \text{ ad } AI.$$

Ex propositionis verò superioris ratiocinio patet æqualitas angularium HAG, BAC et ex priore propositione facile deducetur esse

$$\text{ut } HA \text{ ad } GA, \text{ ita } BA \text{ ad } AC.$$

Sed

$$\text{ut } HA \text{ ad } GA, \text{ ita } FA \text{ ad } AE;$$

ergo

$$\text{ut } FA \text{ ad } AE, \text{ ita } BA \text{ ad } AC,$$

rectangulumque FAC rectangulo BAE dato est æquale.

Deinde est

$$\text{ut } BA \text{ ad } AC, \text{ ita } AD \text{ ad } AI,$$

rectangulumque GAD rectangulo HAI dato æquale. Constat itaque ex omni parte propositum.

Si igitur, etc.


(1) Voir plus loin page 18, ligne 7 en remontant . « Observandum autem, etc.

Hoc in easu sumpsimus punctum A extra circulum positione datum, in secundo verò easu secundæ propositionis, intra circulum posueramus.

Quatuor propositiones praecedentes punctum unum datum assument, sequentes duo.

5. PROPOSITIO. — *Sia duobus punctis datis due linea parallela agantur, rationem habentes datam, contingat autem terminus unius locum planum positione datum, continget et terminus alterius.*

Sunto \angle data duo puncta A et H (fig. 9), recta positione CBDK, in quam demittatur perpendicularis AB, cui parallelia ducatur HE, et



sit ratio AB ad HE data. Dabitur punctum E, per quod ducta FEG perpendiculari ad HE et rectæ positione datae parallelâ, aio omnes parallelas, a punctis A, H ductas et rectis CD, FG positione datis terminatas, esse in proportione data AB ad HE.


Erunt enim anguli BAD, EHG aequales, et recti ad B et E; similia ergo triangula BAD, EHG, et reliqua facilia.

Quum igitur a datis duobus punctis A et H ductæ fuerint parallelae AD, HG, in ratione data, quarum AD est ad datam rectam positione, erit et HG ad rectam positione datam, ideoque ad locum planum.

In hac figura (fig. 10) sint data puncta A et Z, et circulus positione BC, cuius centrum E. Jungatur AE, ocurrens circulo in B, et huic parallela ducatur ZN, fiatque ratio AB ad ZN aequalis datae. Producatur ZN in I, et fiat ratio BE ad NI aequalis etiam datae. Centro I, intervallo IN, descriptus circulus dabitur positione et quæstioni satisfaciet.

Nam, ductis parallelis AC, ZD, circulis ad puncta C, D occurrentibus, erit ratio AC ad ZD aequalis datae; esse enim angulos BAC, NZD

Fig. 10.




aequales, jam primus hujus propositionis casus evicit; reliquum præstabit secundum <tertiae> propositionis epitagma.

6. PROPOSITIO. — *Si a duobus punctis datis duæ parallela agantur, datum comprehendentes spatium, contingat autem terminus unius locum planum positione datum, continget et terminus alterius.*

Sint data duo puncta A et H (fig. 11), recta positione CE, in quam <demittatur> perpendicularis AB, cui parallela ducatur HG, et

Fig. 11.



rectangulo dato sit aequale rectangulum sub AB <in> (¹) HG; dabitur recta HG, super qua descriptus semicirculus (²) HFG quæstionem perficiet.

¹) La locution abrégée « sub AB, HG » se trouve déjà chez Viète.


²) Voir la Note de la page 12.

Ductis enim ubicumque parallelis AD, HF, et junctâ GF, patebit demonstrationes superiores retractanti triangulorum BAD, GHF similitudo, ideoque rectangulum sub AD in HF æquale dato sub BA in HG concludetur.

Quoniam igitur a duobus punctis, etc.

In secundo casu, sint data puncta A et B (*fig. 12*), et circulus positione HFGH, per cuius centrum transeat AII, cui parallela ducatur BC,

Fig. 12.



et sit rectangulum sub AI $<$ in $>$ BC æquale dato, eidemque æquale rectangulum sub AI in BO. Super recta OC descriptus semicirculus præstat propositum.


Nam, ductis parallelis AFG, BED, erunt anguli HAG, CBD æquales, et rectangulum sub AG in BE æquale dato, eidemque rectangulum sub AF in BD; nec absimilis est ei, quæ in secundo epitagmate propositionis quartæ prodita est, demonstratio.

7. PROPOSITIO. — *Si duæ lineæ agantur a datis duobus punctis, datum continentæ angulum et datum habentes proportionem, contingat autem terminus unius locum planum positione datum, contingat et terminus alterius.*

Sunto $<$ data $>$ duo puncta A et B (*fig. 13*), recta positione IGH.

Super BA describatur portio circuli ALB, capiens angulum aequalem dato. A puncto A ducatur in rectam HI perpendicularis AG, qua producta donec circumferentiae occurrat in L, producatur LBE, et fiat AG ad BE in ratione data. Perpendicularis ad BE agatur FEDC, et sumatur quodlibet punctum in portionis circumferentia, ut K, a quo ducantur per puncta A et B rectae KAH, KBD, occurrentes rectis HI, FC in punctis H et D : Alio alio ad BD esse in ratione data AG ad BE.

Fig. 13.



Quum enim hoc ita se habeat, erunt triangula AGH, BED similia, ideoque anguli GAI, EBD, eisque ad verticem KAL, KBL aequales : quod quidem ita se habet quum eidem circuli portioni insistant, et proclivis est ab analysi ad synthesis regressus.

Quum igitur a datis duobus punctis A et B ductae fuerint due rectae AIH, BD, datum continentes angulum HKD < datamque habentes proportionem >, et terminus ipsius AIH contingat rectam HI positione datam, contingat et terminus BD rectam FC, quam dari positione evicit constructio.


Sed sint data puncta A, B (fig. 14), circulus positione HF. Super recta AB describatur portio circuli AKB, capiens angulum dato aequalem. Centrum circuli HF esto G. Jungatur AHG, producatur donec portioni occurrat in K, et ducatur KBE, et sit ratio AIH ad BE data. Producatur BE in D, donec HG ad DE sit pariter in ratione data. Centro D descriptus circulus dabitur positione, et dabit solutionem questionis.

Ductis quippe IAF, IBC, erunt anguli ad A et B aequales, et reliquum

propositi non est laboriosum; statimque patet AF ad BC esse in ratione data, imo et ad circumferentias concavas productas idem præstare.

Quum igitur, etc.


Fig. 14.



8. PROPOSITIO. — *Sí a duobus punctis datis ducantur duas lineas, datum continentes angulum et datum comprehendentes spatium, contingat autem terminus unius locum planum positione datum, continget et terminus alterius.*

Sint data duo puncta A et B (fig. 15), recta positione GI. Super AB describatur portio circuli capiens angulum datum. Ducta perpendicu-

Fig. 15.




laris AH in GI continuetur in F, et juncta FB producatur in C, sitque spatium datum AH in BC. Super recta BC descriptus circulus faciet quod proponitur.

Erit quippe, sumpto quovis puncto in portione E, et junctis EAI, EBD, rectangulum sub AI <in> BD aequale dato; nec differt ab expositis aliis casibus demonstratio.

Sed sint data duo puncta A, B (fig. 16), datus positione circulus IKL, et super AB descripta portio circuli capiens angulum dato aequalem. Ducatur per centrum recta ANI et producatur in G; junctaque

Fig. 16.



GB producatur, et fiat rectangulum sub AI in BC aequale dato, eidemque aequale rectangulum sub AN in BD. Super CD descriptus semicirculus satisfaciet proposito.

Hoc est : sumpto quolibet puncto ut H, et reliquis ut supra constructis, ut in figura, erit rectangulum sub AK in BF aequale dato, eidemque rectangulum sub AL in BE; nec est diversa demonstratio a praecedentibus.

Constat itaque propositum, eaque ratione prior Apollonii seu Pappi propositio redditur manifesta.

Observandum autem casus quos in semicirculis tantum expressimus in circulis integris locum habere, sed et casus multiplices ex varia datorum positione oriri, quos otiosiores ex praecedentibus facili opera et proelivi ratiocinio deducent.

Subjicit Pappus : Locum planum quem secunda ex rectis contingit, interdum esse ejusdem generis, interdum vero diversum. Hoc patet, quia in prima propositione, verbi gratia, est ejusdem generis : nam, si prior

sit ad rectam, est quoque ad rectam posterior, si ad circulum, similiter ad circulum; in secundae vero priore parte et aliis quibusdam casibus, est diversi generis.

Addit deinde aliquando *similiter* ponit *ad rectam lineam, interdum contrario modo*. Quo loco verba « *ad rectam lineam* »⁽¹⁾, quæ nullum sensum admittunt, censeo delenda, et ita locum interpretor, ut aliquando secundus locus priori contrario modo ponatur: verbi gratia, si prior sit ad convexum circuli, secundus ad concavum, etc., ejus rei exempla priores propositiones suppeditabunt.

PROPOSITIO II.

« *Si rectæ lineæ positione dataæ unus terminus datus sit, et alter circumferentiam concavam positione datum continget.* »

Haec verba si ita legantur, falsa est propositio⁽²⁾; reponendum igitur loco, verbi gratia, « *positione dataæ* » — *magnitudine dataæ*; — eritque sensus ut, *datâ circuli diametro et centro, extremitas diametri sit ad circumferentiam concavam positione datum*. Cuius rei veritas quum per se pateat, cur diutius hic immoremur?

PROPOSITIO III.

« *Si a duobus punctis datis inflectantur rectæ lineæ datum angulum continentem, commune ipsorum punctum continget circumferentiam concavam positione datum.* »

Haec propositio per se patet: dari enim, super recta linea duo puncta jungente, portionem circuli capientem angulum datum, docuit Euclides in *Elementis*.

PROPOSITIO IV.

« *Si trianguli spatii, magnitudine dati, basis positione et magnitudine data sit, vertex ipsius rectam lineam positione datum continget* », paral-

⁽¹⁾ Les mots du texte grec πρός τὴν εὐθεῖαν (Hultsch, p. 664, l. 5) peuvent être conservés avec l'explication donnée par Fermat.

⁽²⁾ Fermat a deviné le texte grec (Hultsch, p. 664, l. 10). Cette proposition et les deux suivantes ne sont pas d'Apollonius: Pappus les donne comme ajoutées par Charmandre.


leam nempe basi datae, enjus inventione ex 1 Elementorum facile deduces omnia.

PROPOSITIO V.

« *Si rectæ lineæ, magnitudine datae et cuiquam positioni datae æquidistantis, unus terminus contingat rectam lineam positione datum,*
 « *et alias terminus rectam lineam positione datum contingat.* »

Data rectæ lineæ DE (*fig. 17*) magnitudine et rectæ AC, positione datae, æquidistantis unus terminus, ut D, contingat rectam AF positione datum.

Fig. 17.



tione datum. Si per punctum E duxeris BEG ipsi AF parallelam, constabit propositum.

Erunt quippe rectæ omnes, inter has duas parallelas interceptæ et rectæ AC, positione datae, æquidistantes, inter se æquales : quod ipsa constructio manifestat.

Si igitur alter terminus enjuslibet sit ad rectam AF, erit alius ad BG, ut vult propositio, quam etiam licet porrigeret levius negotio ad circumlos.


Sit enim data AB (*fig. 18*) positione, cui æquidistet recta NO magnitudine data, enjus punctum N sit ad circumferentiam circuli CNM positione dati : Alio punctum O esse ad circulum positione datum.

Esto E centrum circuli CNM, et ducta diameter, ipsi NO parallela, continuetur in F, donec recta CF æquetur NO datae : dabitur recta CF positione et magnitudine. Producatur, et fiat FH æqualis CD. Super FH descriptus circulus præstabit propositum.

Erit quippe punctum O ad ipsius circumferentiam. Quum enim

punctum O sit ad circumferentiam circuli FOP, erunt rectae CN, FO aequales et parallelae, quum aequales et parallelas CF, NO conjungant. Erunt igitur anguli NCD, OFH aequales; quod quidem ita se habet,

Fig. 18.



quum rectae CD, FH sint aequales, et a rectis NM, OP aequaliter distent.

Poterit igitur propositio Pappi universalius ita concipi :

Si rectæ lineæ, magnitudine datae et cuiquam positione datae aequidistantis, unus terminus contingat locum planum positione datum, et alius terminus locum planum positione datum contingat.

PROPOSITIO VI.

*« Si a puncto quodam ad positione datae duas rectas lineas parallelas,
» vel inter se convenientes ducantur rectas lineas in dato angulo, vel datam
» habentes proportionem vel quarum una simul cum ea, ad quam altera
» proportionem habet datam, data fuerit, contingat punctum rectam
» lineam positione datam. »*


Hujus propositionis due sunt partes, quarum prior hæc est.

Sint duæ rectæ positione datae AE, AF (fig. 19), in puncto A concurrentes, et a puncto C demittantur rectæ CB, CD, in datis angulis CBA, CDA, et sint rectæ BC, CD in data proportione : Alio punctum C esse ad rectam lineam positione datam.

Jungantur AC, BD. In quadrangulo ABCD dantur tres anguli ABC, ADC, BAD : datur igitur angulus BCD. Datur etiam ratio BC ad CD ex hypothesi : ergo datur specie triangulum BDC et anguli CBD, CDB.

Reliqui igitur ABD, ADB dantur, ideoque specie triangulum ABD : datur igitur ratio AB ad BD. Sed ex demonstratis datur ratio BD ad BC (quoniam probatum sit triangulum BDC specie dari) : ergo datur ratio AB


Fig. 19.



ad BC. Datur autem BA positione, et punctum A : datur igitur positione recta AC, et in ea sumpto quovis puncto et ab eo demissis, in datis angulis, rectis in rectas datas, probabitur semper demissas esse in data proportione.

Alter casus est si rectae datae sint parallelae : Sint rectae CA, CB (fig. 20), in datis angulis CAD, CBF, in proportione data. Angulus CNB

Fig. 20.



datur: est enim aequalis, propter parallelas, dato CAD. Datur igitur specie triangulum CNB et ratio CN ad CB; datur autem ex hypothesi ratio CB ad CA : ergo ratio CN ad CA data est, ideoque probatur facile punctum C esse in recta data positione.

Constructio. — Per punctum quodvis, ut B, trajiciatur perpendicular

laris IBM : dabitur IB. Fiat

ut AN ad NC, ita IB ad BM.


Per punctum M ducta duabus datis parallelis satisfaciet quæstionem, nec est operosa demonstratio.

Si igitur a puncto quodam ad positione data duas rectas lineas, parallelas vel inter se convenientes, ducantur rectæ lineæ $\angle \text{in}$ datis angulis, habentes datam proportionem, continget punctum rectam lineam positione datam.

Secunda pars ita se habet :

Dentur rectæ AC, AG (*fig. 21*), in puncto A concurrentes. Ponatur

Fig. 21



AN super rectam AC in dato angulo CAN. Fiat AN æqualis datae, et ipsi AC parallela ducatur NG. Angulus alius datus sit ROG. Per primam partem hujus ducatur recta GE, in qua sumpto quovis puncto, ut E, rectæ ED, EF, ipsis RO, AN parallelae, sint in ratione data : dabitur GE positione, ex superius demonstratis. Producatur FE in B : dabitur FB magnitudine; est enim æqualis datae AN, propter parallelas.

Quodecumque igitur punctum sumpseris in recta GE, ut E, a quo in rectas AC, AG demiseris rectas ED, EB in angulis datis, recta BE una cum EF, ad quam ED habet rationem datam, data erit : quod vult propositio (¹).

Si igitur a puncto quodam ad positione $\angle \text{datas}$ duas rectas lineas, inter se convenientes, ducantur rectæ lineæ in datis angulis, quarum

(¹) Fermat omet ici le cas du parallélisme des droites données AC, AG.

una simul cum ea, ad quam altera habet proportionem datam, data fuerit, continget punctum rectam lineam positione datam.

PROPOSITIO VII.

Si sint quotcumque rectæ linearē positione datae, atque ad ipsas a quodam puncto ducantur rectæ lineaæ in datis angulis, sit autem quod data linea et ducta continetur, unâ cum contento data linea et altera ducta, aequale ei quod data et alia ducta et reliquis (¹) continetur, punctum rectam lineam positione datam continget. »

Haec propositio est ampliatio praecedentis et quod de duabus lineis est superius demonstratum in prima parte propositionis VI, hic in quotcumque locum habere proponitur.

Exponantur tres rectæ positione datae et triangulum constituentes AB, BC, CA (fig. 22). Est invenienda recta, EK verbi gratia, in qua sumendo quodlibet punctum, ut M, et ab eo ducendo rectas MR, MO, MI in angulis datis MRA, MOB, MIA, summa duarum OM et MI sit ad MR in ratione data.

Per primam partem propositionis praecedentis inveniatur recta in qua sumendo quodlibet punctum et ab eo ducendo rectas ad rectas AB,

(¹) Ces deux mots *et reliquis* de la version de Commandin sont incompréhensibles; Hultsch traduit le grec *καὶ τῶν λοιπῶν ἅρματων* (p. 666, l. 5) par *et sic in veteris*, ce qui concorde assez avec la divination de Fermat. Mais le sens probable est plus vague et ne permet guère de préciser à quel point s'étaient arrêtées les recherches d'Apollonius.


La généralisation véritable de la proposition VI est évidemment que le lieu du point est une droite toutes les fois qu'il y a une relation linéaire *quotconque* entre les distances (obliques) de ce point à des droites données en nombre quelconque. On peut donner ce sens à la proposition VII du texte de Pappus; mais, à entendre ce texte littéralement, il semble que, d'une part, dans cette relation linéaire, il ne supposait pas de terme constant; que, de l'autre, il égalait la somme de deux des termes à la somme de tous les autres. Fermat a bien fait la première hypothèse; mais, au lieu de la seconde, il a supposé un terme égal à la somme de tous les autres.

Dans l'*Id locos planos et solidos Isagoge*, Fermat remarque la possibilité de généraliser la proposition de Pappus, telle qu'il l'a restituée; cette généralisation doit, sans doute, correspondre à l'hypothèse qui égale la somme d'un nombre quelconque de termes à la somme de tous les autres, mais toujours en ne supposant pas de terme constant.

Puis, au même endroit, Fermat égale, au contraire, à un terme constant la somme de tous les termes variables; mais il ne paraît pas avoir conçu la relation linéaire sous sa forme la plus générale.

BC , ducte sint in ratione data : dabitur positione recta quæsita. Punctum igitur, in quo concurret cum AC , dabitur : esto E , a quo ducantur EV , ED ipsis MO , MR parallelæ; ergo ex constructione VE ad ED habebit rationem datam. Eadem methodo, sumptis AB , AG rectis, inveniatur punctum K , a quo ductæ KL , KZ in datis angulis, ipsis nempe MR , MH parallelæ, sint in ratione data. Erit igitur similiter KZ ad KL in

Fig. 33.



ratione data. Jungatur EK : quodecumque punctum in ea sumpseris præstabit propositum.

Sumatur M , verbi gratia, ex jam constructis. Fiat MF parallela BA , et MH parallela BC . Probandum est sumnam duarum OM , MH esse ad MR ut VE ad ED , in ratione nempe data.

Fiat adhuc KG parallela BA . Ponatur verum esse quod intendimus probare : ergo vicissim erit

ut MR ad ED , ita summa duarum MI , MO ad EV ,

et, dividendo, erit

ut differentia MR et DE ad DE ,

ita differentia qua due OM , MH superant EV ad EV .

Quum autem MF sit parallela BA , EF erit differentia rectarum MB et DE , et quum MH sit parallela BC , EH erit differentia rectarum VE , MO , ideoque differentia rectarum IM et EH æquabitur excessui quo duæ MO , MH superant rectam VE . Ex demonstratis igitur erit

EF ad DE ut differentia rectarum IM , EH ad EV ,

et vicissim

EF erit ad differentiam rectarum IM , EH ut ED ad EV .

Erit igitur, convertendo,

differentia rectarum IM , EH ad EF in ratione data EV ad ED .

Ex constructione autem, expositis tribus EH , EF , MI , est

VE ad EH ut KE ad EM ;

est etiam

KZ ad MI in eadem ratione KE ad EM ;

est etiam, quum KG sit parallela BA ,

GE ad EF in eadem ratione KE ad EM .

Igitur tres rectæ VE , KZ , EG sunt in ratione trium HE , MI , EF : est igitur

ut differentia duarum EV , KZ ad EG , ita differentia duarum MI , EH ad EF .

Sed probavimus differentiam duarum MI , EH ad EF habere rationem datam EV ad ED : igitur differentia duarum EV , KZ ad EG habebit rationem datam EV ad ED , et vicissim

differentia duarum EV , KZ ad EV erit ut EG ad ED ,

et, componendo,

KZ erit ad EV ut GD ad ED .

Sed (propter parallelas KG , BA) KL æquatur DG : igitur vicissim erit

ut KZ ad KL , ita EV ad ED ,

quod quidem ita se habere jam ex ipsa constructione innotuerat.

Constat itaque veritas pulcherrimæ propositionis, nec est difficilis aut absimilis ad ulteriores casus et quotlibet lineas porrigenda constructio et demonstratio. Semper enim, beneficio constructionis in duabus lineis, expedietur problema in tribus lineis : beneficio constructionis in tribus lineis, expedietur problema in quatnor lineis :

beneficio constructionis in quatuor, expedietur problema in quinque :
et simili omnino ac uniformi in infinitum methodo.

PROPOSITIO VIII ET ULTIMA.

« *Si ab aliquo puncto ad positione datas parallelas ducantur rectæ linea*
» *in datis angulis, quæ ad puncta in ipsis data abscedant rectas linea*s.
» *vel proportionem habentes, vel spatium continentes datum, vel ita ut*
» *species ab ipsis ductis, vel excessus specierum æqualis sit spatio dato,*
» *punctum contingat positione datas rectas linea*s. »

Hujus propositionis, si vera esset, quatuor essent partes, sed eam *in ratione data* veram duntaxat (¹) deprehendimus. Valeant igitur reliqua de spatio contento sub duabus, et de summa aut differentia quadratorum ab ipsis, et tanquam commentitia aut *huc aliunde translata* refigiantur.

Proponatur itaque sic emendatum theorema :

Si ab aliquo puncto ad positione datas parallelas ducantur rectæ linea
*in datis angulis, quæ ad puncta in ipsis data abscedant rectas linea*s *proportionem habentes datum, punctum contingat positione datum rectam linea*m.

Constructio sic procedet : Sint datae parallelae AB, GC (fig. 23), puncta in ipsis data A et F, angulus unus ex datis BAH, alter GFH. Quum puncta A et F dentur, et anguli ad ipsa, dabuntur rectæ AH, FH positione, ideoque punctum concursus H; dabitur etiam punc-


(¹) La traduction de Commandin était trop peu intelligible pour que Fermat ait pu reconnaître le véritable sens du texte de Pappus (Hultsch, p. 666, l. 7 à 13); il lui aurait fallu entendre les mots *vel spatium continentes datum, vel ita ut species ab ipsis ductis, vel excessus specierum æqualis sit spatio dato* comme se rapportant non pas aux *rectas linea*s, c'est-à-dire aux abscisses AB, EF, mais bien aux *rectæ linea*e IB, IE.

Avec l'interprétation de Fermat, pour les trois hypothèses où l'on suppose constant : soit $AB \times EF$, soit $\overline{AB}^2 + \overline{EF}^2$, soit $\overline{EF}^2 - \overline{AB}^2$, le lieu du point I est évidemment une conique (hyperbole ou ellipse), ainsi que, du reste, Fermat l'a indiqué dans l'*Id locos planos et solidos Isagoge*.

Avec le sens qu'il faut donner au texte de Pappus, que $IB < IE$, ou $\overline{IB}^2 - \overline{IE}^2$, ou $\overline{IB}^2 - \overline{IE}^2$ soit constant, le lieu est évidemment une parallèle aux droites données AB, GC.

tum G, in quo AH secat parallelam GC. Recta GF in puncto D ita seceatur ut GD ad DF sit in ratione data : dabitur punctum D. Jungatur DH; dabitur igitur positione DH : Aio rectam DH praestare propositionum, hoc est : sumpto in ea quolibet puncto, ut I, et ab eo ductis IB, IE in angulis datis, abscissam AB ad datum punctum A ad abscissam EF ad datum punctum F esse in ratione data GD ad DF.

Fig. 23.



Seecet BI parallelam GF in C. Erit ex constructione IB parallela HA, quum fuerit demissa in angulo dato, hoc est, ipsi HAB æquali. Erit etiam HE parallela HF : GC igitur, propter parallelas, æquatur AB. Probandum superest,

ut GC ad EF, ita GD ad DF,

et vicissim

ut GC ad GD, ita EF ad FD.

Hoc autem perspicuum est :

ut enim HI ad HD, ita GC ad GD,
et

ut eadem HI ad HD, ita EF ad FD.

Esse igitur GC ad EF in ratione data fit perspicuum.


Sunt plures casus tam istius quam praecedentium propositionum : quos invenire et addere quum sit facile, cur in his diutius immoremur?

LIBER SECUNDUS⁽¹⁾.PROPOSITIO I⁽²⁾.

« *Si a datis punctis rectas lineaē inflectantur, et sint quae ab ipsis fiunt
dato spatio differentia, punctum positione datas rectas lineaē con-
tinget.* »

Sint data duo puncta A et B (fig. 24), et sit datum quodlibet spa-
tium quadrato AB minus. Dividatur AB in C, ita ut quadratum AC qua-

Fig. 24.



dratum CB superet dato spatio, et educatur perpendicularis infinita CE,

(1) Il semble que Fermat ait composé ce second Livre avant le premier, et même assez longtemps avant (voir *Lettre à Roberval*, du 20 avril 1637). C'est ce qui peut expliquer pourquoi, dans l'édition des *Varia*, on trouve, avant *Liber II*, un titre spécial : *Apollonii Pergaei propositiones de locis planis restituta*.

Et en effet, pour l'intelligence du texte obscur où Pappus résume l'objet du Traité d'Apollonius, Fermat devait naturellement chercher à s'aider des lemmes, au nombre de huit (propositions 119 à 126 de la version, par Commandin, du Livre VII), donnés comme relatifs aux *Lieux plans*; or ces lemmes concernent exclusivement le second Livre d'Apollonius.

(2) Aux indications que portent les lemmes de Pappus, on reconnaît que le résumé qu'il donne ne suit pas exactement l'ordre d'Apollonius; ainsi cette proposition I devait faire partie du second lieu du Livre II. Mais Fermat ne s'est aucunement proposé de restituer dans sa forme l'œuvre du géomètre de Perge, et, en cela, le but de sa divination diffère de l'objet des travaux plus récents, comme celui de Robert Simson (Glasgow, 1749).

in qua sumatur quodlibet punctum D, et jungantur DA, BD : Aio quadratum AD superare quadratum DB dato.


Quod quidem patet, quum quadratum AD eodem superet quadratum DB, quo quadratum AC superat quadratum CB⁽¹⁾.

Si spatium datum sit maius quadrato AB, punctum C extra lineam AB cadet.

Ad hanc propositionem pertinere possunt duæ sequentes⁽²⁾:

Sint data quatuor puncta A, B, C, D (fig. 25) in recta linea, et sit AB aequalis CD. Sumatur aliud quodecumque punctum, ut N, et jungantur

Fig. 25.



quatuor rectæ NA, NB, NC, ND : Aio duo quadrata AN, ND superare duo quadrata BN, NC rectangulo sub AB in BD bis.

Nam ducatur perpendicularis NI, et primum punctum I extra rectam lineam AD cadat. Patet igitur excessum quadratorum AN, ND super duo quadrata BN, NC, propter omnibus commune quadratum NI, esse id quo duo quadrata AI, ID superant duo quadrata BI, CI. Sed quadrata duo AI, DI, per 4^{am} II, æquantur quadrato DI bis, quadrato AD, et rectangulo ADI bis; quadrata vero BI, CI, per eamdem propositionem, æquantur quadrato DI bis, quadratis BD, CD, et rectangulis sub BD in DI bis, et CD in DI bis, sive, loco horum duorum

⁽¹⁾ C'est l'objet du second lemme de Pappus (prop. 120 de Commandin).

⁽²⁾ Dans l'*Art locis planos et solidos Isagogie*, Fermat indique la généralisation des six premières propositions du Livre II de *Locis planis*, pour un nombre quelconque de points donnés choisis sous aucune condition.


rectangularum, uni rectangulo AD in DI bis, propterea quod AB est aequalis CD : excessus igitur quadratorum AI, ID super BI, CI est idem qui AD quadrati super quadrata BD, CD sive AB. Sed, per 4^{am} propositionem II, quadratum AD duo quadrata AB, BD superat rectangulo sub AB in BD bis. Constat ergo propositum.

Reliquos casus non adjungo neque in hac propositione neque in sequentibus, nam, licet sit facile, esset tediosum.

Si a tribus punctis in recta linea constitutis inflectantur rectae, et sint duo quadrata tertio majora spatio dato, punctum positione datam circumferentiam continget.

Sint data tria puncta A, B, C (fig. 26) in recta linea, et datum quod-

Fig. 26.



libet spatium rectangulo ABC bis majus. Fiat AI aequalis BC, et spatium datum sit aequale rectangulo ABC bis et quadrato IV. Centro I, intervallo IV, circulus VNO describatur in ejus circumferentia punctum quodlibet sumatur, ut N, junganturque NA, NB, NC ad data puncta : aio duo quadrata AN, NC quadratum NB dato spatio superare.

Nam jungatur IN : ergo ex superiori propositione patet duo quadrata AN, NC aequari duobus quadratis IN, BN et rectangulo ABC bis; ergo duo quadrata AN, NC superant quadratum NB quadrato IN et rectangulo ABC bis, et constat propositum.

PROPOSITIO II.

« *Si a duobus punctis inflectantur rectae, et sint in proportione data. punctum continget vel rectam lineam vel circumferentiam.* »

Sint data duo puncta A et C (*fig. 27*), et sit primum data ratio aequalitatis. Dividatur AC bifariam in B, et excitetur perpendicularis BD. Patet quodcumque punctum in ipsa sumatur, ut D, fore rectas AD, DC aequales.

Fig. 27




Sed si data ratio inaequalitatis, et sint duo data puncta A, B (*fig. 28*), ratio ut R ad S. Fiat

$$\text{ut } R \text{ quad. ad } S \text{ quad., ita } AN \text{ ad } NB.$$

Inter AN, NB sumatur media NO, ejus intervalllo describatur circulus OVZ, et in ipsius circumferentia sumatur quodcumque punctum, ut V, junganturque VA, VB : Aio esse in data ratione R ad S.

Fig. 28.



Nam, junctâ VN, ipsi VA parallela sit BI :

$$\text{ut } AN \text{ ad } NO \text{ sive } NV, <\text{ita } NV> \text{ ad } NB,$$

et sunt circa eundem angulum ANV; similia igitur duo triangula ANV, BVN, et angulus VAB angulo VBI aequalis. Sed et AVB, VBI, propter parallelas, aequales sunt; ergo similia triangula AVB, VBI, et est

$$AV \text{ ad } VB = \text{ut } VB \text{ ad } BI,$$

et

ut VB ad BI, < ita NV ad NB, et AN ad NV.

Est igitur

ut VB quad. ad BI quad. >, id est AN ad NB (¹),

id est R quad. ad S quad., ita AV quad. ad VB quad.

Est ergo

AV ad VB = ut R ad S,


et patet propositum.

PROPOSITIO III.

« *Si sit positione data recta linea, et in ipsa datum punctum, a quo ducatur quedam linea terminata, a termino autem ipsius ducatur et ad positionem (²), et sit quod fit a ducta aequalis ei, quod a data, et absissa, vel et ad punctum datum, vel ad alterum datum in linea data positione, terminus ipsius positione datam circumferentiam continget.* »

Sit data recta AB (fig. 29) positione, et in ipsa datum punctum A. Oportet invenire circuli circumferentiam in qua sumendo quodlibet

Fig. 29.



punctum, ut E, et demittendo perpendiculari EI, quadratum AE sit aequalis rectangulo sub data qualibet recta et AI (per quam debemus intelligere in hac propositione *abscissam ad datum punctum*).

Sit recta data AB. Super AB describatur semicirculus; patet, ex constructione, AB in AI aequari quadrato AE.

Sed alius easus est difficilior quando videlicet recta abscinditur ad aliud punctum quam A, ut in hoc exemplo.

(¹) C'est la réciproque qui est démontrée dans le premier lemme de Pappus (prop. 119), concernant le premier lieu d'Apollonius.

(²) Fermat a deviné le sens de ces mots inintelligibles : il faudrait « *ducatur perpendicularis ad positione datam* ».

Sint data duo puncta A, B (*fig. 3o*), et praeterea punctum E in eadem recta linea; recta vero data sit AB. Oportet invenire circuli circumferentiam, ut PIO, in qua sumendo quodlibet punctum, ut I, et demittendo perpendicularē IR, quadratum AI aequetur rectangulo sub recta AB data et recta ER.

Rectangulum BAE ad rectam BA applicetur excedens figura quadrata et faciat latitudinem AP, cui fiat aequalis BO. Super PO descriptus semicirculus præstabit propositum.

[Page 10]



Nam quadratum AI aequatur quadrato AR et quadrato RI; quadratum vero RI aequatur rectangulo PRO, et rectangulum PRO rectangulis ARB, OAP hoc est BPA hoc est BAE, *ut mox demonstrabitur*: quadratum ergo AI aequatur quadrato AR, rectangulo ARB, et rectangulo BAE. Sive quadratum AI aequatur rectangulo BAR (nam huic rectangulo aequaliter quadratum AR et rectangulum ARB) et rectangulo BAE; et adhuc haec duo rectangula faciunt unum rectangulum sub BA in ER, quod proinde quadrato AI est aequale.


Probandum superest rectangulum PRO duobus rectangulis ARB et PBO aequale esse. — Nam, ducendo inter se partes, rectangulum PRO est aequale singulis rectangulis PA in RB, PA in BO (hoc est BO quadrato), AR in RB, AR in BO (id est PA in AR). Sed duo, PA in AR et PA in RB, aequaliter sunt PA in AB, sive AB in BO; una cum BO quadrato, aequaliter sunt AOB hoc est PBO; ergo rectangulum ARB, una cum rectangulo PBO, facit rectangulum PRO. Quid erat demonstrandum.

Diversos casus non prosequor, sed ex iam dictis facillimum erit : videtur tamen alius hujus propositionis casus non omissus, quando videlicet punctum E ultra A ut superius non invenitur.

Sint data duo puncta A et E (*fig. 31*), et recta data AB, et sit inve-

nienda circuli circumferentia, ut NOR, ita ut, sumendo quodlibet in ipsa punctum, ut O, et demittendo OI perpendicularem, quadratum AO sit æquale rectangulo sub BA in EI.

Fig. 31.



Rectangulum BAE ad rectam BA applicetur deficiens figura quadrata in R, et ipsi AR fiat æqualis BN. Super RN descriptus semicirculus præstabit propositum.


Demonstratio vero non est absimilis ei quam in priore casu attulimus.

PROPOSITIO IV.

« Si a duobus punctis datis rectæ lineæ inflectantur, et sit quod ab una efficitur eo, quod ab altera, dato majus quam in proportione, punctum positione datum circumferentiam continget. »

Sint duo puncta A et B (fig. 32), ratio data AI ad BI, spatiu datum BAN (¹). Inter NI et IB media sit IZ (²), enjus intervallo descri-

Fig. 32.



batur circulus ZVR, in quo sumatur quodlibet punctum, ut V, et jungantur VA, VB : Aio quadratum AV quadrato VB majus esse quam in proportione data, IA ad BI, spatio dato BAN.

(¹) Le troisième lemme de Pappus (prop. 121), relatif au second lieu, a pour effet de démontrer que AN doit être plus petit que AI.

(²) Les lemmes 5 et 6 de Pappus (prop. 123 et 124) ont pour objet de prouver que le point Z et son symétrique par rapport au centre I appartiennent au lieu cherché.

Nam fiat ipsi æquale rectangulum VAO, et jungantur OB, NV, VI, et ipsi AV parallela BF. Probandum est rectangulum AVO ad quadratum VB esse ut AI ad IB.

Est

$$\text{ut } NI \text{ ad } IZ \text{ id est } VI, \text{ ita } VI \text{ ad } IB,$$

et sunt circa unidem angulum; ergo duo triangula NIV, VBI sunt similia, et angulus VNB angulo BVF æqualis. Sed angulus VNB angulo VOB est æqualis in eadem sectione, quoniam quatuor puncta N, B, V, O sint in circulo, propter æqualia rectangula BAN, VAO; ergo angulus VOB angulo BVF est æqualis. Sed et angulus OVB angulo VBF, propter parallelas; ergo duo triangula OBV, BVF sunt similia, et

$$\text{ut } OV \text{ ad } BV, \text{ ita } VB \text{ ad } BF,$$


Addatur utrumque communis ratio AV ad VB; ergo ratio composita ex AV ad VB et ex VB ad BF, hoc est ratio AV ad BF, id est AI ad IB, erit eadem rationi \langle composite ex \rangle AV ad VB et OV ad VB, hoc est rectanguli AVO ad quadratum VB. Quod demonstrare oportebat.

Videtur Pappus omissoe hoc loco propositionem huic similem quae ita se habet :

Si a duobus punctis datis rectæ lineæ inflectantur, et sit quod ab una efficitur eo, quod ab altera, dato minus quam in proportione, punctum positione datum circumferentiam contingit.

Sint data duo puncta A et B (fig. 33), ratio AN ad NB, spatium BAT.

Fig. 33.



Inter TN, NB esto media NL, cuius intervallo describatur circuli cir-

cumferentia LYZ, in qua sumpto quolibet puncto Y, jungantur YA, YB : Aio quadratum YA, una cum rectangulo BAT dato, ad quadratum YB esse ut AN ad NB.


Nam fiat YAR æquale BAT, et jungantur TY, RB, YN, et ipsi AY parallela BV. Propter BAT, YAR æqualia rectangula, probabitur angulus YTB angulo YRB æqualis, et reliqua ut in superiori demonstracione.

PROPOSITIO V.

« Si a quocumque datis punctis ad punctum unum inflectantur rectæ lineæ, et sint species, que ab omnibus fiunt, dato spatio æquales, punctum contingit positione datum circumferentiam. »

Sint data duo primum puncta A, B (fig. 34), que per rectam AB conjungantur. Bifariam scilicet in E; centro E, intervallo quoenamque,

Fig. 34.



ut EI, circulus describatur, ut ION : Dico, quodenique punctum in ipsis circumferentia sumpseris, ut O, evenire ut quadrata AO, OB simul quadratorum IE, AE sint dupla (¹).


Nam, junctæ rectæ EO, in ipsam, BV, AZ perpendiculares demittantur. In triangulo AEO quadratum AO aequatur quadratis AE, EO et rectangulo OEZ bis; in triangulo OEB quadrata OE, EB aequantur quadrato OB, et rectangulo OEV bis sive OEZ bis (quum EV sit æqualis EZ, propter æquales AE, EB) : ergo, jungendo æqualia æqualibus, quadrata AO, OB et rectangulum OEZ bis aequantur quadratis AE, EB (sive qua-

(¹) C'est le quatrième lemme de Pappus (prop. 122), sur le troisième lieu d'Apollonius: la démonstration de Fermat est différente.

drato EA bis), et quadrato EO bis (id est quadrato HE bis), una cum rectangulo OEZ bis. Auferatur utrimque OEZ bis; supererit verum quod asserebamus, et constat propositum in primo casu.

Sint data tria puncta B, D, E (*fig. 35*) in recta linea, et sit recta BD recta DE major; differentiae inter BD et DE sit tertia pars CD. Centro C,

Fig. 35.



intervallo quocumque, ut CA, describatur semicirculus AMF : Alio quodecumque punctum in ipsius circumferentia sumpseris, ut M, eamdem semper fore summagam trium quadratorum MB, MD, ME.


Nam jungantur MB, MC, MD, ME: ipsi vero CD fiat æqualis EN, et jungatur MN. Quum BD superet DE triplâ CD sive triplâ EN, ergo DN, una cum dupla CD, æquabitur BD; et CN, una cum CD, æquabitur BD. Auferatur utrimque CD; ergo CN æquabitur BC. Quum CD sit æqualis EN, per secundam hujus Libelli propositionem (¹), idem erit semper excessus quadratorum CM, MN super duo quadrate DM, ME. Sed CM quadratum est semper idem: ergo duo quadrata DM, ME semper vel quadrato MN æqualia erunt vel in idem excedent vel in idem deficient. Addatur utrimque quadratum MB: ergo tria quadrata MB, MD, ME duobus quadratis BM, MN vel semper æqualia erunt vel in idem excedent vel in idem deficient. Sed BM, MN quadrata idem semper conflant spatium, ex superiori propositione, propter æqualitatem rectarum BC, CN: ergo quadrata BM, DM, EM idem semper spatium conficiunt. Quod erat demonstrandum.

(¹) Fermat désigne ainsi sa proposition (*p. 30, fig. 25*), comme s'il avait fait un numérotage en dehors de celui des propositions de Pappus.

Demonstratio generalis ejusdem propositionis. — Exponantur primo duo puncta A et E (fig. 36), jungatur AE et bifariam dividatur in C; planum datum sit Z, quod necessario debet esse non minus quadratis duobus AC, CE, ut patet.

Si sit aequale illis duobus quadratis, punctum C tantum proposito satisfaciet, nec erit aliud punctum a quo junctarum ad puncta A, E quadrata simul sumpta aequaliter Z plano.

Fig. 36.



Si sit majus duobus quadratis AC, CE, excessus dimidium aequetur quadrato CB. Centro C, intervallo CB, descriptus circulus satisfaciet proposito. Quod, tanquam a Pappo (¹) demonstratum et ab aliis et proclive nimis, omittemus, ne in facilibus diutius immoremur.

LEMMA AD GENERALEM METHODUM. — Exponantur in 1^a, 2^a et 3^a figura quotlibet puncta data A, B, C, E (fig. 37), et pro numero punctorum

Fig. 37.

A — B — C — D — — — — — E 1^a figura.

A — B — — — — D — C — — — — E 2^a figura.

A — — — — — D — B — C — — — — E 3^a figura

sumatur rectarum, puncto A et reliquis datis terminatarum, pars conditionaria AD, quadrans nempe in hoc exemplo. Sit igitur AD pars quarta rectarum AB, AC, AE; puncti D diversa est positio prout variant casus : *Aio rectas, punctis datis et puncto D a parte puncti A termi-*

(¹) Voir la note de la page 37.

natas, a puncti rectis, punctis datis et puncto D a parte puncti E terminatis:

In 1^a nempe figura, rectam ED aequari rectis AD, BD, CD;

In 2^a figura, rectas ED, CD aequari rectis BD, AD;

Et in 3^a figura, rectas ED, CD, BD aequari <recte> AD.

In 3^a figura, ex hypothesi, quater AD aequatur rectis AB, AC, AE. Dematur utrumque AD ter: remanebit illinc AD semel; sed auferre AD ter ab ipsis AB, AC, AE, idem est atque auferre AD semel ab unaquaque ipsarum AB, AC, AE, quo peracto remanebunt istine BD, CD, ED aequales AD. Quod erat demonstrandum.

Si darentur quinque puncta, AD quinques esset conferenda cum quatror rectis, punctis datis et puncto A terminatis: denique uniformi procederetur in infinitum methodo.

In 2^a figura, AD quater aequatur rectis AB, AC, AE. Auferatur utrumque AD ter et addatur BD; remanebunt AD, BD aequales ED, CD.

In 1^a figura, AD quater aequatur rectis AB, AC, AE. Addatur utrumque BD, CD et dematur AD ter; remanebunt rectae AD, BD, CD aequales rectae DE.

Nec dissimilis est in quotlibet in infinitum punctis methodus, idemque concludetur quacumque ratione varient easus.

LEMMA ALTERUM. — Exponatur in 1^a figura constructio precedens, et sumatur in eadem recta punctum N (fig. 38), utcumque: *Aio quadrata*

Fig. 38.



rectarum, punctis datis et puncto N terminatarum, superare quadrata rectarum, punctis datis et puncto D terminatarum, quadrato DN toties

sumpto quol sunt puncta data, quater nempe in hoc exemplo : — 2^a et 3^a figura varios casus representant.

In 1^a figura, quadrata AN, BN, CN superant quadrata AD, BD, CD, si unumquodque unicuique conferas, quadrato DN ter et rectangulis AD in DN bis, BD in DN bis, CD in DN bis; quadrata igitur AN, BN, CN aequantur quadratis AD, BD, CD, quadrato DN ter, et rectangulis AD in DN bis, DB in DN bis, et CD in DN bis : illud autem patet ex genesi quadrati a binomia radice affirmata effecti (¹). Ex alia autem parte, quadratum EN aequatur quadratis ED, ND, minus ED in DN bis, illudque patet ex genesi quadrati a binomia radice negata effecti. Ergo quadrata quatuor AN, BN, CN, EN aequantur quadratis quatuor AD, BD, CD, ED, quadrato DN quater, rectangulis AD in DN bis, BD in DN bis, CD in DN bis, minus ED in DN bis. Si igitur probaverimus rectangula negata aequivalere affirmatis, manebit veritas propositionis stabilita : nempe quadrata AN, BN, CN, EN superare quadrata AD, BD, CD, ED quadrato DN quater.

Probandum igitur rectangulum ED in DN bis aequari rectangulis AD in DN bis, BD in DN bis, CD in DN bis, et, omnibus ad DN < bis > applicatis, rectam ED aequari rectis AD, BD, CD. Quod quidem ita se habere, superius lemma demonstravit.

Varios casus non moramur. — Si sint quinque puncta, quadrata, punctis datis et puncto N terminata, superabunt quadrata, punctis datis et puncto D terminata, quintuplo quadrati DN : nee differt a tradito easu ulterior demonstratio.

Inde patet summam quadratorum, puncto D terminatorum, esse minimam.

Dum tibi loquimur, scrupulosam nimis casuum observationem non adjungimus; conclusio secundi lemmatis semper eo deducetur, ut probentur rectangula omnia ex una parte affirmata aequari negatis ex altera, ideoque res ad primum lemma deducetur.

PROPOSITIO PRIMA GENERALIS. — Exponatur superior figura, et sint data

(¹) VIÈTE, *Ad logisticam speciosam notae priores*, prop. XI (éd. Schooten, p. 16-18).


quatuor puncta in recta AE : A, B, C, E. Esto AD quarta pars (conditionaria nempe) rectarum AB, AC, AE, et sit datum Z planum. *Proponitur incircuire circulum in quo sumendo quodlibet punctum et ab eo jungendo rectas ad puncta data, quadrata junctorum simul sumpta æquantur spatio dato.*

Z planum debet esse majus quatuor quadratis AD, BD, CD, ED, ut locum habeat propositio, ex superius demonstratis.

Æquetur igitur quatuor illis quadratis et praeterea quadruplo quadrati DN. Centro D, intervallo DN, descriptus circulus prestabit propositum.

Nam sumatur primo punctum N ex ultravis parte (fig. 39). Demonstratum est secundo lemma quadrata AN, BN, CN, EN æquari qua-

Fig. 39.



dratis AD, BD, CD, ED et praeterea quadrato DN quater. At quadrata AD, BD, CD, ED, una cum quadrato DN quater, æquantur Z piano; ergo quadrata quatuor AN, BN, CN, EN æquantur Z piano, hoc est spatio dato. Quod erat demonstrandum.

Excitetur deinde perpendicularis DM et jungantur AM, BM, CM, EM: Alio quatuor illa quadrata æquari spatio dato Z piano.

Nam

quadratum AM æquatur quadrato AD et quadrato DM,
quadratum BM æquatur quadrato BD et quadrato DM,
quadratum CM æquatur quadrato CD et quadrato DM,
quadratum EM æquatur quadrato ED et quadrato DM;

ergo quatuor quadrata AM, BM, CM, EM æquantur quadratis quatuor AD, BD, CD, ED, una cum quadrato DM (sive DN) quater. At quadrata AD, BD, CD, ED, una cum quadrato DN quater, æquantur Z piano seu spatio dato; ergo quadrata quatuor AM, BM, CM, EM æquantur spatio dato. Quod erat demonstrandum.

Sed sumatur ubicumque punctum M (*fig. 40*), a quo demittatur perpendicularis MO. — Similiter probabitur quadrata AM, BM, CM, EM aequari <quadrato OM quater, una cum > quadratis AO, BO, CO, EO quae, ex secundo lemmate, aequantur quadratis AD, BD, CD, ED et præterea quadrato OD quater. Ergo quadrata quatuor AM, BM, CM, EM aequantur quadratis AD, BD, CD, ED, una cum quadrato OD quater et

Fig. 40.




præterea quadrato OM quater. Sed quadratum OD quater, una cum quadrato OM quater, aequatur quadrato DM quater, sive quadrato DN quater: sunt enim DM, DN ex centro aequales inter se. Igitur quadrata AM, BM, CM, EM aequantur quadratis AD, BD, CD, ED, una cum quadrato DN quater, ideoque spatio dato Z piano sunt aequalia. Quod erat demonstrandum.

Si compleantur circuli, eadem demonstratio in aliis semicirculis locum habebit et ad quotlibet puncta eadem facilitate et argumentatione extendetur; semper enim toties sumentur quadrata DM, DN, DO, quot erunt puncta, nec faltet ratiocinatio.

Inde sequitur corollarium cuius usus in sequenti propositione.

Exponantur quotlibet puncta data, verbi gratia, tria A, B, E (*fig. 41*) et inveniendus circulus <sit> NM, in quo sumendo quodlibet punc-

Fig. 41.




tum, ut M, et jungendo rectas AM, BM, EM, quadrati AM duplum (verbi gratia), una cum quadratis BM, EM, aequetur spatio dato.

Eo casu sumenda est ad constructionem recta AD pars quarta rectarum AB, AE, quia hoc casu puncum A gerit vicem duorum punctorum, et idem est ac si diceretur : datis punctis quatuor A, A, B, E, invenire circulum NM, in quo sumendo quodlibet punctum, ut M, quadrata quatuor AM, AM, BM, EM aequentur spatio dato.

Idem est intelligendum in alio quovis puncto et alia qualibet ratione multiplici. — Nam proponatur quadratum AM (*fig. 42*), una cum qua-

Fig. 42.




drato BM bis et quadrato EM, aequari spatio dato, sumenda est AD quarta pars rectarum AB bis et AE.

Quod advertisse et monuisse fuit necesse, nec indiget res majori explicatione.

PROPOSITIO ALTERA. — Exponantur quolibet puncta data in recta AE (*fig. 43*), quatuor, verbi gratia, A, B, C, E, et punctum Q extra rectam

Fig. 43.



AE. Quæritur circulus, ut MI, in quo sumendo quodlibet punctum, ut I, quadrata AI, BI, CI, EI, QI aequentur spatio dato.

Demittatur in rectam AE perpendicularis QR, et rectarum AR, AB, AC, AE sumatur pars conditionaria (quintans nempe in hac specie in qua dantur quinque puncta) AD, et excitata perpendiculari DO, demittatur in ipsam perpendicularis QO. Rectae QR sumatur pars conditionaria (quintans nempe) RF sive DN, et sit spatium datum aequale quinque quadratis AD, RD, BD, CD, ED et præterea Z plano. Z planum aequetur <quadrato> DN quater (pro numero nempe punctorum in recta AE datorum), quadrato NO, et præterea quadrato NM⁽¹⁾ quinquies (pro numero omnium punctorum datorum) : Aio circum centro N, intervallo NM, descriptum præstare propositum.

Sumatur in eo quodlibet punctum, ut I, et junctis AI, BI, CI, EI, QI, ducatur VIX parallela AE, et IY parallela OD. Patet quadratum DI quater, una cum quadrato OI, aequari Z plano, ex corollario præcedentis propositionis : punctum enim D gerit vicem quatuor punctorum. Quum igitur DN sit quintans OD, patet quadratum DI quater, una cum quadrato OI, aequari quadrato DN quater, quadrato ON, et quintuplo quadrati NM. Sed, per constructionem, quadratum DN quater, una cum quadrato ON et quintuplo quadrati NM, aequatur Z plano; ergo quadratum DI quater, una cum quadrato OI, aequatur Z plano.

Sed quadratum DI quater aequatur quadrato DX quater et quadrato XI quater, et quadratum OI aequatur quadrato OX et quadrato XI; ergo Z planum aequatur quadrato DX (sive IY) quater, quadrato XO (sive VQ) semel, et quadrato XI quinquies. Addantur utrimque quadrata quinque AD, RD, BD, CD, ED, fiet inde : spatium datum, hæc enim quinque quadrata cum Z plano, ex hypothesi, aequantur spatio dato; inde vero : quinque quadratis AI, BI, CI, EI, QI, quæ proinde aequabuntur spatio dato.

Hoc ut constet, ex secundo lemmate, quadrata AD, RD, BD, CD, ED, una cum quadrato DY quinquies, aequabuntur quadratis AY, RY, BY, CY, EY. Igitur quadrata AD, RD, BD, CD, ED, addita quadrato IY quater, VQ semel, et DY quinquies, aequabuntur quadratis AY, RY,

⁽¹⁾ Les lemmes 7 et 8 de Pappus (prop. 123 et 126) peuvent être rapportés à la détermination du point M.

BY, CY, EY, una cum IY quater et VQ semel. Singulis quadratis AY, BY, CY, EY addatur quadratum IY, sicut quadrata AL, BL, CL, EL aequalia quadratis AY, BY, CY, EY et praeterea quadrato IY quater; igitur quadrata AD, RD, BD, CD, ED, addita quadrato IY quater, VQ semel, et DY quinque, aequabuntur quadratis AL, BL, CL, EL et praeterea quadrato IY et quadrato VQ semel. Sed quadratum IY sive VI, una cum quadrato QV, aequatur quadrato QI; igitur quadrata AR, RD, BD, CD, <ED>, addita quadrato IY quater, VQ semel, et DY quinque, aequabuntur quadratis AL, BL, CL, EL et QI.


At probatum est quadrata illa omnia aequari spatio dato; ergo quadrata quinque AL, BL, CL, EL et QI aequantur spatio dato. Quod erat demonstrandum.

Inde facillime deducitur spatium datum aequari quadratis AN, BN, CN, EN, QN et quintuplo quadrati NM, quod tanquam facile praeterrmittimus.

Imo et ad quodlibet puncta produetur artificium eadem ratione.

Si enim dentur duo puncta Q et L (fig. 44) extra lineam, perfecta con-

Fig. 44.




structione, ut vides, sumetur AD sextans rectarum AR, AS, AB, AC, AE; rectarum QR et LS sextans DN sumetur. Spatium datum fiet aequale

quadratis AD, RD, SD, BD, CD, ED, et præterea quadrato DN quater, NO semel, NP semel, et NM sexies; et reliqua perficiuntur eadem ratione, semperque punctum D vicem geret omnium punctorum in recta AE datorum, et puncta P, O vicem gerent datorum punctorum Q et L; et cætera in infinitum uniformi methodo conserventur, et demonstrabuntur.

Sed quoniam multiplices casus oriuntur ex diversa rectæ assumpta, duo vel plura puncta contingentis, positione, dum puncta reliqua diversas ex parte qualibet rectæ assignatae sortiuntur positiones, licet unicuique casui sua competant compendia, placet in artis specimen *generalius ostendere et construere.*

Dentur quotlibet puncta A, B, C, D, E, F (fig. 45), sive in eadem recta, sive in diversis. Sumatur in eodem plano recta quævis SR, ita

Fig. 45.



nt omnia puncta data sint ex una parte rectæ SR. Demisis perpendicularibus AG, BH, CI, DK, EM, FN, sumatur rectarum GH, GI, GK, GM et GN pars conditionaria $\angle GL$, sextans nempe in hoc casu. Excitatetur perpendicularis LO, a quo resecetur LO pars conditionaria, sextans nempe, rectarum AG, BH, CI, KD, EM, FN, et sit spatium datum æquale quadratis AO, BO, CO, DO, EO, FO et sextuplo quadrati OP; circulus centro O, intervalllo OP, descriptus satisfaciet propositioni. — Nec difficilis est inventio ei qui superiores noverit.


PROPOSITIO VI.

“ *Si a duobus punctis datis inflectantur recta linea; a puncto autem ad positione ductam lineam abscissa a recta linea positione data ad datum punctum, et sint species ab inflexis æquales ei, quod a data, et abscissa continetur, punctum ad inflexionem positione datam circumferentiam continget.* ”

Descripti propositionem quemadmodum reperitur apud Pappum ex versione Federici Commandini, sed vel in textu graeco vel in interpretatione mendum esse non dubito : sensum propositionis exponam (¹).

Sint duo puncta A et B (fig. 46). Oportet invenire circumferentiam,

Fig. 46.



ut NOB, in qua sumendo quodlibet punctum, ut O, et jungendo rectas OA, OB, et demittendo perpendicularē OI, rectangulum sub recta data in AI æquetur duobus quadratis AO, OB.

Sit primum AB recta data, qui casus satis est facilis.

Sumatur ipsius AB dimidium BN, superque BN semicirculus describatur : aio satisfacere proposito : hoc est, si sumatur, verbi gratia, punctum O, rectangulum BAI duobus quadratis AO, OB æquale esse.

Nam AO quadratum æquatur AI quadrato et IO quadrato. Si a rectangulo BAI auferatur quadratum AI et quadratum IO sive rectangulum _{AI} BI in IX, superest rectangulum sub BI in AN sive in NB,

(¹) La version de Commandin est inintelligible ; le sens du texte de Pappus paraît être le suivant, plus général que celui adopté ici par Fermat :

Soient donnés deux points A et B, une longueur α , une droite OX et un point O sur cette droite, eufin une direction telle que OY, à laquelle soit parallèle MP passant par un point P de OX, le lieu du point M sera un cercle si


$$\overline{AM}^2 + \overline{MB}^2 = \alpha > OP.$$

quod probandum est esse æquale quadrato BO, et patet ex constructione ita se habere.

Secundus casus est quando recta data major est recta AB, cujus constructionem dabimus, modo recta data sit minor duplā AB.

Sint data duo puncta A et B (*fig. 47*), et recta AL, duplā AB minor ex hypothesi. Oportet facere quod proponitur.

Fig. 47.



Recta AB bifariam secetur in N, et fiat NE ipsius BI dimidia, quod ex constructione licet. Rectangulum HBN ad rectam BE applicetur excens figura quadrata, et faciat latitudinem rectam EV, cui fiat æqualis recta BZ, et super VZ describatur semicirculus VLZ : Aio satisfacere proposito.

Nam, junctis LA, LB et demissa perpendiculari LO, cujus primus casus sit inter E et B, patet, ex demonstratis ad propositionem III Apollonii^(*), rectangulum EOB, una cum rectangulo VEZ sive NBI, aequari quadrato OL. Addatur utrimque quadratum OB : rectangulum EBO, una cum NBI, aequabitur quadrato LO et quadrato OB. Duplieetur : rectangulum EBO bis, una cum rectangulo NBI bis sive solo ABI, aequabuntur quadratis LO, OB, bis. <Addatur utrimque rectangulum sub NE in OB bis : rectangula EBO bis et NE in OB bis>, sive AB in BO semel, una cum AB in BI, aequabuntur quadratis LO, OB, bis, una cum rectangulo sub NE in OB bis sive IBO semel, ex constructione. Utrumque auferatur quadratum OB : supererit AOB, una cum ABI, æquale quadrato LO bis, quadrato OB semel, et rectangulo IBO. Utrumque IB in BO auferatur, nempe illine ex rectangulo ABI : supererit AO in OB, una cum AO in BI, sive solum rectangulum IOA æquale quadrato LO bis et quadrato OB semel. Addatur utrimque quadratum AO : erit rectan-

(*) Dans le présent livre, p. 34.

gulum LAO quadratis AO, OB, una cum LO quadrato bis, aequale, id est duobus tantum quadratis AL et LB. Quod erat faciendum.

Casus alios praetermitto.


PROPOSITIO VII.

« *Si in circulo positione dato sit datum punctum, perque ipsum agatur quadam recta linea, et in ipsa punctum extra sumatur; sit autem quod fit a linea ducta usque ad punctum intra datum aequale ei quod a tota et extra sumpta, vel soli, vel una cum eo quod duabus, quae intra circumculum, portionibus continentur: punctum extra sumptum positione datam rectam lineam continget.* »

Haec propositio duas habet partes, quarum prior est apud ipsum Pappum (¹), propos. 159 libri VII, secunda per additionem aequalium ex priore derivari facile potest : Pappi igitur demonstrationem tantum adducemus.

« Sit circulus circa diametrum AB (fig. 48), et AB producatur,

Fig. 48.



« sitque ad quilibet rectam lineam DE perpendicularis. Rectangulo autem AFB aequale ponatur quadratum ex FG : Dico, si quocumque sumatur punctum, ut E, atque ab eo ad punctum G recta linea ducta producatur ad H, rectangulum etiam HEK quadrato ex EG aequale esse. »

(1) Cette proposition de Pappus est le 33^e lemme sur les *Porismes* d'Euclide. Fermat la reproduit textuellement d'après Commandin, mais en y intercalant le commentaire de ce dernier [alinéa mis entre crochets] et sauf une simplification apportée par lui à ce commentaire [texte en italique] : voir les variantes.

» Jungantur AE, BL. Erit angulus ad L rectus; sed et rectus qui
» ad F; rectangulum igitur AEL est aequale et rectangulo AFB et qua-
» drato ex FE. »

[« Quoniam enim angulus ALB rectus est aequalis recto AFE, sunt
» quatuor puncta L, B, F, E in circulo ac propterea rectangulum FAB
» aequale rectangulo EAL. Quadratum autem ex AE est aequale duobus
» quadratis ex AF, FE; sed quadrato ex AE aequalia sunt utraque rec-
» tangula AEL, EAL, et similiter quadrato ex AF aequalia utraque
» rectangula AFB, FAB; ergo rectangula AEL, EAL aequalia sunt rec-
» tangulis AFB, FAB, et quadrato ex FE. Quorum rectangulum FAB
» est aequale rectangulo EAL: reliquum igitur rectangulum AEL rec-
» tangulo AFB et quadrato ex FE aequale erit. »]

« Rectangulum autem AEL aequale est rectangulo HEK, et rectan-
» gulum AFB quadrato ex FG: ergo rectangulum HEK quadratis ex EF,
» FG, hoc est quadrato ex EG, est aequale. »

PROPOSITIO VIII ET ULTIMA.

« Et si hoc quidem punctum contingat positione datam rectam lineam.
» circulus autem non ponatur, que sunt ad ultrasque partes dati puncti,
» contingent positione eandem datam circumferentiam. »

Hæc propositio est conversa praecedentis et ex ea facile elici potest
hujus demonstratio, si contraria via utamur.

Determinationes et easus non adjungimus, quia ex constructione et
demonstratione satis patent.

DE CONTACTIBUS SPHERICIS.

Apollonii Pergaei doctrinam περὶ ἐπαφῶν restituit eleganter Apollonius Gallus aut sub illius nominis larya Franciscus ille Vieta Fontenaeensis (¹), cuius mirae in Mathematicis Incubrationes Veteri Geometriae felices præstitere suppetias. Verum qui materiam hanc contactum, quæ hactenus substituit in planis, ulterius promoverit et ad sphaerica problemata evahere sit ausus, adhuc, quod sciām, exstitit nemo; præclara tamen inde problemata deduci et ad elegantem sublimiorum problematum constructionem facillime derivari patebit statim. Quærenda itaque sphæra quæ per data puncta transeat ant spheras et data plana contingat. Quindecim problematis totum negotium absolvetur.

PROBLEMA I.

Datis quatuor punctis, spharam invenire quæ per data transeat.

Dentur quatuor puncta N, O, M, F (fig. 49), per quæ sphæra describenda est.


Sumptis ad libitum tribus N, O, M, circa triangulum NOM, quod in uno esse plāno constat ex Elementis, describatur circulus NAOM, quem et magnitudine et positione dari perspicuum est. Esse autem circulum NAOM in superficie inveniendæ sphærae patet ex eo quod, si sphæra plāno secetur, sectionem dat circulum; at per tria puncta N, M, O unius tantum circulus describi potest quem jam construximus: quum igitur tria puncta N, O, M sint in superficie sphærae quesitæ, ergo

(1) *Four plus hanc*, page 4, note 3.

planum trianguli NOM sphaeram quæsitam secat secundum circulum NAOM, quem ideo in superficie sphaeræ esse concludimus.

Sit ipsis centrum C, a quo ad planum circuli exicitur perpendicularis CEB; patet in recta CB esse centrum sphaeræ quæsiteæ. A puncto F in rectam CB demittatur perpendicularis FB, quam et positione et magnitudine dari perspicuum est. A puncto C ducatur ACD ipsi FB

Fig. 40. (1).



parallelæ; erit igitur angulus BCA rectus. Sed et recta BC est perpendicularis ad planum circuli; ergo recta ACD est in plano circuli, et datur positione; dantur itaque puncta A, D, in quibus cum cirento concurrit.

Ponatur jam factum esse, et centrum inveniendæ sphaeræ esse E, quod quidem in recta CB reperiri jam diximus ex Theodosio (2). Junctæ rectæ FE, AE, ED erunt æquales, quin tria puncta, nempe F ex hypothesi et A et D ex demonstratis, sint in superficie sphaerica. At tres rectæ FE, AE, ED sunt in eodem plano: quum enim rectæ FB, ACD sint parallelæ, erunt in eodem plano; sed et recta CB, ideoque tres FE,

(1) On a conservé, pour les figures de ce Traité, qui représentent des constructions dans l'espace, le mode de tracés suivi dans l'édition des *Faria*, quelque différentes que soient à cet égard les habitudes modernes.

(2) Theodosii Tripolitæ Sphaericorum Libri tres, nusquam autem græce excusi. Idem latine redditi per Joannem Penam, Regium Mathematicum. — Ad illustrissimum principem Carolum Lotharingum cardinalem. — Paris, André Wechel, 1558. — (Fermat cite ici le corollaire de L. 2.)


AE, DE. Si igitur circa tria puncta data A, E, D describatur circulus, ejus centrum E erit in recta CB, ac proinde et sphærae quæsitæ centrum et sphæra ipsa non latebunt.

PROBLEMA II.

Datis tribus punctis et piano, invenire sphæram que per data puncta transcat et planum datum contingat.

Dentur tria puncta N, O, M (fig. 5o), per quæ circulus descriptus MEON; erit ad superficiem sphæricam quæsitam, ex jam demonstratis, et in excitata ad planum circuli recta IBA invenietur centrum sphærae

Fig. 5o.



quam quærimus. Concurrat recta IBA cum piano dato in puncto A; dabitur igitur punctum A positione. A centro circuli MEON demittatur perpendicularis in planum datum ID; dabitur igitur punctum D, ideoque et recta AD positione et magnitudine, et pariter rectae ID et IA. Dabitur igitur planum trianguli ADI positione; datur autem et planum circuli MON positione: ergo communis illorum planorum sectio EIF dabitur positione, ideoque dabuntur puncta E et F in circulo.

Sit factum et centrum sphærae quæsitæ punctum B. Jungantur rectæ BE, BF, et rectæ ID parallela ducatur BC. Qnum triangulum ADI et recta EIF sint in eodem piano, ergo rectæ EB, BF, BC erunt in eodem piano;

sed recta ID est perpendicularis ad planum datum : ergo recta BC, ipsi parallela, est etiam perpendicularis ad planum datum. Quoniam igitur sphæra describenda planum AD datum contingere debeat, ergo ab ipsius centro demissa in planum perpendicularis BC dabit punctum contactus C; rectæ igitur BC, BE, BF erunt æquales et probatum est eas esse in eodem plano positione dato, in quo et recta AD.


Eo itaque deducta est quæstio ut, datis duobus punctis E et F et recta AD in eodem plano, queratur circulus qui per data duo puncta transeat et rectam datum contingat : cui problemati satisfecit Apollonius Gallus (¹); dabitur igitur centrum sphærae B et omnia constabunt.

PROBLEMA III.

Datis tribus punctis et sphæra, invenire sphæram qua per data puncta transeat et sphæram datum contingat.

Dentur tria puncta M, N, O (fig. 51), et sphæra IG; datur cir-

Fig. 51.



culus MON in sphæra quæsita. Ad planum circuli erecta perpendicularis FCB, ut supra, contingebit centrum sphærae quam quærimus. A centro I sphærae datae demittatur in rectam FB perpendicularis IB, quæ

(¹) Probl. II (VIÈTE, édition Schooten, page 326).

dabitur positione et magnitudine. A centro F ipsi parallela ducatur ED, quæ erit ex jam demonstratis in plano circuli; et dabuntur puncta E et D.

Sit factum et centrum sphaera quæsita C : ergo rectæ IC, CE, CD erunt in eodem plano, quod et datum est, quum dentur puncta I, E, D. Contactus autem duarum sphaerarum est in recta ipsarum centra connectente : ergo tanget sphaera quæsita sphaeram datam in puncto G; recta igitur IC superabit rectas CE, CD radio IG. Centro I, intervalllo radii sphaerici dati, describatur circulus in plano dato rectarum IC, CE, ED; transibit igitur per punctum G, et circulus ille positione et magnitudine dabitur; sed et puncta E et D in eodem plano.


Eo itaque deducta est questio ut ex Apollonio Gallo (¹) quaeratur methodus qua, datis duobus punctis et circulo in eodem plano, inventiatur circulus qui per data duo puncta transeat et circulum datum contingat.

PROBLEMA IV.

Datis quatuor planis, invenire sphaeram quæ data quatuor plana contingat.

Dentur quatuor plana AH, AB, BC, HG (fig. 52), que a sphaera quæsita contingi oporteat.

Fig. 52.




Sint duo plana AF, FD (fig. 53) quæ ab eadem sphaera contingantur. Bisecetur ipsorum inclinatio per planum BFHC; patet centrum

(1) Probl. VIII (VIIIE, édition Schooten, p. 333).

sphaeræ quæ duo plana AF, FD contingit, esse in plano bisecante, ut videatur inutile in re tam proelivi diutius immorari. Si plana AF, FD essent parallela, sphaeræ centrum esset in plano ipsis parallelo et intervallum ipsorum bisecante.

Fig. 53.



Hoc posito, propter plana CB, BA (*fig. 52*) positione data, < est centrum sphaeræ quæsitæ ad planum positione datum, > quod nempe datorum CB, BA planorum inclinationem datam bisecat. Sed, propter duo plana BA, AH, est idem centrum sphaeræ quæsitæ ad aliud planum positione datum; ergo communis sectio duorum planorum positione datorum, quorum alterum inclinationem planorum CB, BA, alterum inclinationem planorum BA, AH bisecat, dabit rectam positione datum, in qua invenienda sphaeræ centrum erit. Sit illa recta FE; sed, propter duo plana AH, HG, est etiam centrum sphaeræ quæsitæ ad aliud planum positione datum, cuius concursus cum recta FE positione data dabit punctum D, quod patet esse sphaeræ quæsitæ centrum; et reliqua constabunt.

PROBLEMA V.

Datis tribus planis et puncto, incircire sphaeram quæ per punctum datum transeat et plana data contingat.


Sint data tria plana AB, BC, CD (*fig. 54*) et punctum H: quærenda sphaera quæ, data tria plana contingens, transeat per punctum H.

Sit factum: tria plana data, ex præcedentis propositionis ratiocinio, dabunt rectam positione datum, quæ sedes erit centri sphærici quæsiti.

Sit illa GE, in quam a puncto dato H demittatur perpendicularis HH, quæ et positione et magnitudine dabitur. Producatur ad F, ut sit HF æqualis HH; dabitur punctum F.

Quum autem sphæra quæsitæ centrum sit in recta GE, ad quam ducta est perpendicularis HF bifariam secta in I, ejus unum ex extremis H est ad superficiem sphæricam ex hypothesi, erit et alterius extreum F etiam ad sphæricam superficiem. Imo et circulus, centro I,

Fig. 54.



intervallo HI descriptus in plano recto ad rectam GE, erit ad superficiem sphærae; datur autem ille circulus positione et magnitudine. Dato autem circulo sphærico positione et magnitudine et aliquo plato ut AB, datur, ex facili propositionis secundæ hujus consecratio, sphæra ad ejus superficiem sit circulus datus et quæ planum datum contingat; deducta est itaque quæstio ad secundam hujus, nec reliqua latebunt.

PROBLEMA VI.

Datis tribus planis et sphæra, invenire sphæram que datam sphæram et plana data contingat.


Dentur tria plana ED, DB, BC (fig. 55) et sphæra RM. Construenda est sphæra que datam sphæram et tria pariter plana contingat.

Sit factum et sphæra ERCA satisfaciat proposito, sphæram nempe in puncto R et plana in punctis E, A, C contingens. Sphæra ERCA centrum sit O; junctæ RO, EO, AO, CO erunt æquales. Sed et recta OR transbit per datæ sphærae centrum M, et rectæ EO, OA, OC erunt perpendiculares ad plana data DE, DB, BC. Fiant rectæ OM æquales rectæ

OV, OG, OI, et per puncta V, G, I intelligantur duci plana VP, GH, IN, datis ED, DB, BC parallela.

Quum recta OR aequalis sit OE, et ablata OM ablatae OV, erit reliqua RM reliqua VE aequalis; datur autem magnitudine RM, quum sit radius sphærae datae: datur igitur et VE magnitudine. Quum autem OE sit perpendicularis ad planum DE, erit etiam perpendicularis ad planum PV, plano DE parallelum; recta igitur VE erit intervallum planorum DE et PV. Sed datur VE magnitudine ex demonstratis; ergo datur planorum DE, PV intervallum. Sunt autem parallela haec duo plana

Fig. 55.



et datur DE positione ex hypothesi; datur igitur et PV positione. Similiter probabitur plana GH, IN dari positione, et rectas OV, OG, OI ad ipsa esse perpendiculares et aequales rectae OM. Sphæra igitur, centro O, intervallo OM descripta, plana PV, GH, IN positione data contingit. Datur autem punctum M, quum sit centrum sphærae datae.

Eo itaque deducta est quæstio ut, datis tribus planis PV, GH, IN et puncto M, inveniatur sphæra quæ per datum punctum M transeat et data plana PV, GH, IN contingat: hoc est, deducitur quæstio ad precedentem.

Nec absimili in sequentibus artificio, quum nulla in datis puncta reperientur, sed sphærae tantum aut plana, in locum unius ex sphæris punctum datum substituetur.


PROBLEMA VII.

Datis duobus punctis et duobus planis, invenire spharam qua per data puncta transeat et plana data contingat.

Dentur duo plana AB, BC (fig. 56), et duo puncta H, M. Quærenda sphaera qua per puncta H et M transeat et plana AB, BC contingat.

Jungatur recta HM et bisecetur in I; punctum I dabitnr. Per punctum I trajiciatur planum ad rectam HM rectum. Quum sphaerica superficies puncta H, M contineat, certum est centrum sphaeræ esse in plano ad rectam HM normali et per punctum I transeunte. Datur autem hoc planum positione, quum recta HM et punctum I sint data positione; ergo centrum sphaeræ, propter puncta H et M, est ad planum datum.

Fig. 56.




Sed et propter plana AB, BC, ut jam superius demonstravimus, est ad aliud planum datum: ergo est ad rectam positione datam. Sit illa GE, in quam demissa ab uno ex punctis dati M recta MF $<$ perpendicularis $>$ dabitur positione et magnitudine; et continuata in D, ut sit FD aequalis ME, erit punctum D datum et, ex superius demonstratis, erit etiam ad sphaericam superficiem. Dantur itaque tria puncta H, M, D, per que sphaera quæsita transit; datur etiam planum AB, quod ab eadem sphaera contingi debet: deducta est itaque quæstio ad problema secundum hujus.

Priusquam progrediamur ulterius, præmittenda lemmata quædam facilima.

LEMMA I. — Sit circulus BCD (*fig. 57*), extra quem sumpto quolibet puncto E, trajiciatur per centrum recta EDOB. Ducatur quilibet ECA; patet ex Elementis rectangulum AEC aequari rectangulo BED.

Sit jam sphæra circa centrum O, cuius maximus circulus sit ACDB; si ab eodem puncto E per quodlibet punctum superficie sphaericæ traciatur recta ECA, donec sphæra ex altera parte occurrat, rectangulum AEC erit similiter aequale rectangulo BED.

Fig. 57.



Si enim intelligatur circa rectam immobilem BDE converti et circulus et recta ECA simul, non immutabuntur rectæ EC et EA, quum puncta C et A circulos describat ad axem rectos, nec idcirco rectangulum AEC; erit itaque in quoemque plano aequale rectangulo BED.

LEMMA II. — Sint duo circuli in eodem plano ADE, HLO (*fig. 58*). Per centra ipsorum traciatur recta ACMP, et fiat

ut radius AC ad radius HM, ita recta CP ad rectam MP,


et a puncto P ducatur ad libitum recta POED, ambos circulos secans in punctis O, L, E, D. Demonstravit Apollonius Gallus (¹) rectangula APQ, GPH esse aequalia, et ipsorum cuilibet aequari rectangula DPO, EPL.

In sphæricis idem quoque verum esse sequentium problematum

(¹) VIÈTE (édition Schooten, pages 334-335, lemmes I et II) démontre seulement, de fait, que $APQ = DPO$ et $GPH = EPL$. Mais l'égalité $APQ = GPH$ se déduit aisément de l'hypothèse $\frac{AC}{HM} = \frac{CP}{MP}$.

interest: patet autem ex eo quod, si circa axem AP immobilem tam circuli duo quam recta POLED eodem tempore convertantur, non immutabuntur rectae PO, PL, PE, PD, propter allatam in superiori lem-

Fig. 58.




mate rationem, nee idecirco rectangula; et in quocumque plano constabit propositum.

LEMMA III. — Sint duae sphæræ datae YN, XM (fig. 59), per quarum centra trajiciatur recta RYNXMV, et fiat

ut radius YN ad radium XM, ita recta YV ad rectam VX.

A puncto V ducatur in quolibet plano recta VTS, et sit rectangulum

Fig. 59.



SVT æquale rectangulo RVM. Si describatur sphæra quævis quæ per puncta T, S transeat et unam ex duabus datis contingat, alteram quoque contingat.

Sit enim sphæra OTS, per puncta T et S descripta et sphæram MX

in puncto O contingens, aio sphæram YN etiam a sphæra OTS contacterat iri.

Producatur recta VO, donec sphærae OTS occurrat in Q : rectangulum igitur QVO, ex primo lemmate, est æquale SVT. Sed rectangulum SVT, ex constructione, est æquale rectangulo RVM cui, ex secundo lemmate, est æquale rectangulum sub VO et rectâ per puncta V et O ad superficiem sphæricam sphærae YN productâ : ergo punctum Q est ad superficiem sphærae YN; commune igitur est et superficieis sphærae YN et superficieis sphærae OTS.

Aio has duas spheras in puncto eodem Q se contingere. Ducatur enim a puncto V quælibet recta in quolibet plano \angle per quodlibet punctum \triangleright sphærae OTS, et sit, verbi gratia, VZ, quæ producta secet spheras tres in punctis Z, D, H, K, P, B. Rectangulum ZVB in sphæra OTS, per primum et secundum lemma, est æquale DVP rectangulo, sphæris duabus XM et YN terminato. Sed DV est major rectâ VZ; quum enim sphæra OTS tangat exterius sphæram XM in puncto O, recta secans sphæram OTS prius ipsi occurret quam sphæram XM. Quum ergo probatum sit rectangulum DVP æquari rectangulo ZVB, et recta ZV sit minor rectâ DV, ergo recta PV erit minor rectâ BV; punctum igitur B extra sphæram YN cadet.

Simili ratiocinio concludetur omnia puncta sphærae ambientis exteriorius cadere, praeter punctum Q. Tangit igitur sphæra OTS sphæram YN: quod erat demonstrandum.


Nec absimilis aut difficilior in contactibus interioribus et in omnibus casibus demonstratio.

LEMMA IV. -- Sit planum AC (fig. 6o) et sphæra DGF, enjus centrum O. Per centrum O ducatur FODB perpendicularis ad planum, et a puncto F ducatur recta quævis ad planum, sphæram secans in G et planum in A. Aio rectangulum AFG æquari rectangulo BFD.

Nam secentur sphæra et planum datum per planum trianguli ABF, et fiat circulus GFD in sphæra, in plano autem recta ABC. Quum recta FB sit perpendicularis ad planum AC, erit etiam perpendicularis ad


rectam AC. Habemus igitur circulum DGF et rectam AC in eodem plano, et rectam FDB, per centrum circuli transeuntem, ad AC perpendiculari. Jungatur GD; anguli ad G et ad B sunt recti: ergo quadrilaterum ABDG est in circulo, ideoque rectangulum AFG æquale est rectangulo BFD. Quod etiam in quavis alia sphærae sectione similiter demonstrabitur.

Fig. 60.



LEMMA V. — Sit planum ABD (*fig. 61*) et sphæra EGF, ejus centrum O. Per centrum O trajiciatur recta FOEC perpendicularis ad planum, et in quovis alio piano ducatur recta FGHI, sitque rectangulum IFHI æquale rectangulo CFE. Si per puncta I, H describatur sphæra qua planum AG contingat, eadem sphæra tanget sphæram EGF.

Fig. 61.



Intelligatur construi sphæra HIB, quæ, per puncta I et H transiens, tangat planum AG in puncto B: Alio sphæram EGF contingi a sphæra HIB.

Jungatur recta FB et rectangulo CFE fiat æquale rectangulum BFN: punctum N, per precedentem, erit ad superficiem sphære EGF.

Sed et rectangulum CFE, ex constructione, est aequale rectangulo IFH; rectangula igitur IFH, BFN sunt aequalia, ideoque punctum N est etiam ad superficiem sphæræ IBH.

Probandum jam sphæram EGF a sphæra IBH in puncto N contingi: quod quidem facile est. A puncto enim F, per quodlibet punctum sphæræ EGF, ducatur recta FR, qua sphæram IBH in M et P et planum AC in K secet. Rectangulum KFR, ex precedente lemma, aequatur rectangulo CFE, eni ex constructione aequatur rectangulum IFH, ideoque PFM. Rectangula igitur KFR et PFM sunt aequalia; sed recta KF est major rectâ FP, quia sphæra IBH tangit planum AC in B: ergo recta FR est minor rectâ FM. Punctum igitur R est extra sphæram IBH.

Idem de quocumque alio puncto, in quovis plano, sphæræ EGF, ex utraque puncti N parte, probabitur; manifestum itaque sphæram EGF a sphæra IBH in puncto N contingi.

Hæc lemmata, licet sint facilia, pulcherrima tamen sunt, tertium præsertim et quintum: in tertio quippe infinitæ sunt sphære que per puncta T et S transenntes sphæram XM contingunt, sed omnes illæ in infinitum tangent quoque ex demonstratis sphæram YN; in quinto autem lemma infinitæ sunt sphære que, per puncta I et H transenntes, planum AC contingunt, sed omnes illæ pariter in infinitum sphæram EGF ex demonstratis contingent. His suppositis, reliqua problemata facile exsequemur.

PROBLEMA VIII.


Datis duobus punctis, plano et sphæra, invenire sphæram que per data puncta transeat et sphæram ac planum datum contingat.

Sit datum planum ABC (fig. 62), sphæra DFE et puncta H, M. Per centrum sphæræ datae O in planum ABC datum demittatur perpendicularis EODB: jungatur HE, et rectangulo BED fiat aequale rectangulum HEG; dabitur itaque punctum G.

Datis tribus punctis H, G et M et plano ABC, queratur sphæra, per secundum problema hujus, que per data tria puncta transeat et planum ABC datum contingat.

Sphaera illa satisfaciet proposito : transit quippe per data duo puncta H et M, et planum ABC tangit ex constructione; sed et sphaeram DEF contingit, ex quinto lemma. Nam quum rectangulum HEG aequetur

Fig. 62.




rectangulo BED, omnis sphaera que, per data duo H et G puncta transiens, planum ABC tangit, sphaeram quoque DEF contingit.

PROBLEMA IX.

Datis duobus punctis et duabus sphaeris, invenire sphaeram que per data duo puncta transeat et sphaeras datas contingat.

Fig. 63.



Sint datae due sphaerae AB, DE (fig. 63) et puncta data H et M. Tra-

jiciatur recta AF per centra sphærarum datarum, et

ut radius AB ad radium DE, ita fiat recta BF ad FE;

dabitur punctum F. Fiat rectangulo NFA aequale rectangulum HFG; dabitur punctum G.


Jam datis tribus M, G, H punctis et sphæra DN, quæratur sphæra quæ per data tria puncta transeat et sphæram DN datam contingat, cui problemati satisfaciet tertium problema hujus: continget quoque sphæram $\angle AB >$ ex tertio lemmate, ideoque proposito satisfaciet.

PROBLEMA X.

Dato puncto, duobus planis et sphæra, invenire sphæram que per datum punctum transeat et sphæram ac data duo plana contingat.

Sint duo plana AB, BD (fig. 64), sphæra EGF, punctum H. Per punctum O, centrum sphæræ datae, in quodlibet ex planis demittatur perpendicularis CEOF, et rectangulo CFE fiat aequale rectangulum HFI.

Fig. 64.



Datis duobus punctis H et I et duobus planis AB, BD, quæratur, per septimum problema hujus, sphæra quæ per data duo puncta transeat et duo plana data contingat: continget quoque ex quinto lemmate sphæram, et proposito satisfaciet.

PROBLEMA XI.

Dato puncto, plano et duabus sphæris, invenire sphæram quæ per datum punctum transeat et planum ac spheras duas datas contingat.

Deducetur statim questio simili praecedentibus ratioenio ad problema VIII, *Datis duobus punctis, plano et sphera*, idque beneficio lematis V. Quod si libeat uti lemimate III, deducetur quaestio pariter ad idem problema, alio medio et alia constructione.

PROBLEMA XII.

Dato puncto et tribus sphæris, invenire sphæram quæ per datum punctum transeat et spheras datas contingat.

Huic quoque figuram non assignamus : statim quippe, beneficio lematis III, deducetur quaestio ad problema IX, *Datis duobus punctis et duabus sphæris etc.*

PROBLEMA XIII.

Datis duobus planis et duabus sphæris, invenire sphæram quæ data plana et spheras contingat.

Sit factum. Si ergo sphærica superficie inventæ imaginemur aliam ejusdem centri superficie parallelam, quæ a quæsita distet per radium minoris ex sphæris, tanget hæc nova superficies sphærica plana que a datis distabunt per intervallum ejusdem radii minoris ex sphæris; tanget quoque sphæram cuius radius distabit a radio majoris sphærae datæ per idem radii minoris intervallum, quæque erit majori sphærae concentrica. Dabitur ergo; dabuntur et duo plana datis parallela et per radium minoris ex sphæris ab ipsis distantia. Transbit et hæc nova superficies sphærica per centrum minoris ex sphæris datis, quod quidem datum est; pari igitur quo usi jam sumus in problemate VI artificio, deducetur quaestio ad problema X, *Dato puncto, duobus planis et sphera, invenire etc.*

PROBLEMA XIV.

Datis tribus sphæris et plano, invenire spharam quæ spheras et planum datum contingat.

Simili qua usi sumus via in praecedente et sexto problemate, deducetur quæstio ad problema XI, *Dato puncto, plano, et duabus sphæris etc.*

PROBLEMA XV.

Datis quatuor sphæris, invenire spharam quæ datas contingat.

Sit factum : et, qua usus est methodo Apollonius Gallus (¹) ut problema de tribus circulis ad problema de puncto et duobus circulis deduceret, eadem et simili praecedentibus famosum hoc et nobile problema ad XII, *Datis tribus sphæris et puncto, deducemus.*

Constatit ex omni parte propositum, et illustre accedet Apollonio Gallo complementum. Casus varios, determinationes, et minuta negleximus, ne in immensum excreceret sphaericus de contactibus tractatus.

(¹) Probl. X (VIÉTE, édition Schooten, p. 356).

FRAGMENTS GÉOMÉTRIQUES.


SOLUTIO PROBLEMATIS A DOMINO PASCAL PROPOSITI⁽¹⁾

— — —

Proposuit Dominus PASCAL hoc problema : *Dato trianguli angulo ad verticem et ratione quam habet perpendiculum ad differentiam laterum, incenire speciem trianguli.*

Exponatur recta quavis data AC (fig. 65), super quam portio cir-

Fig. 65.



culi AIFC capax anguli dati describatur. Eo questionem deduximus ut, data basi AC, angulo verticis AIC, et ratione quam habet perpendiculum ad differentiam laterum, quaeratur triangulum.

Ponatur jam factum esse et triangulum quiesitum esse AIC. Demittatur perpendiculum IB et, diviso areu AFC bifarium in F, jungantur

⁽¹⁾ Cette pièce et la suivante ont été publiées par Bossut, l'éditeur des *Oeuvres de Pascal*, 1779 (t. IV, p. 449-51), avec la note suivante : *On a trouvé, parmi les papiers de Pascal, ces deux porismes et le problème suivant, écrits de la main de Fermat; on croit que le lecteur les verra ici avec d'autant plus de plaisir qu'ils n'avoient pas encore été imprimés.*

Nous avons interverti l'ordre des deux pièces, pour rapprocher les deux porismes du Traité de Fermat sur ce sujet. Il est certain, au reste, que l'auteur du problème est Etienne Pascal (le père).

AF, FC (¹) et, juncta IF, demittantur in rectas AI, IC perpendiculares CO, FK. Deinde centro F, intervallo AF, describatur circulus AHGEC, cui rectae CI, IF continuatae occurrant in punctis G, H, E: denique jungatur GA.

Angulus AFC ad centrum duplus est anguli AGC ad circumferentiam; sed angulus AIC aequatur angulo AFC in eadem portione: igitur angulus AIC duplus est anguli AGC. Sed angulus AIC aequatur duobus angulis AGC, IAG: igitur anguli IGA, IAG sunt aequales, ideoque rectae IA, IG. Sed, quum a centro F in rectam GC cadat perpendicularis FK, aequales sunt GK, KC, ideoque KE est dimidia differentia inter rectas CI, IG, hoc est inter rectas CI, IA.

Data est autem ratio perpendiculari IB ad differentiam laterum CI, IA: ergo datur ratio BI ad IK et, singulis in rectam AC ductis, data est ratio rectanguli sub AC in BI ad rectangulum sub AC in IK. Sed rectangulum sub AC in BI aequatur rectangulo sub AI in CO; est enim utrumque duplum trianguli AIC: ergo ratio rectanguli sub AI in CO ad rectangulum sub AC in IK data est.

Datur autem ex hypothesi angulus AIC et rectus est COI ex constructione: ergo datur specie triangulum COI; ratio igitur CO ad CI data est, ideoque rectanguli sub AI in CO ad rectangulum sub AI in IC ratio datur. Sed probavimus rationem rectanguli sub AI in CO ad rectangulum sub AC in IK dari: ergo datur ratio rectanguli AIC ad rectangulum sub AC in IK.

Jam in triangulo AFC datur angulus AFC ex hypothesi: ergo angulus FAC datur, cui aequalis CIF idcirco dabitur. Est autem rectus angulus FKI: ergo triangulum FIK datur specie, ideoque rectae FI ad IF ratio data est, ideoque rectanguli _{AC} in IK ad rectangulum sub AC in IF datur ratio. Probatum est autem dari rationem rectanguli AI in IC ad rectangulum AC in IK: ergo datur ratio rectanguli AI in IC ad rectangulum AG in IF. Est autem rectangulum CIG aequale rectangulo CIA, quia rectae IG, IA sunt aequales, et rectan-

(¹) Dans les deux figures données par Bossut, les lignes auxiliaires AF, FC sont effectivement tracées; on les a supprimées, pour rendre moins compliquées les fig. 65 et 66.

gulo CIG aequatur rectangulum HIE : ergo ratio rectanguli HIE ad rectangulum sub AC in IF data est.


Sit data ratio ED ad AC; quum igitur AC sit data, dabitur ED, que ponatur rectae HE in directum ut in figura prima. Rectangulum igitur HIE ad rectangulum AC in IF est in ratione data ED ad AC; sed, ut DE ad AC, ita DE in IF ad AC in IF: igitur, ut rectangulum HIE est ad rectangulum AC in IF, ita rectangulum DE in IF ad rectangulum AC in IF: rectangulum igitur DE in IF aequatur rectangulo HIE.

Probatum est triangulum AFC dari specie; sed datur basis AC magnitudine: ergo datur AF, ideoque dupla ipsius EH datur.

Equalibus rectangulis DE in IF et HIE addatur rectangulum sub DE in HI: fiet rectangulum sub DE in FH aequale rectangulo DHI. Datur autem rectangulum sub DE in FH, quia utraque rectarum DE, FH datur: datur igitur rectangulum DHI et ad datam magnitudinem DH applicatur deficiens figura quadrata; ergo recta HI datur, ideoque reliqua IF. Datur autem punctum F positione: ergo datur et punctum I et totum triangulum AIC.

Non est difficilis ab analysi ad synthesis regressus; sed, ut omne dubium tollatur, probatur facillime triangulum quæsumum esse simile invento AIC in secunda figura (fig. 66): triangulum autem AIC ex

Fig. 66.



intravis parte puncti F verticem habere potest in æquali a puncto F utrinque distantia; erit enim idem specie et magnitudine, et positio variabit.

Si enim triangulum quæsumum non est simile invento, manente eadem

basi, ejus vertex vel ibit inter puncta F et I, vel inter puncta I et A; ex utravis parte nihil interest, nam de parte FC idem secundum triangulum AIC pari demonstratione concludit.

Sit primum vertex inter A et I et triangulum quæsitus ponatur, si fieri potest, simile triangulo AIC. Jungatur FM et demittatur perpendicularis FP. Erit ratio perpendiculari MN ad MP data ex hypothesi, ideoque æqualis rationi IB ad IK quam probavimus datae æqualem: quod est absurdum.

Quum enim in triangulo FMP angulus ad M aquatur angulo ad I trianguli IFK, erunt similia triangula FIK, FMP. Sed FM est major FI: ergo MP est major IK. Est autem MN minor IB: non igitur eadem potest esse ratio MN ad MP quæ IB ad IK.

Si punctum M sit inter I et F, probabitur augeri perpendicularum et minni differentiam laterum, idque eadem argumentatione, ideoque variare proportionem. Si punctum M sit in portione FC, utemur secundo triangulo AIC et erit eadem demonstratio, ut inutile sit duntius in his casibus immorari.

Constat igitur triangulum quæsitus invento AIC esse simile, et patet proposito esse satisfactum.

Proponitur, si placet, tam Domino PASCAL quam Domino ROBERVAL solvendum hoc problema :

Ad datum punctum in helice Baliani⁽⁴⁾ invenire tangentem.

Quenam autem sit hujusmodi helix novit Dominus ROBERVAL.

Hujus problematis a nobis soluti solutionem a viris eruditissimis exspectamus aut, si maluerint, ipsis impertiemur, imo et generalem de linearum curvarum contactibus methodam.

Sed ne a præsenti materia triangulari vacuis manibus discessisse videamur, proponi possunt haec quæstiones :

Data basi, angulo verticis, et aggregato perpendiculari et differentia laterum, invenire triangulum. *

(4) Voir la Lettre de Fermat à Mersenne, du 3 juin 1636,

Data basi, angulo verticis, et differentia perpendiculari et differentia laterum, invenire triangulum.

Data basi, angulo verticis, et rectangulo sub differentia laterum in perpendicularium, invenire triangulum;

Data basi, angulo verticis, et summa quadratorum perpendiculari et differentia laterum, invenire triangulum;

et multæ similes, quarum enodationes facilius inventuros viros doctissimos existimo, quam de contactu helicis Baliani propositum problema aut theorema.

Sed observandum in quæstionibus de triangulis, quoties problema poterit solvi per plana, non recurrendum ad solidâ. Quod quum norint viri doctissimi, supervacuum fortasse subit addidisse.


— — — — —

PORISMATA DUO (¹).

PORISMA I. - *Datis positione duabus rectis ABE, YBC (fig. 67) sese in puncto B secantibus, datis etiam punctis A et D in recta ABE, querantur*

Fig. 67.

c



duo puncta, exempli gratia, O et N, a quibus si ad quodlibet rectâ YBC

¹. Cette pièce, conservée, comme la précédente, dans des papiers de Pascal aujourd'hui perdus, est un premier essai de l'opusculo suivant, où l'on retrouvera les deux mêmes propositions, comme *Porisma primum* et *Porisma quintum*.

punctum, ut H, recta OHN inflectatur, rectam ABD in punctis I et V secans, rectangulum sub AI in DV aequetur spatio dato, videlicet rectangulo sub AB in BD.


Ita procedit porismatica Euclidis constructio et generalissimam problematis solutionem representabit.

Sumatur punctum quodvis O. Jnngatur recta AO secans rectam YBC in puncto P. A puncto O dueatur recta OQ ipsi ABD parallela et rectae YBC ocurrrens in Q. Ducatur etiam infinita PNM eidem ABD parallela, et juncta QD secet rectam PNM in puncto N. Aio duo puncta O et N adimplere propositum.

Sumpto quippe ubilibet in recta YBC puncto II, et ductis rectis OII, IIH rectae ABD ocurrentibus in punctis I et V, rectangulum sub AI in DV in quibuslibet omnino casibns (tres tantum triplex (¹) figura representat) rectangulo \angle sub \angle AB in BD aequale erit.

PORISMA II. — *Dato circulo ABDC (fig. 68), cuius diameter AG, cens trum M, queruntur duo puncta, ut E et N, a quibus si ad quodvis circumferentie punctum, ut D, inflectatur recta EDN, diametrum in punctis Q et II secans, summa quadratorum QD et DIH ad triangulum QDH habeat rationem datam, idemque in qualibet inflexione generaliter et perpetuo contingat.*

Fig. 68.



A centro M excitetur ad diametrum perpendicularis MB. Fiat ratio data eadem que quadrupla rectae BV ad rectam VM. A puncto V exci-

(¹) Bossut a reproduit, en effet, trois figures dont nous ne donnons ci-dessus que la première; les deux autres en diffèrent en ce que le point arbitraire II est pris, dans la seconde, entre P et B; dans la troisième, entre P et Q.

tetur VE ad diametrum perpendicularis et ipsi VB aequalis. Sumptù rectâ MO ipsi MV aequali, fiat ON aequalis et parallela rectae VE : Dico puncta quæsita esse puncta E et N.

Sumpto quippe quovis in circumferentia puncto, ut D, et junctis ED, ND rectis diametrum in punctis Q et H secantibus, summa quadratorum QD et DH ad triangulum QDH erit, in quocumque casu, in ratione data, hoc est in ratione quadruplae BV ad rectam VM.

Non solum proponitur inquirenda istius porismatis demonstratio, sed videant etiam subtiliores mathematicæ an duo alia puncta praeter E et N possint problemati proposito satisfacere, et utrum solutiones questionis sicut in primo porisme suppetant infinitæ. Si nihil respondeant, Geometriæ in hac parte laboranti non dignabimur optulari.

PORISMATUM EUCLIDEORUM

RENOVATA DOCTRINA ET SUB FORMA ISAGOGES RECENTIORIBUS GEOMETRIS EXHIBITA.

Enumeravit Pappus initio libri septimi libros veterum Geometrarum ad τόπους ἀποτομένουs pertinentes : qui omnes quum temporis injuria perierint, exceptis unico Datorum Euclidis libello et quatuor prioribus Conicorum Apollonii, elaborandum neotericis Geometris maxime fuit ut damnum operum, quæ tentavit « edax abolere vetustas », aliquantis per resarcirent. Et primo quidem subtilissimus ille, nec unquam satis laudatus Franciscus Vieta Apollonii Ηερὶ ἐπαρχῶν libros unico, quem Apollonium Gallum inscripsit, libello feliciter restituit: cuius exemplo se ad eamdem provinciam Marinus Ghetaldus et Wilebrordus Snellius accingere non dubitarunt, nec defuit proposito eventus : libros enim Apollonii Λόγιον ἀποτομῆς, Χωρίον ἀποτομῆς, Διορισμένης τομῆς et Νεύσεων, illorum beneficio vix amplius desideramus. Sequebantur Loci plani, Loci solidi, et Loci ad superficiem. At huic quoque parti

non ignoti nominis Geometrae (¹) succurrerunt, eorumque opera, manuscripta licet et adhuc inedita, latere non potuerunt.

Sed supererat tandem intentata ac velut desperata Porismatum Euclidaeorum doctrina. Eam quamvis « opus artificiosissimum ac perutile ad resolutionem obscuriorum problematum » Pappus asserat, nec superioris nec recentioris ævi Geometrae vel de nomine cognoverunt, aut quid esset solummodo sunt suspicati. Nobis tamen in tantis tenebris dudum cœcuentibus, et qua ratione in hac materia Geometriæ opitularemur elaborantibus, tandem

se clara videndam
Obtulit et pura per noctem in luce refulsi:

nec debuit inventi novantiqui specimen posteris invideri. Postquam enim Sueicum sidus (²) omnibus disciplinis illuxit, frustra scientiarum arcana tanquam mysteria quædam abscondenmus : nihil quippe impervium perspicacissimo incomparabilis Reginae ingenio, nec fas censemus occultare doctrinam quam vel unico dyntaxat aut inspirantis aut mandantis nutu, quandocumque libuerit, detectam iri vix possumus dubitare. Ut antem clarius se prodat totum Porismatum negotium,

(¹) Fermat fait ici allusion à ses propres travaux, *Apollonii Pergaei libri duo de locis planis restituti*, *Ad locos planos et solidos Isagoge*, *Isagoge ad locos ad superficiem*. Quant à ceux des géomètres antérieurs qu'il mentionne, voir plus haut, page 3, note 3.

(²) La date de cet opuscule semble indiquée par ce qu'en dit Boulliau (*Ismaelis Bulliaudi Exercitationes geometricæ tres*: I *circum demonstrationes per inscriptas et circumscriptas figuræ*; II *circum conicarum sectionum quasdam propositiones*; III *de porismatis*. — *Astronomiae Philolaïcie fundamenta*, etc. — Parisiis, apud Sebastianum Cramoisy Regis et Reginae architypographum et Gabrielem Cramoisy, via Jacobæa, sub Cœmisiis, MDCLVII. Cum privilegio Regis), au début de son *Essai sur les Porismes*.

Voici le passage qui en a été reproduit dans les *Faria*, douzième page non numérotée :


« Hanc de porismatis scriptiunculam data mihi occasione composui, quum *ante biennium* vir illustrissimus ac amplissimus Dominus de Fermat, in suprema Curia Tolosana Senator integrissimus et in judiciis exercendis peritissimus, rerum mathematicarum doctissimus, propositiones quasdam subtilissimas et porismata, quæ tam theorematice quam problematicè proponi possunt, ad amicos suos huc misisset. Ex Pappi unius monumentis et Collectionibus Mathematicis porismatum naturam et usum disceere possumus, quum ex veteribus qui hanc Geometriæ partem attigerunt, prater ipsum nullus supersit. Illius tamen sententia legenti statim obvia non est, textusque corruptione et applicationis porismatum defectu obscurior procul dubio evadit. Interea dum tanto viro sua edere libuerit nostra, qualiacumque tandem sint, publici juris facere placevit, ut alios ad eorumdem

celebriores quasdam propositiones porismaticas selegimus, easque Geometris et considerandas et examinandas confidenter exhibemus, ut mox quid sit Porisma et cui maxime inserviat usui innotescat.

PORISMA PRIMUM.

Sint duae rectæ ON, OC (fig. 69), quæ angulum constituant in puncto O et sint ipsæ positione datae; dentur et puncta A et B . A punctis B et

Fig. 69.



A ducantur rectæ BE, AF ipsi OC parallelae et occurrentes rectæ NO productæ in punctis E et F ; jungatur recta AE , quæ rectæ CO productæ occurrat in D ; jungatur itidem recta FB , quæ eidem rectæ CO occurrat

investigationem impelleremus, ipsumque amplissimum Dominum de Fermat ad sua edenda, utinam et ad alia sublimis intellectus sui *Spizax* cum omnibus communicanda, excitaremus. Is enim est quem omnes Europæ Mathematici suspicunt; quem a subtilissimis etatis nostræ Geometris, Bonaventura Cavaliero Bononiae et Evangelista Toricello Florentie, summis laudibus in eorum ferri, ejusque inventa mirabilia predicari auribus meis audivi; quem etiam virum, tam eximiis virtutibus clarum, multaque eruditio ornatum ac in rebus mathematicis oculatissimum, toto pectore veneror ac colo. »

L'opuscule de Fermat sur les Porismes n'aurait donc pas été connu à Paris avant 1654. La dédicace à la reine Christine de Suède est d'ailleurs expliquée par le passage suivant d'une lettre du 25 septembre 1651, adressée à Nicolas Heinsius par Bernard Médon, conseiller au prési fial de Toulouse et ami de Fermat (*Sylloges epistolaram a viris illustribus scriptarum tomus quintus, collecti et digesti per Petrum Burmannum*, Leyde, 1727, t. V, p. 643, l. 24) :


Sicut te amplissimus Fermat, a quo circa mathematicas scientias, quas melius quam quisquam mortalium possidet, nil extorqueri inquam poterit, nisi Reginarum praestantisima Christina velit aliquando post hujus aëi literatorum omnium vota, post Franciae • Cancellorii preces, sua etiam pissa adjungere, quibus, ut puto, non surdus esset. Si tua cura posset id fieri, faceres toti Europe reu pergratissimum. Vale iterum et, quod facis, me constanter amas. »

in C; et ad quodvis punctum rectæ ON, ut V, verbi gratia, inflectantur rectæ AV, BV, ita ut recta AV occurrat rectæ OC in puncto S, recta autem BV eidem OC occurrat in puncto R. Rectangulum sub CR in DS aequale semper erit rectangulo sub CO in OD, ideoque spatio dato.

PORISMA SECUNDUM.

Exponatur parabole quævis NAB (*fig. 70*), cujus diametri qualibet sint BEO. Sumantur in curva duo quævis puncta A et N, a quibus in-

Fig. 70.




flectantur ad aliud quodvis curvae punctum, ut D, rectæ ADN, quæ in diametris puncta E, O, G, Q signent. In eadem diametro absceduntur semper duæ rectæ quæ eamdem servabunt rationem: erit nempe ut OB ad BE, ita QB ad GB, idque in infinitum.

PORISMA TERTIUM.

Esto circulus ejus diameter recta AB (*fig. 71*), cui parallela ut-

Fig. 71.



cumque ducatur NM, circulo in punctis N et M occurrans, et sint data puncta N et M. Inflectatur utecumque recta NBM, quæ secet diametrum


in punctis O et V. Alio dataam esse rationem rectanguli sub AO in DV ad rectangulum sub AV in DO; ideoque, si inflectatur NCM secans diametrum in punctis R, S, erit semper ut rectangulum sub AO in DV ad rectangulum sub AV in DO, ita rectangulum sub AR in DS ad rectangulum sub AS in DR.

Nec difficile est propositionem ad ellipses, hyperolas et oppositas sectiones extendere.

PORISMA QUARTUM.

Exponatur circulus ICH (fig. 72), cujus diameter IDH data, cen-

Fig. 72.



trum D, radius ad diametrum normalis CD. Sumantur in diametro producta puncta B et A data, et sint rectae AI, BH aequales.

Fiat

$$\text{ut } DI \text{ ad IA, ita } DL \text{ ad LI,}$$

et sit recta DR aequalis DL; dabuntur puncta R et L. Jungatur recta CA, cui aequalis ponatur AF ad diametrum perpendicularis, eidemque fiat BG aequalis et parallela. Inflectatur quævis recta ad circulum a punctis F et G, ut FEG, quæ diametrum secet in punctis M et N. Alio


summam duorum quadratorum RM, LN aequari semper eidem spatio dato.

Iisdem positis, in secundo easu, jungatur recta CL, cui æqualis ponatur LP ad diametrum perpendicularis, eidemque æqualis et parallela fiat RZ. Si a duobus punctis Z et P inflectatur quælibet ad circumferentiam recta, ut PVZ, secans diametrum in punctis K et T, quadratorum AT et BK aggregatum aequabitur semper alteri spatio dato.

PORISMA QUINTUM.

Esto circulus RAC (*fig. 73*), cujus diameter RDC data, centrum D, radius DA ad diametrum normalis. Sumantur uteumque puncta Z et B data in diametro a centro D æquidistantia, et, junctâ AZ, fiat æqualis

Fig. 73.



ZM ad diametrum perpendicularis, eidemque æqualis et parallela duatur BO. Inflectatur quævis ad circumferentiam recta MHO quæ diametrum in punctis E et N seeat. Erit semper ratio quadratorum EH, HN simul sumptorum ad triangulum EHN data, eadem nempe quæ rectæ AZ ad quartam partem rectæ ZD.

Ex adductis porismatibus (quorum propositiones elegantissimas et pulcherrimas esse quis diffiteatur?) haud difficulter indaganda se prodit ipsa porismatum natura. Enunciari nempe posse, secundum Pappum, vel ut theorematu vel ut problemata statim patet; nos sane ut theorematu enunciavimus, sed nihil vetat quominus in problemata transformatur.

Exempli causa, sic quintum porisma concipi potest : Dato circulo RAC cuius diameter RC, querantur duo puncta, ut M et O, a quibus si inflectatur quavis ad circumferentiam recta ut MHO, faciat semper rationem quadratorum ab abscissis EH, HN ad triangulum EHN datam. Nec latet ex supradicto theoremate constructio : si enim ponatur recta AZ esse ad quartam partem ZD in ratione data, omnia constabunt, cùdemque ratione in reliquis et omnibus omnino porismatibus theoremati in problemata facile transibunt.

Quod autem innuit Pappus ex sententia juniorum geometrarum porisma deficere hypothesi a locali theoremate (¹), id sane totam porismatis naturam specificè revelat, neque alio fere auxilio quam eo quod haec verba subministrarunt, huiusc abdita materiæ penetramus.

Quum locum investigamus, lineam rectam aut curvam inquirimus nobis tantisper ignotam, donec locum ipsum inveniendæ lineæ designaverimus; sed quum ex supposito loco dato et cognito alium locum venamus, novus iste locus porisma vocatur ab Euclide : qua ratione locos ipsos porismatum unam speciem et esse et vocari verissime Pappus subjunxit.

Exemplo unico definitionem nostram astruemus in figura quinti porismatis : Datâ rectâ RC, si queratur curva quelibet, ut RAC, cuius ea sit proprietas ut a quolibet ipsius puncto, ut A, demissa perpendiculari

(¹) C'est-à-dire que, d'après cette définition, le porisme serait un théorème énonçant la propriété d'un lieu, sans que la détermination complète de ce lieu soit donnée dans l'énoncé. Cette détermination reste donc à trouver, en même temps que la propriété est à démontrer.

Au temps d'Euclide, le nom de *porisme* paraît avoir été employé pour désigner spécialement les propositions où il s'agissait de *trouver*, tandis que, dans les théorèmes, il s'agissait de *démontrer*, dans les problèmes de *construire*. Euclide a appliqué ce terme de *porisme* à un ensemble de propositions relatives à la matière devinée par Michel Chasles, dans sa célèbre restitution (*Les trois livres de Porismes d'Euclide*, etc. Paris, Mallet-Bachelier, 1860), mais il ne voulait probablement pas spécialiser particulièrement le sens de l'expression.

L'intention que lui prête Fermat un peu plus bas est donc improbable, et elle restreint trop le sens général du mot *porisme*, sans d'ailleurs désigner en aucune façon la nature réelle des propositions traitées par Euclide.

laris AD faciat quadratum AD aequale rectangulo RDC, inveniemus eur-
vam RAC esse circuli circumferentiam. Sed si ex dato jam loco illo
alium investigemus, problema, verbi gratia, porismatis quinti, novus
iste locus et infiniti alii quos periti sagacitas analystae represeantabit et
ex jam cognito elicet, porisma dicetur.

Quum autem, ut jam diximus, porismata ipsi sint loci, errorem latini
Pappi interpretis ex greco textu emendabimus eo loco ubi *porismatum*
opus perutile ait *ad resolutionem obscuriorum problematum ac eorum ge-*
nerum que haud comprehendunt eam que multititudinem prabet naturam :
que ultima verba quum nullum fere sensum admittant, ad ipsum au-
torem recurrendum cuius verba in manuscriptis codicibus ita se ha-
bent : πορίσματα ἔστι πολλοὶ ἀθροισμα ριλοτεγγέτατον εἰς τὴν ἀνάκυσιν
τῶν ἐμβριθεστέρων προβλημάτων καὶ τῶν γενῶν ἀπερίληπτον τῆς ϕύσεως
παρεγγομένης πλήθος.⁽¹⁾

Ait igitur *porismata conferre ad analysis obscuriorum problematum*
et generum, hoc est problematum generalium : ex dictis enim appetet
porismatum propositiones esse generalissimas. Deinde subjungit : *quum*
natura multititudinem que rix potest animo comprehendendi subministret ; qui-
bus verbis infinitas illas et miraculo proximas ejusdem problematis
indicit solutiones.

Huic autem vel theorematum vel problematum inventioni non deest
peculiaris a puriore Analysis derivanda methodus, cuius ope non solum
quinque praecedentia porismata sed pleraque alia et invenimus et con-
struximus et demonstravimus, et si haec paucula, quae isagogica tantum
et accuratioris operis prodroma emitimus, doctis arrideant, tres totos

(1) Voici comment Chasles (p. 14) traduit ce texte, assez obscur et mal assuré :

« Les Porismes... collection ingénieuse d'une foule de choses qui servent à la solution des problèmes les plus difficiles et que la nature fournit avec une inépuisable variété. »

Dans cette traduction, les mots *d'une foule* devraient être supprimés. Après *servent*, il faudrait ajouter *à beaucoup* (par opposition à *tous*). Enfin, après *difficiles*, il faudrait dire *et quoique la nature les fournisse avec une inépuisable variété*, en liant avec ce qui suit : *il n'a rien été ajouté à cet Ouvrage d'Euclide.*

Telle est du moins l'opinion de Heiberg. Le savant éditeur de Pappus, Hultsch (p. 638, t. 18 à 21), regarderait, au contraire, comme interpolés les mots *à beaucoup* et ceux qui suivent la phrase grecque citée par Fermat.


Porismatum libros aliquando restituemus, imo et Euclidem ipsum promovebimus et porismata in coni sectionibus et aliis quibuscumque curvis mirabilia sane et hactenus ignota detegemus (¹).

PROPOSITIO D. DE FERMAT CIRCA PARABOLEN (²).

Proposui *per data quatuor puncta parabolen describere*. Duplex est casus, utriusque lemma sequens præmittendum.

Sit parabola in 1^a fig. ECBAD (fig. 74), cujus diameter AF deatur positione; dentur etiam duo puncta B et C, per quæ transit parabola;

Fig. 74.



dentur denique anguli applicatarum ad diametrum AF. Aio parabolam positione dari.

Applicentur ordinatim BN et CM; a puncto dato B in AF positione

(¹) *Varia*, sur cet opuscule, le jugement de Chasles (p. 3, 4, 22). Il est certain que l'essai de Fermat doit être considéré comme tout autre chose que comme une tentative de restitution des Porismes d'Euclide, soit dans la forme des énoncés, encore incertaine aujourd'hui, soit pour le fond du sujet traité. Il faut y voir plutôt une indication de questions offrant quelque analogie avec celles abordées par Euclide.

Chasles n'a qu'un seul porisme, CXXVI (p. 230), qui se rapporte à l'un de ceux de Fermat, le troisième. Comme il le fait remarquer d'ailleurs, le second porisme de Fermat, où figure une parabole, est étranger à l'ordre d'idées d'Euclide, lequel se borne aux droites et aux cercles. Enfin, avec le troisième, il n'y a guère que le premier que l'on pourrait considérer comme rentrant dans un des vingt-neuf genres énumérés par Pappus.

Au lieu donc, comme l'a fait Chasles, de chercher ici, en s'aidant des lemmes de Pappus, à retrouver des propositions rentrant dans ces vingt-neuf genres, Fermat a voulu plutôt, dans ce spécimen, montrer que ces genres pouvaient être multipliés indéfiniment.

(²) Cette pièce est insérée dans les *Varia* au milieu de lettres d'octobre 1636.

datam ducitur BN in dato angulo (positum quippe est dari angulum applicatarum) : ergo datur punctum N; similiter datur punctum M et rectae BN, CM positione et magnitudine. Ex natura parabole est

ut quadratum CM ad quadratum BN, ita MA ad NA,


si ponas A esse verticem parabole sive extremum diametri; ergo datur ratio MA ad NA, et dividendo datur ratio MN ad NA. Datur autem recta MN, quia duo puncta M, N dantur; datur igitur NA et punctum A. Si fiat

ut AN data ad NB data, ita NB ad Z,

dabitur Z rectum parabole latus. Dato igitur vertice A, Z recto latere, AF diametro positione, angulo applicatarum, datur positione parabole, ex 52, I Apollonii.

Hoc supposito, facillime construitur primus easus in 2^a fig. (*fig. 75*), in qua dentur quatuor puncta D, B, C, F, quæ si jungas per rectas BC, CF, FD, DB, vel neutra oppositaria erit alteri parallela, vel, ut in hoc easu, erit BC, verbi gratia, parallela DF.

Fig. 75.




Bifariam utraque dividatur in punctis I et E et sit factum: ergo juncta IE erit diameter parabole, quum æquidistantes bifariam dividat. Dantur autem puncta I et E: ergo IE positione datur et angulus DEI. Quom igitur diameter IE positione detur, dentur etiam angulus applicatarum et duo puncta B et D per quæ transit parabole, dabitur positione parabole DBACF.

In secundo easu major est difficultas, quum neutra rectarum duo ex punctis datis conjungentium alteri est æquidistans. In 3^a fig. sint data

quatuor puncta X, N, D, R (*fig. 76*), quæ per rectas XR, RD, DN, NX conjungantur, et neutra oppositarum sit alteri æquidistans.

Ponatur jam factum esse, et descriptam parabolam XANDBR proposito satisfacientem. Concurrant productæ XN, RD, in puncto V et, bifariam divisim XN, RD in punctis M et C, ducantur ad ipsas diametri MA, CB, occurrentes parabolæ in punctis A et B, a quibus rectæ LAS, SB ipsis XV, VR ducantur æquidistantes et concurrant in puncto S. Juneta AB bifariam dividatur in P et jungatur SP.

Fig. 76.



His ita constructis, patet, quum per verticem diametri MA ducatur LAS æquidistans applicatae XN, rectam LAS tangere parabolam in A; probabitur similiter rectam SB tangere eamdem parabolam in B : ergo, per 17, III Apollonii erit

$$\text{ut rectangulum } XVN \text{ ad rectangulum } RVD,$$

$$\text{ita quadratum } AS \text{ ad quadratum } SB.$$

Datur autem ratio rectanguli XVN ad rectangulum RVD, quum dentur quatuor puncta X, N, D, R : ergo datur ratio quadrati AS ad quadratum SB, ideoque rectæ AS ad rectam SB. Datur autem angulus ASB, quia propter parallelas æquatur angulo XVR dato : ergo in triangulo ASB datur angulus ad verticem S et ratio laterum AS, SB, ideoque

triangulum ASB datur specie; igitur datur angulus SAB et ratio SA ad AB. Quum autem AP sit dimidia AB, datur etiam ratio SA ad AP: in triangulo igitur SAP datur angulus ad A, et ratio laterum SA, AP; datur igitur specie et angulus PSA datur.

Hoc posito, quum recta SP rectam AB puncta contactum conjungentem bifariam dividat, erit diameter paraboles, ex 29, II Apollonii: in parabola autem omnes diametri sunt inter se æquidistantes: ergo diameter MA rectæ SP æquidistabit, ideoque angulus IAM æquabitur angulo ASP. Probavimus autem dari angulum ASP: ergo dabitur angulus IAM et ipsi alternum propter parallelas NMA. Datur autem punctum M, quia rectam NX positione et magnitudine datam bifariam dividit: ergo datur diameter MA positione; datur etiam angulus applicatarum AMN, et dantur duo puncta N et D per quæ transit parabole: datur igitur parabole positione ex lemmate, et est facilis ab analysi ad synthesim regressus.

Patet autem duas parabolæ in hoc secundo casu propositum adimplere: concurrent enim rectæ DN et NR, quas posuimus non esse parallelas; hoc casu eadem argumentatione nova constructæ parabole proposito satisfaciens.

< LOCI AD TRES LINEAS DEMONSTRATIO > (¹).

Exponantur tres rectæ positione datae triangulum constituentes: AM, MB, BA (*fig. 77*), et sit quodvis punctum O a quo ad rectas datas ducentur rectæ OE, OL, OD in angulis OEM, OIM, ODB datis. Sit autem


(¹) Ce morceau inédit est publié d'après une copie du XVII^e siècle, classée dans la chemise « Fermat » du portefeuille 1858 I de la collection Ashburnham. Cette copie, sur une feuille double, sans titre, porte à la fin, d'une autre écriture du temps, la mention : *Pom Monsr Carcavi rue Michel Leconte au milieu*, et, en haut, de la main de Libri, l'attribution à Fermat. Cette attribution est corroborée par la Lettre de Fermat à Roberval, du 20 avril 1637, d'après laquelle le titre a été composé.

La question traitée est énoncée dans Pappus (éd. Hultsch), page 678, lignes 15 et suivantes.

ratio rectanguli EOD ad quadratum OI data : Aio punctum O esse ad unam ex coni sectionibus.

Dividatur MB bifariam in Q et, junctâ AQ, ducantur per punctum O rectae FOC, ON ipsis MB, MA parallelae.

Fig. 77.



Tria triangula OEF, ODC, OIN sunt specie data : nam ex hypothesi dantur anguli OEF, ODC, OIN; datur etiam EFO quia, propter parallelas, dato AMB est aequalis; datur et OCD quia aequalis dato MBA; denique datur ONI, quum detur ONB ipsis AMB propter parallelas aequalis. Datur igitur ratio OE ad OF; datur item ratio OD ad OC : ergo ratio rectanguli EOD ad rectangulum FOC datur. Datur autem, ex hypothesi, ratio rectanguli EOD ad quadratum OI : ergo ratio rectanguli FOC ad quadratum OI datur. Datur autem ratio quadrati OI ad quadratum ON, propter datum specie triangulum OIN : ergo ratio rectanguli FOC ad quadratum ON, sive FM ipsis aequale, datur.

Si secetur AQ in U ita ut, ducatâ UR parallela MB, quadratum UR ad quadratum RM sit in ratione data rectanguli FOC ad quadratum FM (hoc autem est facile, quum angulus MRU detnr), et per punctum U describatur, circa diametrum AQ, coni sectio quam rectæ MA, AB in punctis M, B contingant (id autem est facillimum et ex < vario >⁽¹⁾ puncti U situ erit aut parabole aut hyperbole aut ellipsis : superflua, præsertim tibi, non addimus) : Aio coni sectionem sic descriptam per punctum O transire.

⁽¹⁾ Le mot *vario* a été restitué à la place d'une lacune de cinq lettres environ dans le manuscrit.

Nam transeat ex alia parte per punctum P. Tangit recta UR sectionem, quum sit parallela ordinatae MB; quum igitur sectio transeat per punctum O, erit

rectangulum PFO ad quadratum FM ut quadratum UR ad quadratum RM,

ex decima sexta propositione III Apollonii. Ut autem

quadratum UR ad quadratum RM, ita est rectangulum FOC ad quadratum FM,

ex constructione : rectangulum igitur PFO rectangulo FOC aequalis erit, ideoque recta FO rectae PC.

Quod quidem ita se habet : nam, quum AQ dividat bifariam MB, erit recta FX rectae XC aequalis ; propter sectionem vero, recta OX est aequalis XP : reliqua igitur FO reliqua PC aequatur.

Nec est difficilis ab analysi ad synthesim, per demonstrationem ducentem ad impossibile, regressus.



AD LOCOS PLANOS ET SOLIDOS

ISAGOGE⁽¹⁾.

De locis quamplurima scripsisse veteres, haud dubium : testis Pappus initio Libri septimi⁽²⁾, qui Apollonium de locis planis, Aristaeum de solidis scripsisse asseverat. Sed aut fallimur, aut non proclivis satis ipsis fuit locorum investigatio; illud auguramur ex eo quod locos quamplurimos non satis generaliter expresserunt, ut infra patebit.

Scientiam igitur hanc propriæ et peculiari analysi subjicimus, ut deinceps generalis ad locos via pateat.

Quoties in ultima æqualitate duce quantitates ignotæ reperiuntur, fit locus loco et terminus alterius ex illis describit lineam rectam aut curvam. Linea recta unica et simplex est, curvæ infinitæ : circulus, parabole, hyperbole, ellipsis, etc.

Quoties quantitatis ignotæ terminus localis describit lineam rectam aut circulum, fit locus planus; at quando describit parabolam, hyperbolam vel ellipsin, fit locus solidus; si alias curvas, dicitur locus

(1) Le texte de cet important Traité est très défiguré dans l'édition des *Varia Opera* de 1679, en particulier par l'adoption de la notation cartésienne des exposants. L'*Isagoge*, qui renferme les éléments de la Géométrie analytique moderne, et notamment une discussion de l'équation générale du second degré à deux inconnues, a cependant été rédigée et même, d'après l'article du *Journal des Savants* du 9 février 1665, communiquée par Fermat avant l'apparition de la *Géométrie* de Descartes. D'un autre côté, il est aisément convaincu que Fermat est toujours resté fidèle aux instruments de Viète et n'a jamais fait usage dans ses écrits de la notation des exposants, sauf pour des cas exceptionnels, comme lorsqu'il faisait allusion aux travaux de Descartes.

L'existence, dans le portefeuille 1858 I de la collection Ashburnham, d'une ancienne copie de l'*Isagoge* a permis de rétablir en toute sûreté la notation employée par Fermat et d'éliminer certaines additions faites à son texte sur le manuscrit qui avait servi pour l'édition des *Varia*.


(2) Pappus, éd. Hultsch, page 636, lignes 22 et 23.

linearis. De hoc nihil adjungemus, quia facillime ex planorum et solidorum investigatione linearis loci cognitio derivabitur, mediantibus reductionibus.

Commode autem institui possunt aequationes, si duas quantitates ignotas ad datum angulum constituanus (quem ut plurimum rectum sumemus), et alterius ex illis positione date terminus unus sit datum; modo neutra quantitatum ignotarum quadratum praetergrediatur, locus erit planus aut solidus, ut ex dicendis clarum fiet.

Recta data positione sit NZM (*fig. 78*), cujus punctum datum N; NZ

Fig. 78.



aequetur quantitati ignotæ A, et ad angulum datum NZI elevata recta ZI sit aequalis alteri quantitati ignotæ E.

$$D \text{ in } A = \text{aequetur} = B \text{ in } E:$$

punctum I erit ad *lineam rectam* positione datam.

Erit enim

$$\text{nt } B \text{ ad } D, \text{ ita } A \text{ ad } E.$$

Ergo ratio A ad E data est, et datur angulus ad Z, triangulum igitur NZI specie, et angulus INZ; datur autem punctum N et recta NZ positione: ergo dabitur NI positione, et est facilis compositio.

Ad hanc aequalitatem reducentur omnes, quarum homogenea partim sunt data, partim ignotis A et E admixta, vel in datas duetis vel simpliciter sumptis.

$$Zpl. = D \text{ in } A = \text{aequetur} = B \text{ in } E.$$

Fiat

$$D \text{ in } R \text{ — aequate } Zpl.;$$

erit

$$\text{ut } B \text{ ad } D, \text{ ita } R \text{ ad } E.$$

Fiat MN aequalis R : dabitur punctum M, ideoque MZ aequabitur R — I. Dabitur ergo ratio MZ ad ZI; sed datur angulus ad Z, ergo triangulum IZM specie, et concludetur rectam MI junctam dari positione, ideoque punctum I erit ad rectam positione datam. Idemque nullo negotio concludetur in qualibet aequalitate ejus homogenea quaedam afficiuntur ab A vel E.

Et est simplex haec et prima locorum aequalitas, enjus beneficio invenientur loci omnes ad lineam rectam : verbi gratia, septima propositio Libri I *Apollonii de locis planis* (¹), quae generalius jam poterit enuntiari et construi.

Huic aequalitati subest pulcherrima propositio sequens, quam nos illius ope deteximus :

Si sint quotecumque rectae linea positione datae atque ad ipsas a quodam puncto ducantur rectae in datis angulis, sit autem quod sub ductis et datis efficitur dato spatio aequali, punctum rectam lineam positione datum contingit.

Infinitas omittimus, que Apollonianis merito possent opponi.

SECUNDUS hujusmodi aequalitatum gradus est, quando

$$A \text{ in } E \text{ — aeq. } Zpl.,$$

quo casu punctum I est ad *hyperbolam*.


Fiat NR (fig. 79) parallela ZI; sumatur in NZ quodlibet punctum, ut M, a quo ducatur MO parallela ZI; et fiat rectangulum NMO aequalis Zpl.

Per punctum O, circa asymptotos NR, NM, describatur hyperbole :

(¹) *Tour plus haut*, page 24, note 1.

dabitur positione et transbit per punctum I, quum ponatur rectangulum A in E, sive NZI, æquale NMO.

Fig. 79.



Ad hanc æqualitatem reducentur omnes quarum homogenea parfim sunt data, vel ab A aut E aut A in E affecta.

Ponatur

$$Dpl. + t \text{ in } E = \text{æq.} - R \text{ in } t + S \text{ in } E.$$

Igitur, ex artis præceptis,

$$R \text{ in } A + S \text{ in } E - t \text{ in } E = \text{æquabitur} - Dpl.$$

Effingatur rectangulum abs duobus lateribus, in quo homogenea

$$R \text{ in } t + S \text{ in } E - t \text{ in } E$$

reperiuntur : erunt duo latera

$$A - S \quad \text{et} \quad R - E$$

et rectangulum sub ipsis æquabitur $R \text{ in } A + S \text{ in } E - t \text{ in } E - R \text{ in } S$.


Si igitur a $Dpl.$ abstuleris $R \text{ in } S$, rectangulum sub $A - S \text{ in } R - E$ æquabitur $Dpl. - R \text{ in } S$.

Fiat NO (fig. 80) æqualis S, et ND, parallela ZI, fiat æqualis R; per punctum D ducatur DP parallela NM, \angle per punctum O $>$ OV parallela ND, et ZI producatur in P.

Quum NO æquetur S, et NZ, A, ergo $A - S$ æquabitur OZ sive VP; similiter, quum ND, sive ZP, æquetur R, et ZI, E, ergo $R - E$ æqua-

bitur PI : rectangulum igitur sub VP in PI aequatur dato $Dpl.$ — R in S .
Ergo punctum I erit ad hyperbolam, cuius asymptoti PV, VO.

Fig. 80.




Rectangulo enim $Dpl.$ — R in S aequatur, sumpto quovis puncto X et ducta parallela XY, rectangulum VXY, et per punctum Y, circa asymptotas PV, VO, hyperbole describatur : per punctum I transibit, nec est difficilis in quibuslibet casibus analysis aut constructio.

SEQUENS aequalitatum localium gradus est, quum $Aq.$ vel aequatur $Eq.$, vel est in ratione data ad $Eq.$, vel etiam $Aq. + t$ in E est ad $Eq.$ in data ratione; denique hic easus omnes aequationes comprehendit intra metam quadratorum, quarum homogenea omnia vel a quadrato A , vel a quadrato E , vel a rectangulo A in E afficiuntur.

His omnibus casibus punctum I est ad *lineam rectam*, cuius rei demonstratio facillima.

Sit NZ quad. + NZ in ZI ad ZI quad. in ratione data (fig. 81).

Fig. 81.



Dueatur quævis parallela OR; quadratum NO + NO in OR erit ad OR quadratum in eadem ratione, ut est facillimum demonstrare. Punctum igitur I erit ad rectam positione \langle datam \rangle .

[Sumatur enim quodvis punctum, ut O, et fiat data ratio quadrati

$NO = NO$ in OR ad OR quadratum. Juncta NR dabitur positione et satisfaciet proposito] (¹), idemque continget in quibuslibet aequationibus, quarum omnia homogena a potestatibus ignotarum vel rectangulo sub ipsis sufficientur, ut inutile sit singulos casus scrupulosius percurrere.

Si potestatibus ignotarum vel rectangulis sub ipsis admiscentur homogena, partim omnino data, partim sub data recta in alteram ignotarum, difficilior evadet constructio : singulos casus construimus breviter et demonstramus.


Si

$$1q. \quad \text{aequatur} \quad D \text{ in } E,$$

punctum I est ad *parabolam*.

Fiat NP parallela ZI (fig. 82), et circa diametrum NP describatur

Fig. 82.



parabola, ejus rectum latus recta D data, et applicatae sint parallelae NZ : punctum I erit ad parabolam hanc positione datam.

Ex constructione rectangulum sub D in NP aequabitur quadrato PI , hoc est, rectangulum sub D in IZ aequabitur quadrato NZ , ideoque :

$$D \text{ in } E \quad \text{aequabitur} \quad Aq.$$

Ad hanc aequationem facillime reducentur omnes in quibus $Aq.$ mis-
cetur homogeneis sub datis in E , aut $Eq.$ homogeneis sub datis in A ,

(¹) La démonstration mise entre crochets est suspecte à divers titres; si elle n'a pas été interpolée, on ne peut guère la considérer que comme un reste d'une première rédaction de Fermat.

idemque continget, licet homogenea omnino data aequationibus miscantur.

Sit

$$Eq. \quad \text{æquale} \quad D \text{ in } t.$$

In praecedenti figura, vertice N, circa diametrum NZ, describatur parabola, cujus rectum latus sit D , et applicatae rectæ NP parallelae: præstabit propositum, ut patet.

Ponatur

$$Bq. = 1q. \quad \text{æq.} \quad D \text{ in } E,$$

Ergo

$$Bq. = D \text{ in } E \quad \text{æquabitur} \quad 1q.$$

Applicetur $Bq.$ ad D et sit æquale D in R . Ergo

$$D \text{ in } R = D \text{ in } E \quad \text{æquabitur} \quad 1q.,$$


ideoque

$$D \text{ in } (R - E) \quad \text{æquabitur} \quad 1q.$$

Ideoque hæc æquatio reducetur ad praecedentem: recta quippe $R - E$ succeedet ipsi E .

Fiat quippe (fig. 83) NM parallela ZI et æqualis R , et per punctum M ducatur MO parallela NZ: datur punctum M, et recta MO positione. In

Fig. 83.



haec constructione, OI æquatur $R - E$: ergo D in OI æquatur NZ quad., sive MO quad. Vertice M, circa diametrum MN, descripta parabola, cujus rectum latus D , et applicatae ipsi NZ parallelae, præstabit propositum, ut patet ex constructione.

Si

$$Bq. + 1q. \quad \text{æq.} \quad D \text{ in } E,$$

$$D \text{ in } E = Bq. \quad \text{æquabitur} \quad 1q.,$$

ete, ut supra. Similiter omnes æquationes ab E et $Aq.$ affectæ construantur.


Sed $Aq.$ miscetur saepe $Eq.$ et homogeneis omnino datis.

$$Bq. - tq. \quad \text{æquatur} \quad Eq. :$$

punctum I est ad *circulum* positione datum, quando angulus NZI est rectus.

Fiat NM (*fig. 84*) aequalis B ; circulus centro N , intervallo NM , descriptus præstabit propositum, hoc est : quodecumque punctum sump-

Fig. 84



seris in ipsius circumferentia, ut I , quadratum ZI æquabitur quadrato NM (sive $Bq.$) — quadrato NZ (sive $Aq.$), ut patet.

Ad hanc æquationem reducentur omnes affectæ ab $Aq.$ et $Eq.$, et ab A vel E in datas ductis, modo angulus NZI sit rectus, et præterea coefficientes $Aq.$ æquentur coefficientibus $Eq.$.

Sit

$$Bq. - D \text{ in } I \text{ bis} = Aq. \quad \text{æquale} \quad Eq. + R \text{ in } E \text{ bis}.$$

Addatur utrumque $Rq.$, ut $E + R$ succedat E : fiet

$$Rq. - Bq. - D \text{ in } I \text{ bis} = tq. \quad \text{æquale} \quad Eq. + Rq. + R \text{ in } E \text{ bis}.$$

Ipsis $Rq.$ et $Bq.$ addatur $Dq.$, ut $D + A$ succedat ipsi A , et summa quadratorum $Rq.$, $Bq.$, et $Dq.$ æquetur $Pq.$ Ergo

$Pq. - Dq. - D \text{ in } I \text{ bis} = tq.$ — æquabitur — $Rq. + Bq. - D \text{ in } I \text{ bis} = tq.$;
nam ex constructione

$$Pq. - Dq. \quad \text{æquatur} \quad Rq. + Bq.$$

Si igitur loco ipsius $A + D$ sumpseris A et loco $E + R$ sumpseris E ,
fiet

$$Pq. - Aq. \text{ æquale } Eq.,$$

et reducetur æquatio ad praecedentem,

Simili ratioinatione similes æquationes reducentur, et hac via omnes propositiones secundi Libri *Apollonii De locis planis* (¹) construximus, et sex priores in quibuslibet punctis habere locum demonstravimus : quod sane mirabile est et ab Apollonio fortasse ignorabatur.

SED

$$Bq. - Aq. \text{ ad } Eq. \text{ habeat rationem datam,}$$

punctum I erit ad *ellipsin*.

Fiat MN æqualis B , et per verticem M, diametrum NM, centrum N, describatur ellipsis, cuius applicatae sint rectæ ZI parallelæ et quadrata applicatarum ad rectangulum sub segmentis diametri habeant rationem datam : punctum I erit ad hujusmodi ellipsin. Etenim quadratum NM - quadrato NZ æquatur rectangulo sub diametri segmentis.

Ad hanc reducentur similes in quibus $Aq.$ ex una parte opponetur $Eq.$ sub contraria affectionis nota et sub coefficientibus diversis. Nam si coefficientes sint eadem et angulus sit rectus, locus erit ad circulum, ut jam diximus; licet igitur coefficientes sint eadem, modò angulus non sit rectus, loens erit ad *ellipsin*, et, licet immisceantur æquationibus homogenea sub datis et A vel E , fiet reductio eo quod jam usurpavimus artificio.

Si

$$Aq. + Bq. \text{ est ad } Eq. \text{ in data ratione,}$$


punctum I est ad *hyperbolam*.

Fiat NO (fig. 85) parallela ZI; data ratio sit eadem quæ $Bq.$ ad quadratum NR : dabitur ergo punctum R. Cirea diametrum RO, per ver-

(¹) Voir plus haut, pages 29 et 30, note 2.

ticem R, centrum N, describatur hyperbole, ejus applicatae sint parallelae NZ, et rectangulum sub toto diametro et RO unà cum RO quadrato ad quadratum OI sit in data ratione, NR quadrati ad Bq . Ergo, componendo, rectangulum sub MOR (posita MN aequali NR) unà cum quadrato NR erit ad quadratum OI unà cum Bq , in ratione data, NR quadrati ad Bq . Sed rectangulum MOR, unà cum NR quadrato, aequa-

Fig. 85.



tur NO quadrato, sive ZI quadrato, sive Eq ; et quadratum OI unà cum Bq , aequatur quadrato NZ (sive Aq) unà cum Bq ; ergo est

ut Eq , ad $Bq + 1q$, ita NR quad. ad Bq .

et, convertendo,

$Bq + 1q$, est ad Eq , in ratione data.

Punctum igitur I est ad hyperbolam positione datam.

Eodem quo jam usi sumus artificio, ad hanc aequalitatem reducentur omnes quæ ab $1q$, et Eq , afficiuntur unà cum datis, sive simpleiter, sive miscentur ipsis homogenea sub A vel E in datas, modò Aq , habeat eandem ex altera parte affectionis notam, quam Eq . Nam, si sint diversæ, propositio concludetur per circulos vel ellipses.

DIFICILLIMA omnium aequalitatum est quando ita miscentur Aq , et Eq , ut nihilominus homogenea quedam ab A in E afficiantur unà cum datis, etc.

$$Bq - 1q \text{ bis} = \text{aequatur} = 1 \text{ in } E \text{ bis} + Eq.$$

Addatur utrimque $Aq.$, ut $A + E$ sit latus alterius ex homogeneis :

ergo


$$Bq. - Aq. \text{ aequalit}ur Aq. + Eq. + A \text{ in } E \text{ bis.}$$

Pro $A + E$ sumatur E , si placet, et ex praecedentibus circulus MI (fig. 86) præstet propositum, hoc est :

$$\begin{aligned} MN \text{ quad. (sive } Bq.) - NZ \text{ quad. (sive } Aq.) \\ \text{aequetur quadrato } ZI \text{ (sive quadrato abs. } t + E). \end{aligned}$$

Fiat VI æqualis NZ, sive A : ergo ZV aequalit E. In hac autem quæstione punctum V, sive extreum rectæ E, tantum inquirimus : videndum ergo et demonstrandum ad quam lineam sit punctum V.

Fig. 86.



Fiat MR parallela ZI et æqualis MN, et jungatur NR, ad quam producta IZ incidat ad punctum O. Quum MN aequalit MR, ergo NZ aequalit ZO; sed NZ aequalit VI : ergo tota VO toti ZI est æqualis, ideoque

$$\text{quadratum } MN - \text{quadrato } NZ \text{ aequalit quadrato } VO.$$

Datur autem triangulum NMR specie : ergo quadrati NM ad quadratum NR datur ratio, ideoque et quadrati NZ ad quadratum NO dabitur ratio. Ratio igitur

$$\text{quadrati } MN - \text{quadrato } NZ \text{ ad quadratum } NR - \text{quadrato } NO$$

datur; probavimus autem

$$\text{quadratum } OV \text{ aequari quadrato } MN = \text{quadrato } NZ :$$

ergo ratio quadrati NR — NO quadrato ad quadratum OV datur. Dantur autem puncta N et R, et angulus NOZ : ergo punctum V, ex superiori demonstratis, est ad ellipsin.

Non absimili methodo ad superiores casus reducentur reliqui, in quibus homogenea sub A in E homogeneis partim datis, partim sub Aq. aut Eq. immiscebuntur, aut etiam sub A et E in datas ductis, cuius rei disquisitio facillima : semper enim beneficio trianguli specie noti constructur quaestio.

Breviter igitur et dilucide complexi sumus quidquid de locis planis et solidis inexplicatum veteres reliquere, constabitque deinceps ad quem locum pertinebunt casus omnes propositionis ultimæ Libri I Apollonii de locis planis (¹), et omnia omnino ad hanc materiam spectantia nullo negotio detegentur.

Sed LIBER coronidis loco pulcherrimam hanc propositionem adjungere, cuius facilitas statim innotescet.

Si, positione datis quoteunque lineis, ab uno et eodem punto ad singulas ducantur rectæ in datis angulis, et sint species ab omnibus ductis dato spatio æquales, punctum contingit positione datum solidum locum.

Unico exemplo fit via ad practiceen : Datis duobus punctis N, M (fig. 87), inveniendus locus a quo si jungas rectas IN, IM, quadrata rectarum IN, IM ad triangulum INM datam habeant rationem.

Recta NM æquetur B, et recta ZI, ad angulos rectos, dicatur E terminus; NZ dicatur A : ergo, ex artis praecptis,


$$Aq. bis + Bq. = B \text{ in } A \text{ bis} + Eq. bis \text{ ad rectangulum } B \text{ in } E$$

habebit rationem datam et, resolvendo hypostases ex iam traditis praecptis, ita procedet constructio :

(1) Voir plus haut, p. 97, la note sur le sens qu'il faut attribuer à cette proposition d'Apollonius.

NM bifariam sectetur in Z; a puncto Z excitetur perpendicularis ZV, et fiat data ratio eadem quæ ZV quadruplae ad NM; descripto semicirculo VOZ super VZ (¹) applicetur ZO æqualis ipsi ZM, et junctâ VO, centro V, intervallo VO, describatur circulus OIR, in quo sumatur

Fig. 87.



quodlibet punctum, ut R, et jungantur rectæ RN, RM : Alio quadrata RN, RM ad triangulum RNM esse in data ratione.

Hæc inventio, si libros dnos *de locis planis* a nobis dudum restitutos præcessisset, elegantiores sane evasissent localium theorematum constructiones : nec tamen præcocis licet et immaturi partus nos adhuc pœnitet, et informes ingenii fetus posteris non invidere scientiæ ipsius quadamtenus interest, cuius opera primo rudia et simplicia novis inventis et roborantur et augescunt. Imo et studiosorum interest latentes ingenii progressus et artem sese ipsam promoventem penitus habere perspectam.

APPENDIX AD ISAGOGEN TOPICAM,

CONTINENS SOLUTIONEM PROBLEMATUM SOLIDORUM PER LOCOS.

Patuit methodus qua lineæ locales deteguntur : inquirendum restat qua ratione problematum solidorum solutio possit ex supradictis ele-

(¹) Construisez : ZO, æqualis ipsi ZM, applicetur semicirculo VOZ, descripto super VZ.

Fermat veut dire que, dans le demi-cercle VOZ, il faut inscrire une corde ZO égale à ZM.

gantissime derivari. Hoe ut fiat, coaretanda illa quantitatuum ignotarum extra limites suos evagandi licentia; infinita enim sunt puncta quibus questioni propositae satisfit in locis.

Commodissime igitur per duas aequalitates locales quæstio determinatur : secant quippe se invicem due lineæ locales positione datae, et punctum sectionis, positione datum, questionem ex infinito ad terminos praescriptos adgit.

Exemplis breviter et dilucide res explicatur. Proponatur

$$1c. + B \text{ in } 1q. \quad \text{æquari} \quad Zpl. \text{ in } B,$$

Commode utraque aequalitatis pars potest æquari solidu B in A in E , ut per divisionem istius solidi, illine per A , hinc per B , res dedicatur ad locos.

Quum igitur

$$1c. + B \text{ in } 1q. \quad \text{æquetur} \quad B \text{ in } 1 \text{ in } E,$$

ergo

$$1q. + B \text{ in } A \quad \text{æquabitur} \quad B \text{ in } E,$$

et erit, ut patet ex nostra methodo, extremitas ipsius E ad parabolam positione datam.

Deinde quum

$$Zpl. \text{ in } B \quad \text{æquetur} \quad B \text{ in } 1 \text{ in } E,$$

ergo

$$Zpl. \quad \text{æquabitur} \quad A \text{ in } E,$$

et erit, ex nostra methodo, extremitas ipsius E ad hyperbolam positione datam.

Sed jam probavimus esse ad parabolam positione datam : ergo dabitur positione, et est facilis ab analysi ad synthesin regressus.

Nec dissimilis est methodus in omnibus aequationibus cubicis : constitutis enim ex una parte solidis omnibus ab A affectis, ex altera solo omnino dato vel etiam cum solidis ab A vel $Aq.$ affectis, poterit fangi aequalitas superiori similis.

Proponatur exemplum in aequationibus quadratoquadraticis :

$$1qq. - Bs. \text{ in } 1 + Zq. \text{ in } 1q. \quad \text{æquetur} \quad Dpp.$$

Ergo

$$Aqq. \quad \text{æquabitur} \quad Dpp. - Bs, \text{ in } A - Zq, \text{ in } Aq.$$

Equentur haec duo homogenea $Zq.$ in $Eq.$

Quum igitur

$$Aqq. \quad \text{æquetur} \quad Zq. \text{ in } Eq.,$$

ergo, per subdivisionem quadraticam,

$$Aq. \quad \text{æquabitur} \quad Z \text{ in } E,$$

et erit extremitas E ad parabolen positione datam.

Deinde, quum

$$Dpp. - Bs, \text{ in } A - Zq, \text{ in } Aq. \quad \text{æquetur} \quad Zq. \text{ in } Eq.,$$

omnibus per $Zq.$ divisis,

$$\frac{Dpp. - Bs, \text{ in } A}{Zq.} = Aq. \quad \text{æquabitur} \quad Eq..$$

et erit, ex nostra methodo, extremitas E ad circulum positione datum.

Sed est et ad parabolen positione datam : ergo datur.

Non dissimili methodo solventur quæstiones omnes quadratoquadraticæ : expurgabuntur enim, methodo Vietæ (Cap. I, *De emendatione*)⁽⁴⁾, ab affectione sub cubo et, quadratoquadrato ignoto ab una parte, reliquis homogeneis ab altera constitutis, per parabolen, circulum vel hyperbolæ solvetur quæstio.

Proponatur ad exemplum *incentio duarum mediarum in continua proportionem.*

Sint due rectæ, B major, D minor, inter quas due mediae proportionales sunt inveniendæ. Fiet

$$1c. \quad \text{æqualis} \quad Bq. \text{ in } D,$$

si major mediarum ponatur A .

(4) Voir page 132 de l'édition de Schooten. Il s'agit de la méthode aujourd'hui vulgaire.

Equentur singula homogenea B in t in E : illinc fiet

$$tq. \quad \text{aequale} \quad B \text{ in } E,$$


istinc

$$t \text{ in } E \quad \text{aequale} \quad B \text{ in } D,$$

ideoque questio per hyperboles et paraboles intersectionem perficietur.

Exponatur enim recta quaevis positione data OVN (*fig. 88*), in qua detur punctum O. Sint rectae datae B et D , inter quas due media pro-

Fig. 88.



portionales inveniendæ: ponatur recta OV æquari t , et recta VM, ipsi OV ad rectos angulos, æquari E .

Ex priori aequalitate, qua

$$tq. \quad \text{aequatur} \quad B \text{ in } E,$$

constat per punctum O tanquam verticem describendam parabolæ, cuius rectum latus sit B , diameter ipsi VM parallela, et applicatae ipsi OV <parallelæ>; transibit igitur haec parabola per punctum M.

Ex secunda aequalitate, qua

$$B \text{ in } D \quad \text{aequatur} \quad t \text{ in } E,$$

sumatur punctum ubi libet in recta OV, ut N, a quo excitetur perpendicularis NZ, et fiat rectangulum ONZ æquale rectangulo B in D . Excitetur etiam perpendicularis OR. Circum asymptotos RO, OV describenda hyperbole per punctum Z, ex nostra methodo locali, dabitur positione et transibit per punctum M.

Sed parabole etiam quam supra descripsimus dabitur positione et per idem punctum M transit: datur igitur punctum M positione, a quo si demittatur perpendicularis MV, dabitur punctum V, et recta OV, major duarum continue proportionalium quas querimus.

Inventae igitur sunt due mediae per intersectionem parabolas et hyperboles.

Si ad quadratoquadrata lubeat quæstionem extendere, omnia ducentur in A:

$$Aqq. \quad \text{æquabitur} \quad Bq. \text{ in } D \text{ in } t.$$

Aequaliter singula homogenea, juxta superiorem methodum, Bq. in Eq.; sicut sunt dueæ æqualitatem, nempe

$$Eq. \quad \text{æq.} \quad B \text{ in } E \quad \text{et} \quad D \text{ in } t \quad \text{æq.} \quad Eq.,$$

quæ singulæ dabunt parabolæ positione datam. Fiet igitur constructio mesolabii per intersectionem duarum parabolæ hoc casu.

Prior constructio et posterior sunt apud Eutocium in Archimedem (¹), et huius methodo facile redduntur obnoxiae.

Abeant igitur *climacticae* illæ *parapleroses* Vietææ (²), quibus æquationes quadratoquadraticæ reducuntur ad quadraticæ per medium cubicarum abs radice plana. Pari enim elegantia, facilitate et brevitate solvuntur, ut jam patuit, perinde quadratoquadraticæ ac cubicæ quæstiones, nec possunt, opinor, elegantius.

Ut pateat elegantia hujus methodi, en *constructionem omnium problematum cubicorum et quadratoquadraticorum per parabolæ et circulum*.

Ponatur

$$Aqq. - Zs. \text{ in } t = \text{æquari} = Dpp.;$$

ergo

$$Aqq. \quad \text{æquabitur} \quad Zs. \text{ in } t + Dpp.$$

(¹) Commentaire sur le Traité de la sphère et du cylindre, II, 2, dans les Œuvres d'Archimède; édition Torelli, page 142; édition Heiberg, vol. III, pages 93-99. Ces deux constructions sont attribuées par Eutocius à Ménechme, l'inventeur présumé des coniques.

(²) De emendatione æquationum, Cap. VI, pages 140 et suivantes de l'édition de Schooten. Il s'agit de la solution algébrique des équations du quatrième degré

Fingatur quadratum abs $Aq.$ — $Bq.$ aut alio quovis quadrato : fiet quadratum

$$Aqq. + Bqq. - Bq. \text{ in } 1q. \text{ bis.}$$

Addantur ad supplementum singulis æqualitatis partibus

$$Bqq. - Bq. \text{ in } 1q. \text{ bis :}$$

fiet

$$Aqq. + Bqq. - Bq. \text{ in } 1q. \text{ bis} = \text{æquale}$$

$$Bqq. - Bq. \text{ in } 1q. \text{ bis} + Zs. \text{ in } 1 + Dpp.$$

Sit

$$Bq. \text{ bis} = \text{æquale} = Nq..$$

et singulis homogeneis, sive partibus æqualitatis, æquetur $Nq.$ in $Eq.$: fiet illine, per subdivisionem quadraticam,

$$1q. - Bq = \text{æquale} = V \text{ in } E,$$

ideoque punctum extremum E erit ad parabolam, ex nostra methodo : istine fiet

$$\frac{Bqq.}{Nq.} - 1q. + \frac{Zs. \text{ in } 1}{Nq.} + \frac{Dpp.}{Nq.} = \text{æquale} = Eq..$$

ideoque, ex nostra methodo, punctum extremum E erit ad circulum.

Descriptione igitur parabolas et circuli solvitur quæstio.

Hæc methodus facillime ad omnes casus tam cubicos quam quadraticos extenditur. Curandum enim tantum ut ex una parte sit $Aqq.$, ex altera quelibet homogenea, modo non afficiantur ab $Ae.$; at, per expurgationem Vietæam, omnes æquationes quadraticæ ab affectione sub cubo liberantur : ergo eadem erit in omnibus methodus.

Quum autem æquationes cubicæ liberentur ab affectione sub quadrato per methodum Vietæam (¹), homogeneis omnibus in A ductis, fiet æquatio quadraticæ cujus nullum ex homogeneis afficietur sub cubo, ideoque solvetur per superiorem methodum.

Id solum in secunda æqualitate curandum est ut $Aq.$ ex una parte,

¹ — *De emendatione æquationum*, Cap. I, pages 130 et suivantes de l'édition de Schooten.

ex altera *Eq.*, sub contraria affectionis nota reperiantur, quod est semper facillimum.

Sit enim in alio easu, ut omnia percurramus,

$$Aqq. \quad \text{æquale} \quad Zpl. \text{ in } tq. - Zs. \text{ in } D.$$

Fingatur quodvis quadratum abs *Aq.* — quovis quadrato dato, ut *Bq.*, fiet

$$tqq. + Bqq. - Bq. \text{ in } tq. \text{ bis.}$$

Adjiciatur utriusque æqualitatis parti, ad supplementum.

$$\begin{aligned} & Bqq. - Bq. \text{ in } tq. \text{ bis} \\ & \text{fiet} \end{aligned}$$

$$tqq. + Bqq. - Bq. \text{ in } tq. \text{ bis} \quad \text{æquale} \quad Bqq. - Bq. \text{ in } tq. \text{ bis} + Zpl. \text{ in } tq. - Zs. \text{ in } D.$$

Ut igitur commoda fiat divisio, in secunda æqualitate sumenda differentia inter *Bq. bis* et *Zpl.*, quæ sit, verbi gratia, *Nq.*, et utraque æqualitatis pars æquanda *Nq.* in *Eq.*, ut illinc fiat

$$tq. - Bq. \quad \text{æquale} \quad N \text{ in } E,$$

istine,

$$\frac{Bqq.}{Nq.} - tq. - \frac{Zs. \text{ in } D}{Nq.} \quad \text{æquale} \quad Eq.$$

Advertendum deinde *Bq. bis* debere præstare *Zplano*, alioquin *Aq.* non afficeretur signo defectus et pro circulo inveniremus hyperbolam. Cui promptum remedium : *Bq.* enim ad libitum sumimus, ideoque ipsius duplum majus *Zplano* nullius est negotii sumere. Constat autem, ex methodo locali, circulum creari semper ex æqualitate, in cuius parte altera quadratum unum ignotum afficitur signo +, in altera aliud quadratum ignotum signo -.

Si sumas ad hoc exemplum inventionem duarum mediarum, erit

$$1c. \quad \text{æqualis} \quad Bq. \text{ in } D,$$

et

$$tqq. \quad \text{æquale} \quad Bq. \text{ in } D \text{ in } 1.$$

Adjiceratur ultrinque Bqq , — Bq , in Aq , bis :

$$Aqq = Bqq - Bq, \text{ in } Aq, \text{ bis} \quad \text{æquabitur} \quad Bqq + Bq, \text{ in } D \text{ in } A = Bq, \text{ in } Aq, \text{ bis},$$

Sit

$$Bq, \text{ bis} \quad \text{æquale} \quad Nq.,$$

et singulæ æqualitatis partes æquentur $Nq.$, in $Eq.$: fiet illæ

$$Eq. = Bq, \quad \text{æquale} \quad V \text{ in } E,$$

ideoque extreumum E erit ad parabolæ; istine fiet

$$Bq, \frac{1}{2} + D \frac{1}{2} \text{ in } A = Eq, \quad \text{æquale} \quad Eq.,$$

ideoque extreumum E erit ad cirenum.

Qui haec adverterit, frustra quæstionem mesolabii, trisectionis angularis et similes, tentabit deducere ex planis, hoc est, per rectas et cirenos expedire.

ISAGOGÉ
AD LOCOS AD SUPERFICIEM,

CARISSIMO DOMINO DE CARCAVI (¹).



Isagogē ad locos planos et solidos perficit tradenda τόπων πρὸς ἐπιγνώσειν ἐπιδειξίς. Hanc veteres indicarunt tantum, sed neque generatibus praeceptis docuerunt, neque aliquo saltem nobili exemplo adumbrarunt, nisi in iis forsitan sepulta jamdiu Geometriae monumentis deliteant, in quibus tot praelara veterum inventa cum blattis et tineis colluctant dudum aut omnino evanuerunt.

Generalem tamen huic materiae methodum non defuturam brevissima dissertatio patefaciet : pluribus enim singulas, quas summatim tradidimus huc usque in Geometricis, inventiones aliquando, si suppetet otium, illustrabimus.

Quæ igitur in lineis topicis symptomata quæsivimus et demonstravimus, eadem in superficiebus planis, sphaericis, conicis, cylindricis et conoideòn ant sphéroïdeòn quorumlibet inquirere nil velat, si præmittantur lemmata singulorum hujusmodi locorum constitutiva (²).

(¹) Cet opuscule, jusqu'à présent inédit, et qui contient le premier essai connu sur la théorie générale des surfaces du second degré, est publié d'après une copie d'Arbogast, faite elle-même de seconde main.

(²) Fermat, dont le point de départ est le Livre d'Archimède *De conoidibus et spheroïdibus*, a bien reconnu la nécessité de généraliser la notion de la surface cylindrique, ainsi que celles des conoïdes (paraboloïdes elliptiques et hyperboloides à deux nappes) et sphéroïdes (ellipsoïdes) d'Archimède, qui n'avait traité que des surfaces de révolution; mais il n'a pas soupçonné l'existence du paraboloïde hyperbolique ni de l'hyperboloid à une nappe. Son erreur apparaît au lemme 5.

Proponatur ergo pro locis ad superficiem planam lemma sequens :

1. *Si superficies quæpiam planis quotlibet in infinitum secetur, et communis sectio omnium in infinitum secantium planorum < et dictæ superficie > sit linea recta, superficies primum posita erit planum.*

Pro locis ad superficiem sphaericam :

2. *Si superficies quæpiam planis quotlibet in infinitum secetur, et communis sectio planorum omnium secantium et dictæ superficie sit circulus, superficies illa erit sphaera.*

Pro locis ad superficiem sphæroidis :

3. *Si superficies quæpiam planis quotlibet in infinitum secetur, et communis sectio omnium secantium planorum et dictæ superficie sit quandoque circulus, quandoque ellipsis, et nihil præterea, superficies illa erit sphærois.*

Pro locis ad conoides parabolicos aut hyperbolicos :

4. *Si superficies quæpiam planis quotlibet in infinitum secetur, et communes sectiones (ut supra) sint quandoque circulus, quandoque ellipsis, quandoque parabole aut hyperbole, et nihil præterea, superficies primum posita erit conoïs parabolicus aut hyperbolicus.*

Pro locis ad conicas superficies :

5. *Si superficies quæpiam planis quotlibet in infinitum secetur, et communes sectiones sint quandoque lineæ rectæ, quandoque circuli, quandoque ellipses, quandoque parabole aut hyperbole, et nihil præterea, superficies primum posita erit conus.*

Pro locis ad superficiem cylindricam :

6. *Si superficies quæpiam planis quotlibet in infinitum secetur, et communes sectiones sint quandoque lineæ rectæ, quandoque circuli, quandoque ellipses, et nihil præterea, superficies primum posita erit cylindrus.*

Quia tamen saepissime occurrint loci in quibus sectiones sunt lineæ rectæ, parabole aut hyperbolæ et nihil præterea (quod ipsa statim quæ-

tionis analysis indicabit), conveniens <est> et necessaria omnino huic disputationi *nova cylindrorum constitutio, in quibus bases inter se parallelae sint parabolae aut hyperbolae, et latera, bases hujusmodi connectentia, sint lineae rectae, inter se parallelae*, ut accidit in cylindris communibus. Ita enim fiet ut nulla omnino cylindrorum hujusmodi per planum sectio det circulos aut ellipses, eruntque aut scaleni aut recti ad imitationem communium, prout analysis topicæ propositæ quæstionis exposet.

Hos autem cylindros problemata ipsa topicæ necessarios innunt : quod addendum, ne videatur otiosa hujusmodi σύγγραφος expositio et inventio.

Imo et priusquam ulterius pergas, non omnino satisfacit huic operi Archimedea sphæroideōn et conoideōn constructio (¹) : scalenos enim, perinde ac rectos, quæstiones ipsæ repræsentabunt.

Ex premissis sequuntur pulcherrimi primo *ad superficiem sphericam loci :*

Si a quoteunque punctis datis in quibuslibet planis ad punctum unum inflectantur rectæ, et sint quadrata que ab omnibus sunt dato spatio aequalia, punctum ad inflexionem erit ad superficiem sphericam sive sphaeram positione datum. — Sphaeram enim vocare possumus, ad imitationem Euclidis et veterum Geometrarum qui κύκλου non ipsius circuli τὸ ἐπιβαόν, sed circumferentiam ipsam appellant : superficiem sane hujusmodi punctum quampiam describet.

Exponatur quodvis planum positione datum et in illo, juxta præcepta locorum planorum et solidorum alias tradita, quaeratur locus ad quem a punctis datis inflexarum quadrata aequentur spatio dato.


Hoc autem est facile : sit factum et locus in plano exposito sit curva NIP (fig. 89). In illud planum, a punctis A, E, C datis ex hypothesi, demittantur normales AB, EF, CD. Quum igitur planum hoc sit positione datum, dabuntur in illud a punctis A, E, C datis demissæ

(¹) Voir la note 2 de la page 111 et la Préface du Traité d'Archimède *Des conoïdes et sphéroïdes* (éd. Torelli, pages 257 à 259 ; éd. Heiberg, vol. I, pages 274 et suiv.).

normales AB, EF, CD; dabuntur et puncta B, F, D in quibus dictæ normales plano exposito occurruunt. Sumatur in quæsita linea locali NIP quodvis punctum, ut I, et jungantur rectæ AI, BI, EI, IF, CI, DI.

Quoniam igitur a punctis datis A, C, E ad punctum I linea localis pertingant rectæ AI, EI, CI, earum quadrata comprehendunt spatium datum. Si igitur ab eis quadratis auferas normalium AB, EF, CD quadrata, que jam probavimus data esse, supererunt quadrata BI, FI, DI.

Fig. 89.



quorum summa proinde data est. Dantur etiam in exposito plano puncta B, F, D, ut similiter probatum est. Quoniam itaque a punctis B, F, D, datis in eodem plano, inflectantur rectæ ad locum in eodem etiam plano, et sint quadrata inflexarum, ut BI, FI, DI, aequalia spatio dato, patebit, ex Apolloniano (¹) pridem restituto theoremate, locum NIP esse circulum positione datum, similisque omnino analysis in quovis alio plano exposito locum habebit.

Quoniam igitur plana omnia exposita dent circulos locales in infinitum, ergo superficies primum quæsita, ex vi secundi lemmatis, erit sphaera.

Quoniam enim superficiem localem proposito satisfacientem quæramus, quid vetat imaginari superficiem quæsitam plano exposito seetam? At sectio circulus esse duntaxat potest; quoniam enim circulus, ut jam demonstravimus, satisfaciat loco cui etiam superficies integra satisfacere debet, patet circulum in dicta superficie locali necessario collocandum. Constat igitur superficiem localem in specie proposita, dum planis secatur, dare infinitos circulos ac proinde esse sphæram.

¹ *Tour plus haut Apollonius de locis planis* Libr. II. prop. V, page 37.

Eàdem ratione demonstrabuntur et sequentes loci :

Si a quotcumque punctis in uno vel diversis planis ad punctum unum inflectantur rectæ, et quadrata, quæ ab aliquibus inflexarum fiunt, ad quadrata quæ a reliquis, sint vel in data ratione vel in data differentia vel dato majora aut minora quam in ratione, punctum ad inflexionem erit ad sphæram positione datam.

Non dissimili artificio pulcherrima in infinitum superficieï sphæricæ symptomata detegentur.

Si sint quotlibet plana positione data, et a puncto quodam in data plana demittantur rectæ in angulis datis, quarum quadrata omnia simul sumpta æquentur spatio dato, punctum erit ad superficiem sphaeroidis positione dati.

Fiat analysis et exponatur, ut docet methodus, planum quodlibet positione datum, in quo (juxta præcepta locorum planorum et solidorum quæ in uno duntaxat plano olim expendebamus) quaeratur linea localis a cuius puncto quolibet in plana data demissarum in angulis datis quadrata æquentur spatio dato.

Facillima statim evadet constructio : quum enim planum expositum detur positione non secus ac plana data, ergo et communes plani expositi et datorum sectiones similiter dantur. Commodam igitur in analyticis denominationem accipiunt rectæ a quovis puncto plani expositi in plana data demissæ. Harum quadrata si jungas et æques spatio dato, exhibebit analysis in plano exposito circulos tantum aut ellipses locales, neque in quovis alio plano positione dato alium methodus locum poterit exhibere, ut ipse analyseos progressus indicabit.

Patet itaque, ex tertio lemmate, locum quæsitus, quum circulos detinunt aut ellipses, esse sphæroiden.

Si quadratorum hujusmodi pars quævis assignata ad reliquam sit in data differentia vel in data ratione vel dato major aut minor quam in ratione, sicut superficies aut sphæroidis aut conoidis aut conicæ aut cylindricæ etc., prout positio datorum planorum expostulabit, idque statim solerti analyseos filo deprehendetur.

Verbi gratia, si sint in data ratione, fiunt superficies, ut plurimum, conoideōn; si vero communes sectiones planorum datorum ad unum punctum concurrant, fiunt superficies mere conicæ; et, si sectiones planorum datorum sint inter se parallelae, fiunt superficies mere cylindricaæ, hoc est, vel nostrorum vel communium cylindrorum.

* Usus omnia statim patefaciet : generalia quippe summatim tradenda sunt, nec frequentibus nimis exemplis methodi perspicuitas obruenda.

Ultimum plano locali destinavimus exemplum, quod primam fortasse sedem debuerat occupare.

Si sint quotlibet plana positione data, et a puncto quovis in dicta plana demittantur rectæ in datis angulis, et sit vectorum omnium demissarum summa æqualis rectæ datae, punctum erit ad planum positione datum.

Secentur quippe, ex superiori methodo, plana data a plano quolibet positione dato, et in eo, juxta methodum locorum planorum jam traditam, queratur locus propositioni satisfaciens. Erit ille linea recta, ut constabit ex analysi, et in quibuscumque per plana sectionibus idem contingit. Patet igitur, ex primo lemmate, locum quæsitus esse superficiem planam.

Si hujusmodi rectarum pars quavis assignata ad reliquam sit in data differentia vel ratione, vel datâ major quam in ratione, punctum erit similiter ad superficiem planam positione datum.

Imo et in superioribus questionibus, si plana essent inter se parallela, superficies localis esset plana, quod vix erat ut admoneremus.

CORONIS loco addere libet et huic etiam aptare operi insigne illud, de loco ad tres < et > quatuor lineas Apollonii (¹), επνγειρησ.

(¹) Pappi Alexandrinii Collectionis que supersunt (éd. Hultsch, Berlin, 1876-1878), Livre VII, pages 674-681.

Pappus (p. 678, l. 15 à 95) définit le lieu à trois ou quatre lignes, à propos d'un passage de la Préface des *Coniques* d'Apollonius, qu'il reproduit et qu'il discute. Au reste, l'invention du problème est antérieure au géomètre de Perge et doit remonter au moins à Aristée l'Ancien, qui en avait probablement abordé l'analyse dans ses *Livres perdus Des lieux*.

Si sint tria plana positione data, et a puncto quodam in dicta plana demittantur rectæ in datis angulis, et sit quod fit a duabus ductis rectangularum ad quadratum reliqua in ratione data, punctum erit vel ad planum vel ad sphærām vel ad sphærōiden vel ad conoides vel etiam ad superficies conicam aut cylindricam (rētērem aut novām), prout plana data positionem sortita fuerint.

Nec absimilis in quatuor planis inventio, ut cūlibet obvium.

Casus, determinationes, infinita problemata localia seu mavis theorematā, quæ brevitatis causa omisimus, lemmatum præmissorum demonstrationes, et reliqua quæ diligentius forsitan fuerant explicanda, sedulus et accuratus Geometra, cū haec venerint in manus, facillime supplebit, neque latebit deinceps arduæ, ut videbatur, materiæ proclivis intelligentia.

Tolosie, 6 januarii 1643.

solides; Apollonius reprochait à Euclide de n'avoir, dans ses *Coniques*, donné qu'une synthèse incomplète.

La question était redevenue célèbre depuis l'apparition de la *Géométrie* de Descartes, où elle joue un rôle capital; voir notamment pages 34 et suivantes de l'édition originale (*Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie qui sont des essais de cette méthode.* A Leyde, de l'imprimerie de Jan Maire, CII IDC XXXVII. Avec privilège); pages 71 à 78 de l'édition de Paris, Hermann, 1886. Mais Fermat avait lui-même abordé dès longtemps ce problème: voir plus haut, pages 87 à 89.



DE SOLUTIONE
PROBLEMATUM GEOMETRICORUM
 PER CURVAS SIMPLICISSIMAS
ET UNICUIQUE PROBLEMATUM GENERI PROPRIE CONVENIENTES.
DISSERTATIO TRIPARTITA.

PARS I.

Ut constet Cartesium in Geometricis etiam hominem esse, quod paradoxum merito forsan quis dixerit, videant subtiliores Cartesiani an mendum contineat linearum curvarum in certas classes aut gradus Cartesiana distributio, et an probabilior et commodior secundum veras Analyseos Geometricæ leges debeat assignari. Quod sine dispendio famæ tanti et tam celebris viri exsecuturos nos censemus, quum Cartesii et Cartesianorum omnium intersit veritatem, eujus fautores se non immerito jactant acerrimos, licet ipsorum placitis aliquantisper aduersetur, omnibus aut (si generale hoc nimis) Geometris saltem et Analystis fieri manifestam.

Problematum geometricorum in certas classes distributio, non solum veteribus, sed et recentioribus necessaria visa est Analystis. Proponatur videlicet

$$A + D = B,$$

aut

$$\sqrt{quadratum} + B \text{ in } A = \text{æquari} = Z \text{ plano.}$$

Hæ due æquationes quarum prior radicem aut latus ignotum suis ter-

minis non excedit, posterior autem lateris ignoti secundam potestatem sive quadratum continet, primum et simplicius problematum genus constituunt. Ea vero sunt problemata quæ plana Geometris dici consueverunt.

Secundum problematum genus illud est in quo quantitas ignota ad tertiam vel ad quartam potestatem, hoc est ad cubum vel ad quadratoquadratum, pertingit. Ratio autem eur duæ potestates proximæ, licet diversi gradus sint, unum tamen tantum constituant problematum genus, hæc est, quod æquationes quadraticæ reducuntur ad simplices aut laterales facili, quæ et veteribus et novis cognita est, methodo, ideoque per regulam et circinum nullo negotio resolvuntur. Equationes autem quarti gradus sive quadratoquadraticæ reducuntur ad æquationes tertii gradus sive cubicas beneficio novæ, quam Vieta et Cartesius proddiderunt, methodi. Huic enim operi Vieta subtilem illam et sibi peculiarem climaeticam paraplerosin destinavit, ut apud eum videre est eap. 6 libelli *De emendatione aequationum*, nec absimili in pari easu usus est artificio Cartesius (¹), licet aliis verbis illud enunciet.

Similiter quoque cubocubicam æquationem ad quadratocubicam sive æquationem sexti gradus ad æquationem quinti deprimet, licet aliquanto difficilius, Vietæus aut Cartesianus Analysta (²). Ex eo autem quod in prædictis casibus, in quibus una tantum ignota quantitas invenitur, æquationes graduum parium ad æquationes graduum imparium proxime minorum deprimuntur, idem omnino contingere in æquationibus in quibus duæ ignotæ quantitates reperiuntur confidenter pronunciavit Cartesius paginâ 323 Geometriæ lingua gallicâ ab ipso conscriptæ (³).

(¹) VIETE, édition Schooten, pages 150 et suivantes. — DESCARTES (*Géométrie*), édition de 1637, pages 383 et suivantes; édition de 1886 (Paris, Hermann), pages 65 et suivantes.

(²) Cette assertion est singulière : Fermat a-t-il cru, d'après le passage de Descartes rapporté dans la note qui suit, que son rival possédait le secret d'une pareille réduction ?

(³) DESCARTES (*Géométrie*, édition de 1637, p. 323) : « Au reste, je mets les lignes courbes qui font monter cette équation jusqu'au quarré de quarré, au même genre que

Hujusmodi vero sunt aequationes omnes linearum curvarum constitutivæ : in his enim non solum prædicta rednetio vel depresso non succedit, ut Cartesius affirmabat, sed eam omnino impossibilem Analystæ experientur. Proponatur, verbi gratia, aequatio paraboles quadratoquadratice constitutiva, in qua

$$\text{A}^2\text{quadra}^2\text{quadratum} = \text{aequatur} = \text{Z} \text{ solidi in E};$$

qua ratione aequatio hæc quarti gradus deprimetur ad tertium? quo intentur remedio climactice parapleroseos artifices?

Quantitatibus autem ignotis characteres vocalium juxta Vietam assignamus: hæc enim levia et prorsus arbitraria eur immutarit Cartesius (¹), non video.

Ut autem pateat disquisitionem hanc aut animadversionem non esse otiosam et inutilem, suppetit methodus universalis qua problemata quaecunque ad certum curvarum gradum reducimus.

Proponatur namque problema in quo quantitas ignota ad tertiam vel ad quartam potestatem ascendat, illud per sectiones conicas quæ sunt secundi gradus expediemus; sed si aequatio ad quintam vel ad sextam potestatem ascendat, tunc solutionem per curvas tertii gradus possumus exhibere; si aequatio ad septimam vel ad octavam potestatem ascendat, solutionem per curvas quarti gradus exhibebimus, et sic uniformi in infinitum methodo. Unde evidens fit non hie de nomine tantum, sed de re agitari questionem.

Proponatur in exemplum

$$\text{A} \text{ cub. cub.} + \text{B} \text{ pl. sol. in A} = \text{aequari} = \text{Z} \text{ sol. sol.},$$

aut, si velis,

$$\text{A} \text{ qu. cub.} + \text{B} \text{ pl. pl. in A} = \text{aequari} = \text{Z} \text{ pl. sol.};$$

celles qui ne la font monter que jusqu'au cube; et celles dont l'équation monte au carré de cube, au même genre que celles dont elle ne monte qu'au sursolide, et ainsi des autres; dont la raison est qu'il y a règle générale pour réduire au cube toutes les difficultés qui vont au carré de carré, et au sursolide toutes celles qui vont au carré de cube; de façon qu'on ne doit pas les estimer plus composées. » (Page 20 de l'édition de 1886.)

(¹) On sait que Descartes fut le premier à désigner les inconnues par les dernières lettres de l'alphabet; c'est également à lui que remonte l'emploi, en Algèbre, dans les Ouvrages imprimés, des minuscules italiques.

in utroque hoc easu problema solvemus per curvas tertii gradus seu cubicas, quod et fecit Cartesius (¹). Sed si proponatur

$$\begin{aligned} & \text{A}qu., cub., cub. + \text{B}pl., pl., sol. \text{ in A} \quad \text{æquari} \quad \text{Z}pl., sol., sol., \\ \text{aut} \quad & \text{A}qu., qu., cub. + \text{B}sol., sol. \text{ in A} \quad \text{æquari} \quad \text{Z}pl., pl., sol., \end{aligned}$$

tunc problema solvemus per curvas quarti gradus seu quadratoquadraticas, quod nec fecit nec fieri posse existimavit Cartesius (²), quum in hoc easu ad curvas quinti vel sexti gradus necessario recurrendum crediderit. Puriorem certe Geometriam offendit qui ad solutionem enjusvis problematis curvas compositas nimis et graduum elatiorum assumit, omissis propriis et simplicioribus, quum jam saepe et a Pappo (³) et a recentioribus determinatum sit non leve in Geometria peccatum esse quando problema ex impropio solvitur genere. Quod ne accidat, corrigendum est Cartesius et singula problemata suis, hoc est propriis et naturalibus, sedibus restituenda.

Sed et pag. 322 (⁴) idem Cartesius diserte asserit curvas ex intersectione regulæ et alterius aut rectæ aut curvae oriundas esse semper elati-

(¹) *Géométrie de Descartes*, édition de 1637, pages 503 et suivantes; édition de 1886, pages 80 et suivantes.

(²) *Géométrie de Descartes*, édition de 1637, page 389: « Si la quantité inconnue a trois ou quatre dimensions, le problème pour lequel on la cherche est solide, et si elle en a cinq ou six, il est d'un degré plus composé, et ainsi des autres. » (Page 71 de l'édition de 1886.)

Le reproche spécial adressé ici à Descartes par Fermat n'est certainement pas fondé: Descartes a bien eu le tort de considérer comme d'un seul GENRE n les courbes de degré $2n-1$ et $2n$; mais, pour résoudre un problème de degré $2n-1$ ou $2n$, il ne demandait que des courbes de degré n . Voir page 308 de l'édition de la *Géométrie* de 1637, page 10 de l'édition de 1886. Fermat a été induit en erreur en croyant retrouver partout dans le langage de Descartes les conséquences de l'idée erronée qu'il se proposait de relever.


(³) PAPPS. Livre IV, 59; édition Hultsch, page 270, lignes 27 et suivantes.

(⁴) Édition de 1886, page 20: « Mais si au lieu d'une de ces lignes courbes du premier genre, c'en est une du second qui termine le plan CNKL, on en décrira par son moyen une du troisième, ou si c'en est une du troisième, on en décrira une du quatrième, et ainsi à l'infini. »

Descartes suppose que le plan CNKL se tient parallèlement à lui-même, le point L parcourant la droite fixe AB. La courbe décrite est le lieu de l'intersection de la droite GL, déterminée par le point fixe G et le point mobile L, avec une courbe CK donnée sur le plan mobile. Si l'on suppose que les x soient parallèles à AB, les y à AG, que l'équation de la courbe donnée, en prenant L pour origine des axes, soit $F(x, y) = 0$; si enfin l'on

tioris gradus aut generis, quam est recta aut curva in figura pag. 321 (fig. 90), ex qua derivantur. Intelligatur, si placet, in locum ipsius rectæ CNK, in dicta figura pag. 321, substitui parabolæ cubicæ ejus vertex sit punctum K et axis indefinitus KLBA, et cætera construantur

Fig. 90.



ad mentem Cartesii. Patet æquationem dictæ parabolæ cubicæ constitutivam esse sequentem

I cub. ex una parte, et *B quad.* in *E* ex altera.

Experiere autem statim curvam EC ex hujusmodi positione provenientem ad æquationem tantum quadratoquadraticam ascendere : ergo curva quadratoquadratica est elatioris gradus aut generis quam curva cubica, secundum prædictam Cartesii definitionem, quum tamen contrarium pag. 323 (¹) expresse idem Cartesius definierit, curvam nempe

pose $AG = a$, il est aisè de voir que l'équation de la courbe décrite sera, en prenant A pour origine,

$$F\left(\frac{xy}{a-y}, y\right) = 0.$$

Or, l'assertion de Descartes revient à dire que, si l'équation de la courbe donnée est du degré $2n-1$ ou $2n$, l'équation de la décrite sera du degré $2n+1$ ou $2n+2$. Il est singulier que, au lieu de relever ce lapsus évident, Fermat se soit au contraire attaché à montrer que, dans tel cas particulier, le degré de la courbe décrite pouvait être encore moins élevé que celui indiqué par Descartes.

(1) Voir la note 3 de la page 119.

quadratoquadraticam et curvam cubicam esse unius et ejusdem gradus aut generis.

Methodum autem nostram qua omnia in infinitum problemata, ea nempe quorum aequationes tertiam et quartam potestatem continent, ad secundum curvarum gradum : quae quintam et sextam potestatem, ad tertium : quae septimam et octavam, ad quartum reducimus, et eo in infinitum ordine, exhibere non differemus quotiescumque id valuerint quibus piaculum videtur errores quosecumque vel etiam Cartesianos in prajudicium veritatis dissimulare.

Nec moveat problemata quae ad secundam potestatem ascendunt et quae ejusdem cum problematis primi gradus sint speciei et plana dicuntur, circulis, hoc est curvis secundi gradus, indigere; snum enim et proprium huic objectioni responsum non deerit, quum methodum nostrum generalem omnia omnino problemata per curvas convenientes absolventem proferemus.

DISSERTATIONIS

PARS II.

Ut datae publice fidei satisfiat, methodum generale ad solvenda quaecumque problemata per curvas proprias et convenientes exhibemus. Prædictum est jam in prima Dissertationis parte problemata duorum gradum inter se proximorum, tertii verbi gratia et quarti, quinti et sexti, septimi et octavi, noni et decimi, etc., unicum tantum curvarum gradum respicere : problemata nempe quae ad tertiam vel quartam potestatem ascendunt, solvi per curvas secundi gradus; ea vero quae ad quintam vel ad sextam potestatem ascendunt, solvi per curvas tertii gradus; etc., in infinitum.

Modus autem operandi talis est : Data quævis aequatio, in qua unica tantum reperitur ignota quantitas, reducatur primo ad gradum elatiorem sive parem; deinde ab affectione sub latere omnino liberetur. Quo peracto remanebit aequatio inter quantitatem cognitam vel homogeneum datum ex una parte, et aliquod homogeneum incognitum,

cujuſ ſingula membra a quadrato lateris ineogniti adſicientur, ex altera. Homogenem iſtud ineognitum æquetur quadrato cujuſ latus effingendum eo artificio ut, in aequatione ipsius quadrati cum homogeneo ineognito, elatiores quantum fieri poterit lateris ignoti gradus evanescant. Cavendum etiam ut ſingula lateris quadratici ſic effingendi homogenea a radice vel latere ignoto adſcientur, et ultimum tandem ex illis a ſecunda etiam radice ineognita adſcientur. Orientur tandem beneficio divisionis ſimplieis ex una parte, et extractionis lateris quadrati ex altera, duæ aequationes linearum curvarum problemati dato convenientium constitutivæ, et earum intersectio ſolutionem problematis exhibebit, eà qua dudum uſi ſumus in ſolutione problematum per locos methodo.

Exemplum proponatur, ſi placet,

$$\Lambda cub. cub. + B \text{ in } \Lambda qu. cub. + Z pl. \text{ in } \Lambda qu. qu.$$

$$+ D sol. \text{ in } \Lambda cub. + M pl. pl. \text{ in } \Lambda qu. \quad \text{aequari} \quad N sol. sol. :$$

problemata quippe omnia que ad quintam vel ad ſextam potestatem aſcendunt ad hanc formam reduci poſſunt. Nihil enim hoc aliud eſt quam vel quintam potestatem ad ſextam evahere vel eam deinde ab ultima affectione ſub Λ vel latere liberare, que omnia et Vieta (¹) et Carteſius (²) abunde doceuerunt.

Effingatur itaque quadratum a latere

$$\Lambda cub. + B \text{ in } \Lambda \text{ in } E$$

et æquetur priori prium illius aequationis parti. Fiet itaque

$$\Lambda cub. cub. + B \text{ in } \Lambda qu. qu. \text{ in } E \text{ bis} + B qu. \text{ in } \Lambda qu. \text{ in } E qu.$$

$$\text{æquale} \quad \Lambda cub. cub. + B \text{ in } \Lambda qu. cub. + Z pl. \text{ in } \Lambda qu. qu. \\ + D sol. \text{ in } \Lambda cub. + M pl. pl. \text{ in } \Lambda qu.$$

et, deleto utrimque $\Lambda cub. cub.$ et reliquis per $\Lambda qu.$ diuſis, quod ex

(¹) VIÈTE, *De emendatione aequationum*, cap. I (éd. Schooten, p. 132).

(²) DESCARTES, *Géométrie*, page 383 de l'édition de 1637, page 65 de l'édition de 1886.

cautione adjecta methodo semper liberum est, remanebit æquatio inter

$B \text{ in } A cub. + Z pl. \text{ in } A qu. + D sol. \text{ in } A + M pl. pl.$ ex una parte.

et

$B \text{ in } A qu. \text{ in } E \text{ bis } + B qu. \text{ in } E qu.$ ex altera.

Hæc autem æquatio, ut patet, dat curvam tertii gradus.

Quia autem, ut constituatur duplicata æqualitas et commode ad solutionem problematis deveniatur, æquandum etiam est quadratum a latere $A cub. + B \text{ in } A \text{ in } E$ posteriori prioris æquationis parti, hoc est $N sol. sol.$, ergo, per extractionem lateris quadrati, latus quadratum $N sol. sol.$, quod facile datur et dicatur, si placeat, $N sol.$, æquabitur

$$A cub. + B \text{ in } A \text{ in } E,$$

quod est latus quadrati priori æquationis primum datae parti æqualis.
Habemus igitur hanc secundam æquationem

$$\text{inter } N sol. \text{ et } A cub. + B \text{ in } A \text{ in } E,$$

quæ dabit pariter curvam tertii gradus. Quis deinde non videt intersectionem duarum curvarum jam inventarum dare valorem ipsius A , hoc est problematis propositi solutionem?

Si problema ad septimam vel ad octavam potestatem ascendat, statuetur primo sub forma octavæ potestatis, deinde ab affectione sub latere omnino liberabitur. Hoc peracto, esto itaque, post legitimam ex jam præscripta methodo reductionem,

$$\begin{aligned} & A qu. cub. cub. + B \text{ in } A qu. qu. cub. + D pl. \text{ in } A cub. cub. \\ & + N sol. \text{ in } A qu. cub. + M pl. pl. \text{ in } A qu. qu. \\ & + G pl. sol. \text{ in } A cub. + R sol. sol. \text{ in } A qu. \text{ æquale } Z pl. sol. sol. \end{aligned}$$

Effingetur quadratum cuilibet istius æquationis parti æquandum a latere

$$A qu. qu. + B \frac{1}{2} \text{ in } A cub. + D pl. \text{ in } A \text{ in } E.$$

Secundum autem hujus lateris quadratici homogeneum eo artificio effinximus ut duæ elatiōres lateris vel radicis A potestates in æquatione omnino evanescant, quod perfacile est. Quadratum igitur illius lateris

si æques priori æquationis propositæ partí, deletis communib[us] et reliquis per A qu. divisis, orietur æquatio curvæ quarti gradus constitutiæ ex una parte,

Deinde, post extractionem lateris quadrati ex altera æquationis primum propositæ parte, latus Zpl. sol. sol., quod Ppl. pl. dicere licet, æquabitur

$$A qu. qu. + B \frac{1}{2} \text{ in } A cub. + D pl. \text{ in } A \text{ in } E;$$

haec vero æquatio dabit etiam aliam quarti gradus curvam, et harum duarum curvarum intersectio dabit valorem A, hoc est problematis propositi solutionem.

Notandum porro in problematis quæ ad nonam aut decimam potestatem ascendunt, ita effingendum latus quadrati ut in eo sint quatuor ad minus homogenea quorum beneficio evanescant tres elatiores lateris ignoti gradus; in problematis autem quæ ad undecimam aut duodecimam potestatem ascendunt, latus effingendi quadrati constare debere quinque ad minus homogeneis, ita formandis ut eorum beneficio quatuor elatiores lateris ignoti gradus evanescant. Perpetua autem et facililla methodo, hanc lateris quadrati effingendi formam per solam et simplicem divisionem vel applicationem, ut verbis geometricis et in re pure geometrica utamur, expediri Analystæ experiendo deprehendent, et characterum + et — variatio nullum methodo præjudicium est allatura.

Quum autem problemata quæ ad secundam potestatem ascendunt per extractionem lateris quadrati reducantur ad primam, ut notum est, per lineas primi gradus, hoc est rectas, expedientur, et vana evadet quam in priore Dissertationis istius parte metueramus objectio, quum extractionem radicis quadraticæ tanquam notam et obviam in quolibet problematum genere ex nostra methodo usurpandam supposuerimus.

Non latebit igitur deinceps accrata et simplicissima problematum geometricorum per locos proprios a curvis variæ, prout expedit, speciei oriundos, resolutio et constructio. Variare autem curvas salvo semper et retento naturali problematis genere, liberum erit Analystis, et semper problemata octavi aut septimi gradus per curvas quarti,

problemata decimi aut noni per curvas quinti, problemata duodecimi et undecimi per curvas sexti et sic uniformi in infinitum methodo expedientur; quum contra per Cartesium problemata octavi aut septimi gradus curvis quinti aut sexti indigeant, problemata decimi aut noni curvis septimi aut octavi, problemata duodecimi aut undecimi curvis noni aut decimi et sic in infinitum. Quod quam longe a simplicitate et veritate geometrica absit, videant ipsi Cartesiani, aut, si ita visum fuerit, contradicant.

Veritatem enim tantum inquirimus et, si in scriptis tanti viri alieibi delitescat, eam libenti statim animo et amplectemur et agnoscemus. Tanta me sane, ut verbis alienis utar, hujus portentosissimi ingenii incessit admiratio, ut pluris faciam Cartesium errantem quam multos καποθεόντας.

DISSERTATIONIS

PARS III.

Haec ad generalem doctrinam fortasse sufficient : quæ enim problema Cartesius per gradus curvarum elatiores determinat expedienda, ea nos generali methodo ad curvarum gradum duplo minorem feliciter depressimus. Quod ita tamen intelligi debere pronunciamus, ut id saltem auxilium omnes omnino quæstiones admittant : majus quippe infiniti easus speciales non recusant. Juvat itaque ulterius exspatiari et Analysis Cartesianam non solum ad terminos duplo minores, sed ad quadruplo, sextuplo, decuplo, centuplo, etc. in infinitum aliquando minores deprimere, ut tanto magis error Cartesianus detegatur et proprium statim ab Analysis remedium consequatur : potestates autem per numeros ipsarum exponentes designare in gradibus elatioribus, deinceps commodius erit.

Proponatur invenire sex continue proportionales inter duas datas.

Sint duæ datae B et D; prima inveniendarum ponatur A : fiet

æquatio inter A^7 et B^6D .

Hæc æquatio secundum Cartesium per curvas quinti tantum aut sexti gradus solvi potest. Nos eam per curvas quarti gradus in secunda hujus Dissertationis parte, sicut reliquas etiam ejusdem naturæ, generaliter resolvimus. Sed nihil vetat quominus eam per curvas tertii gradus resolvamus.

Equentur quippe singuli æquationis termini homogeneo sequenti A^3E^2D : æquabitur ex una parte A^7 et, divisis omnibus per A^3 , manebit æquatio inter E^2D et A^3 quæ dat, ut patet, curvam tertii gradus. Ex altera vero parte A^3E^2D æquabitur B^6D , et, omnibus per D divisis et reliquis subquadratice depresso, manebit æquatio inter A^2E et B^3 quæ dabit etiam curvam tertii gradus. Harum autem duarum curvarum intersectio dabit valorem A , hoc est problematis propositi per curvas tertii gradus solutionem.

Sed proponatur *inter duas datas incenire duodecim medias proportionales continue,*

æquatio erit inter A^{13} et $B^{12}D$:

eam autem Cartesius tantum per curvas undecimi aut duodecimi gradus solvi posse existimavit. Nos generaliter, ut similes quasvis ejusdem gradus, eam in secunda hujus Dissertationis parte per curvas septimi gradus solvi posse docuimus. Sed ulterius inquirenti occurrit statim elegans per curvas quinti gradus solutio, imo et datur per curvas quarti, ut infra videre est.

Equentur primum singula hujus æquationis membra homogeneo A^3E^3D , ex una parte nempe A^{13} , et ex altera $B^{12}D$. In prima, omnibus per A^3 divisis, fiet æquatio inter A^5 et E^3D quæ dat curvam quinti gradus, ut patet. In secunda, omnibus per D divisis et per quartam potestatem sive quadratoquadratum depresso, remanebit æquatio inter A^2E et B^3 , quæ dat curvam tertii gradus. Per duas itaque curvas quarum una est quinti gradus, altera tertii, problema propositum expedimus.

Sed idem etiam problema facilius, hoc est per curvas quarti gradus, construere possumus: equentur singula æquationis membra A^9E^3D . Fiet illine, post divisionem per A^3 , A^3 æquale E^3D , quæ æquatio dat curvam quarti gradus; istine vero, omnibus per D divisis et deinde per

tertiam potestatem sive cubum depresso, fiet æquatio inter A^3E et B^4
quæ dabit etiam curvam quarti gradus. Problema itaque per duas
quarti gradus curvas facillime construimus.

Qui haec exempla viderit, non poterit dubitare quin *inventio triginta
mediarum continue proportionalium* per curvas septimi, imo et per
curvas sexti possit expediri. *Æquatio*

nempe inter A^{11} et $B^{10}D$

communi termino $A^{25}E^6D$ æquabitur, unde problema per curvas sep-
tusi gradus expedietur; aut communi termino $A^{25}E^7D$ æquabitur,
unde manabit solutio per curvas sexti gradus.

Sic *inventio* 72 mediarum solvetur per curvas noni gradus, et patet
ex premissis posse assignari rationem, inter gradum problematis et
gradum curvarum illud solventis, omni data ratione majorem. Quod
quum viderint Cartesiani, non dubito quin necessitati et admonitionis
et emendationis nostre subscrivant.

Advertendum autem immutandam saepe esse ipsam æquationis for-
mam, ut commodam per partes aliquotas divisionem homogenea ipsa
recipiant, quod semel monuisse sufficiet.

Proponatur videlicet *inventio decem mediarum* et sit

æquatio inter A^{11} et $B^{10}D$.

Ducatur quodlibet ex homogeneis in rectam datam, verbi gratia Z , ut
sit

æquatio inter $A^{11}Z$ et $B^{10}DZ$;

ita enim ad numerum 12 pervenietur cuius ope facillima per partes
aliquotas evadet reductio aut depressio. Æque puer videlicet quodlibet
ex homogeneis A^8E^4 : illinc orietur

æquatio inter A^3Z et E^4 ,

quæ dat curvam quarti gradus; istine vero, beneficio extractionis lateris
quadratoquadratici, inter A^2E et latus quadratoquadraticum homogenei
dati $B^{10}DZ$, quod, si plaet, sit N solidum, quæ æquatio dat curvam

tertii gradus, atque ita invenientur decem mediae per duas curvas quorum altera est quarti, altera vero tertii gradus : quod per levem illam prioris æquationis immutationem facillime sumus exsecuti.

Nec moror infinita alia quæ Analystis ars ipsa abunde suppeditabit compendia; hoc tantum adjungo ea omnia quæ superius diximus non solum locum habere, quum potestas ignota nullum aliud sub gradibus inferioribus affectum continet homogeneum, sed etiam si aliqua ex homogeneis a gradibus potestati proximioribus adficiantur : ut, si

$$A^{13} + NA^{12} + MA^{11} + RA^{10} \text{ æquetur } B^{12}D,$$

solutio hujus quæstionis periude facilis reddetur, communi adsumpto æquationis homogeneo quo supra usi sumus, nempe A^9E^3D , ac si inveniendæ duodecim mediae inter duas datas proponerentur. Simili autem in æquationibus ab altioribus gradibus affectis ntemur artificio.

Notandum tamen, in æquationibus in quibus una tantum reperitur ignota quantitas ex una parte, exponentem potestatis illius pure debere esse numerum primum ut ab eo gradus illius problematis designetur. Si enim exponens ille sit numerus compositus, problema ad gradus numerorum qui eum metiuntur statim devolvetur.

Querantur, exempli gratia, octo mediae continue proportionales inter duas datas, fieri

$$\text{æquatio inter } A^9 \text{ et } B^8D,$$

quo casu, quum numerus 9 sit compositus, a numero 3 bis mensuratus, inferetur problema esse tertii gradus : quod quidem ita se habet. Si enim inter duas datas reperiantur due mediae, et rursus inter primam et secundam, secundam et tertiam, tertiam et quartam reperiantur similiter due mediae, fient octo mediae inter duas primum proportionatas lineas.

Si querantur quatuordecim mediae inter duas datas, æquatio, que est inter A^{15} et $B^{14}D$, indicabit problema devolvi ad alia duo problemata, quorum unum est tertii gradus, alterum quinti.

Unde apparent exponentem pure potestatis debere esse numerum

primum ut vere gradum problematis exprimat et designet. Quoniam autem *numeros a binario quadratice in se duetos et unitate duetos esse semper numeros primos* (¹) apud me constet et jamidudum Analystis illius theorematis veritas fuerit significata, nempe esse primos 3, 5, 17, 257, 65537, etc. in infinitum, nullo negotio inde derivabitur methodus cuius beneficio *problema construemus cuius gradus ad gradum curvarum ipsius solutioni inservientium rationem habeat data quavis maiorem.*

Proponatur namque inter duas datas invenire 256 medias continue proportionales : fiet

$$\text{aequatio inter } A^{257} \text{ et } B^{256} D,$$

et singuli termini æquabuntur sequenti $A^{2^{10}} E^{16} D$, et mox quæstio per curvas 17ⁱ gradus expedietur.

Si querantur mediae 65536, quæstio per curvas 257ⁱ gradus solvetur, et sic in infinitum gradus majoris numeri deprimetur ad gradum numeri proxime minoris. Inter duos autem proximos rationem in infinitum augeri quis non videt?

An vero errasse Cartesium ulterius Cartesiani dissimulabunt? ego sane ξπέζω et quid statuendum haec de re sit sollicitus et tacitus exspecto.

(1) C'est la célèbre proposition, que $2^{2^n}-1$ est un nombre premier, dont Euler a reconnu la fausseté pour $n=5$, c'est-à-dire pour le nombre qui suit immédiatement le dernier donné par Fermat.



METHODUS

AD

DISQUIRENDAM MAXIMAM ET MINIMAM⁽¹⁾.

Omnis de inventione maxime et minime doctrina duabus positionibus in notis innititur et hac unica praeceptione :

Statnatur quilibet questionis terminus esse *A* (sive planum, sive solidum aut longitudo, prout proposito satisficeri par est) et, inventa maximâ aut minimâ in terminis sub *A*, gradu < aut gradibus >, ut libet, involutis, ponatur rursus idem qui prius terminus esse *A + E*, iterumque inveniatur maxima aut minima in terminis sub *A* et *E* gradibus, ut libet, coefficientibus. Adaequentur, ut loquitur Diophantus⁽²⁾, duo homogenea maxime aut minime aequalia et, demptis communibns (quo peraeto, homogenea omnia ex parte alterutra ab *E* vel ipsius gradibus afficiuntur), applicentur omnia ad *E* vel ad elatiorem ipsius gradum, donec aliquod ex homogeneis, ex parte utravis,

⁽¹⁾ Cet écrit, envoyé, par l'intermédiaire de Mersenne, à Descartes, qui le reçut vers le 10 janvier 1638, devint dès lors, entre Fermat et l'auteur de la *Géométrie*, le principal thème de la polémique déjà ouverte à propos de la *Dioptrique*.

Le second alinéa se retrouve intégralement vers la fin de l'écrit IV suivant. Les additions entre crochets — *aut gradibus* (ligne 3 de l'alinéa); *sub* (page 134, ligne 2) — sont empruntées à cette seconde rédaction et ne doivent pas avoir figuré dans la première. Les seules autres divergences correspondent aux leçons suivantes du texte postérieur : page 134, lignes 1, 2, 3 « *Elisis, . . . homogeneis, . . . involutis, reliqua* » — ligne 4 : « *istius ultime* ».

⁽²⁾ Diophante emploie (V, 14 et 17), dans un but spécial et pour désigner une égalité approximative, les termes de περιστης et de περισση, que Xylander et Bachet ont traduits par *adæqualitas* et *adæquate*.

affectione sub E omnino liberetur. Elidantur deinde utrumque homogenea sub E aut <sub> ipsius gradibus quomodolibet involuta, et reliqua æquentur, aut, si ex una parte nihil superest, æquentur sane, quod eodem recidit, negata affirmatis. Resolutio ultimæ istius æqualitatis dabit valorem A , quæ cognitæ, maxima aut minima ex repetitis prioris resolutionis vestigis innotescet.

Exemplum subjecimus : *Sit recta AC (fig. 91) ita dividenda in E ut rectangulum AEC sit maximum.*

Fig. 91.



Recta AC dicatur B . Ponatur pars altera ipsius B esse A : ergo reliqua erit $B - A$, et rectangulum sub segmentis erit $B \text{ in } A - Aq.$, quod debet inveniri maximum. Ponatur rursus pars altera ipsius B esse $A + E$: ergo reliqua erit $B - A - E$, et rectangulum sub segmentis erit

$$B \text{ in } A - Aq. + B \text{ in } E - A \text{ in } E \text{ bis} + Eq.,$$

quod debet adæquari superiori rectangulo

$$B \text{ in } A - Aq.$$

Demptis communibus,

$$B \text{ in } E - \text{adæquabitur} - A \text{ in } E \text{ bis} + Eq.,$$

et, omnibus per E divisis,

$$B - \text{adæquabitur} - A \text{ bis} + E.$$

Elidatur E ,

$$B - \text{æquabitur} - A \text{ bis}.$$

Igitur B bifariam est dividenda ad solutionem propositi; nec potest generalior dari methodus.

DE TANGENTIBUS LINEARUM CURVARUM.

Ad superiorem methodum inventionem tangentium ad data puncta in lineis quibuscumque curvis reducimus.

Sit data, verbi gratia, *parabola* BDN (*fig. 92*), cujus vertex D, diameter DC, et punctum in ea datum B, ad quod ducenda est recta BE tangens parabolam et in punto E cum diametro concurrens.




Fig. 92.

Ergo, sumendo quodlibet punctum in recta BE, et ab eo ducendo ordinatam OL, a puncto autem B ordinatam BC, major erit proportio

$$CD \text{ ad } DI \text{ quam quadrati } BC \text{ ad quadratum } OL,$$

quia punctum O est extra parabolam; sed, propter similitudinem triangularium,

ut BC quadratum ad OL quadratum, ita CE quadratum ad IE quadratum :
major igitur erit proportio

$$CD \text{ ad } DI \text{ quam quadrati } CE \text{ ad quadratum } IE.$$

Quam autem punctum B detur, datur applicata BC, ergo punctum C;
datur etiam CD : sit igitur CD aequalis *D* datæ. Ponatur CE esse *A* :
ponatur CI esse *E*.

Ergo

$$D \text{ ad } D - E \text{ habebit majorem proportionem}$$

$$\text{quam } Aq. \text{ ad } tq. + Eq. - 1 \text{ in } E \text{ bis.}$$

Et, ducendo inter se medias et extrebas,

$$D \text{ in } tq. + D \text{ in } Eq. - D \text{ in } 1 \text{ in } E \text{ bis} \quad \text{majus erit quam} \quad D \text{ in } 1q. - 1q. \text{ in } E.$$

Adæquentur igitur juxta superiorem methodum : demptis itaque communibus,

$$D \text{ in } Eq. - D \text{ in } 1 \text{ in } E \text{ bis} \quad \text{adæquabitur} \quad - 1q. \text{ in } E,$$

aut. quod idem est,

$$D \text{ in } E_{q_1} \vdash Iq_1 \text{ in } E \quad \text{adæquabitur} \quad D \text{ in } I \text{ in } E \text{ bis.}$$

Omnia dividantur per E : ergo

$$D \text{ in } E + Iq_1 \quad \text{adæquabitur} \quad D \text{ in } I \text{ bis.}$$

Elidatur D in E : ergo

$$Iq_1 \quad \text{æquabitur} \quad D \text{ in } I \text{ bis.}$$

ideoque

$$I \quad \text{æquabitur} \quad D \text{ bis.}$$

Ergo CE probavimus duplam ipsius CD, quod quidem ita se habet.

Nec unquam fallit methodus; imo ad plerasque quæstiones pulcherrimas potest extendi; ejus enim beneficio centra gravitatis (¹) in figuris lineis curvis et rectis comprehensis et in solidis invenimus, et multa alia, de quibus fortasse alias, si otium suppetat.

De quadraturis spatiorum sub lineis curvis et rectis contentorum, imo et de proportionibus solidorum ab eis ortorum ad conos ejusdem basis et altitudinis, fuse jam cum Domino de Roberval egimus (²).

II.

CENTRUM GRAVITATIS PARABOLICI CONOIDIS,

EX EADEM METHODO (³).

Esto parabolicus conois CBAV (*fig. 93*), cuius axis IA, basis circulus circa diametrum CIV. Quæritur centrum gravitatis perpetuâ et con-

(¹) *Four* ci-après sous le numéro II.


(²) *Four* les lettres de Fermat à Roberval des 22 septembre, 4 novembre et 16 décembre 1636.

(³) Cet écrit paraît être celui que Fermat adressa, pour Roberval, à Mersenne, avec sa lettre du 20 avril 1638. Mersenne en envoya l'énoncé à Descartes, le 1^{er} mai suivant, sans prendre soin de supprimer les derniers mots, malgré l'allusion directe qu'ils renfermaient.

stanti, qua maximam et minimam et tangentes linearum curvarum investigavimus, methodo, ut novis exemplis et novo usu, eoque illustri, pateat falli eos qui fallere methodum existimant.

Ut posset parari analysis, axis IA dicatur B ; ponatur centrum gravitatis esse O , et rectam AO ignotam dici A ; secetur axis IA quovis piano, ut BN, et ponatur IN esse E : ergo NA erit $B - E$.

Fig. 93.



Constat in hac figura et similibus (parabolis aut parabolicis) centra gravitatum, in portionibus abscissis per parallelas basi, in eadem proportione dividere axes (quod, in parabole ab Archimedē (1) demonstratum, porrigitur non dissimili ratiocinio ad parabolas omnes et parabolicos conoides, ut patet): ergo centrum gravitatis portionis cuius axis NA, baseos semidiameter BN, ita dividet AN in puncto, verbi gratia, E,

ut ratio NA ad AE sit eadem rationi IA ad AO.

Erit igitur, in notis,

ut B ad t , ita $B - E$ ad portionem axis AE ,

que idcirco aequabitur

$$\frac{B \sin t - t \sin E}{B},$$

et ipsa OE , que est intervallum inter duo centra gravitatis, aequabitur

$$\frac{t \sin E}{B}.$$

Ponatur portionis reliqua CBRV centrum gravitatis esse M, quod

(1) ARCHIMÈDE, *De aequiponderantibus*, II, prop. vii.

necessario debet esse inter puncta N et L, intra figuram, per petitio-
nem 9 Archimedis *De aequiponderantibus* (¹), quum figura CBRV sit in
easdem partes cava. Sed

ut portio CBRV ad portionem BAR, ita est EO ad OM,

quum O sit centrum gravitatis totius figuræ CAV, et puncta E et M
sint centra gravitatis partium; portio autem CAV ad portionem BAR
est, in nostro conoide Archimedeo (²), ut quadratum LA ad quadratum
NA, hoc est, in notis,

ut $Bq.$ ad $Bq. + Eq.$ — B in E bis :

ergo, dividendo,

portio CBRV est ad portionem BAR

ut B in E bis — $Eq.$ ad $Bq. + Eq.$ — B in E bis.

Demonstravimus autem

ut portio CBRV ad portionem BAR, ita esse OE ad OM :

erit igitur in notis

ut B in E bis — $Eq.$ ad $Bq. + Eq.$ — B in E bis, ita OE sive $\frac{t \text{ in } E}{B}$ ad OM,

que proinde aequabitur

$$\frac{Bq. \text{ in } t \text{ in } E + t \text{ in } Ec. - B \text{ in } t \text{ in } Eq. \text{ bis}}{Bq. \text{ in } E \text{ bis} - B \text{ in } Eq.}.$$

Quum autem punctum M, ex demonstratis, sit inter puncta N et L,
ergo recta OM erit minor rectâ OL; recta autem OL in notis est $B - A$:

(¹) *— PETIT. IX.* Cuiuscunque figura si fuerit ambitus in easdem partes cavus, centrum
gravitatis figuræ intus esse », page 158 de l'édition ARCHIMEDES *Opera que extant, novis
demonstrationibus commentariisque illustrata* per Davidem Rivaltum a Flurantia Caeno-
mōnum etc. — Parisiis, apud Claudium Morellum, via Jacobæa, ad insigne Fontis.
M. DC. XV.

(²) ARCHIMÈDE, *De conoidibus et sphéroïdibus*, prop. xxvi.

deducta est igitur quæstio ad methodum et adæquanda

$$B = 4 \text{ cum } \frac{Bq. \text{ in } 4 \text{ in } E + 4 \text{ in } Ec. - B \text{ in } 4 \text{ in } Eq. \text{ bis}}{Bq. \text{ in } E \text{ bis} - B \text{ in } Eq.}$$

et, omnibus ductis in denominatorem et abs E divisis, adæquabuntur

$$Ec. \text{ bis} - Bq. \text{ in } 4 \text{ bis} = Bq. \text{ in } E + B \text{ in } 4 \text{ in } E$$

et

$$Bq. \text{ in } 4 + 4 \text{ in } Eq. - B \text{ in } 4 \text{ in } E \text{ bis}.$$

Quandoquidem nihil est utrumque commune, elidantur homogenea omnia abs E affecta, et æquentur reliqua : fiet

$$Ec. \text{ bis} - Bq. \text{ in } 4 \text{ bis} = \text{æqualis} = Bq. \text{ in } 4,$$

ideoque

$$4 \text{ ter} = \text{æquabitur} = B \text{ bis}.$$

Erit igitur

$$4A \text{ ad } AO \text{ ut } 3 \text{ ad } 2$$

et

$$AO \text{ ad } OI \text{ ut } 2 \text{ ad } 1.$$

Quod erat inveniendum (¹).

Non dissimili methodo in quibuslibet parabolis in infinitum et parabolicis conoidibus inveniuntur centra gravitatum. Quemadmodum autem, verbi gratia, *in nostro conoide parabolico circa applicatam axi converso* indaganda sint centra gravitatis, non vacat in præsens indicare : sufficit aperuisse me in hoc nostro conoide centrum gravitatis dividere axem in portiones quæ servant proportionem 11 ad 5 (²).

(¹) Ces relations étaient connues, d'après ARCHIMÈDE, *De iis quæ veluntur in aquâ*, Livre II, prop. 2 et suivantes. Elles étaient d'ailleurs démontrées dans la proposition 29 de l'Ouvrage : *Federici Commandini Urbinate liber de centro gravitatis solidorum. Cum privilegio in annos X. Bononie ex officina Alexandri Benuci. M. D. LXV*, publié en même temps que la restitution, par Commandin, du Traité précédent d'Archimède, où elles sont seulement supposées.

(²) Ce rapport avait déjà été indiqué à Roberval dans la lettre de Fermat du 4 novembre 1636.

III.

AD EAMDEM METHODUM.

Volo meā methodo *secare lineam AC* (fig. 94) *datam ad punctum B,*
ita ut solidum contentum sub quadrato AB et linea BC sit maximum om-
nium solidorum eodem modo descriptorum secando lineam AC in
quovis alio puncto.

Fig. 94.



Ponamus in notis algebraicis lineam AC vocari *B*, et lineam AB incognitam *A*: BC erit $B - A$: oportet igitur solidum $Aq.$ in $B - Ac.$ satisfacere questioni.

Sumamus iterum, loco *A*, $A + E$: solidum, quod fiet ex quadrato $\overline{A + E}$ et ex $B - E - A$, erit

$$\begin{aligned} & B \text{ in } 4q. + B \text{ in } Eq. + B \text{ in } A \text{ in } E \text{ bis} \\ & - 4e. - 4 \text{ in } Eq. \text{ ter} - 4q. \text{ in } E \text{ ter} - Ec. \end{aligned}$$

Id comparo primo solido

$$tq. \text{ in } B - 4e.,$$

tanquam essent aequalia, licet revera aequalia non sint, et hujusmodi comparationem vocavi adæqualitatem, ut loquitur Diophantus (sic enim interpretari possum græcam vocem παρισότης (¹) qua ille ntitur). Deinde e duobus solidis demo quod iis est commune, scilicet

$$B \text{ in } tq. - 4e.;$$

quo peracto, nihil ex una parte superest, et superest ex alia

$$B \text{ in } Eq. + B \text{ in } A \text{ in } E \text{ bis} - 4 \text{ in } Eq. \text{ ter} - 4q. \text{ in } E \text{ ter} - Ec.$$

Comparanda sunt ergo homogenea notata signo + cum iis quæ notan-

(1) Pour la note 6 de la page 133.

tur signo $-$, et iterare comparationem [adæqualitatem] (¹) oportet inter

$$\begin{aligned} B \text{ in } Eq. + B \text{ in } 4 \text{ in } E \text{ bis ex una parte,} \\ \text{et } 4 \text{ in } Eq. \text{ ter } + 4q. \text{ in } E \text{ ter } + Ec. \text{ ex altera.} \end{aligned}$$

Totum dividi lamus per E : comparatio [adæqualitas] erit inter

$$B \text{ in } E + B \text{ in } 4 \text{ bis} \quad \text{et} \quad 4 \text{ in } E \text{ ter } + 4q. \text{ ter } + Eq.$$

Hac divisione peracta, si omnia homogenea dividii possunt per E , iteranda erit divisio per E , donec reperiatur aliquod ex homogeneis quod hujusmodi divisionem non admiittat, id est, ut Vietaeis (²) verbis utar, quod non afficiatur ab E . Sed quia, in exemplo proposito, comprehendimus divisionem iterari non posse, hic standum est.

Deinde utrumque deleo homogenea quæ afficiuntur ab E : superest

$$\text{ex una parte } B \text{ in } 4 \text{ bis, et ex alia } 4q. \text{ ter,}$$

inter quæ non amplius facere oportet, ut antea, comparationes fictas

et adæqualitates, sed veram æquationem. Dividamus totum per A :

ergo

$$B \text{ bis erit } \text{æqualis } 4 \text{ ter,}$$

et

$$B \text{ erit ad } 4 \text{ ut } 3 \text{ ad } 2.$$

Redeainus ad nostram questionem et dividamus AC in puncto B ita ut

$$AC \text{ sit ad } AB \text{ ut } 3 \text{ ad } 2 :$$

dico solidum quadrati AB in BC esse maximum omnium quæ describi possunt in eadem linea AC , in qualibet alia sectione.

(¹) Le texte véritable est douteux : Fermat n'a dû écrire que l'un des deux mots, *comparationem* ou *adæqualitatem*, qu'il employait comme synonymes; l'autre serait une glose du copiste ou du possesseur de l'original. Même remarque pour *comparatio* et *adæqualitas*, quatre lignes plus bas.

(²) En réalité, Fermat étend singulièrement ici le sens donné au mot *affectio* par Viète (voir notamment *In Artem Analyticen Isagoge*, cap. III, 9, p. 3 de l'édition de Schooten). Viète en effet entend par là la présence, à la suite de la *potestas* (puissance de l'inconnue, sans coefficient), de termes de degré moins élevé. Ainsi, pour lui, x^n serait une *potestas pura* (si $n \geq 2$); tout polynôme entier en x (ayant l'unité pour coefficient du terme de degré le plus élevé) et s'annulant avec x , une *potestas affecta*.

Ut pateat hujus methodi certitudo, desumam exemplum e libro Apollonii *De determinata sectione*, qui, ut refert Pappus initio septimi libri, difficiles determinationes habebat⁽¹⁾; et eam quæ sequitur difficillimam esse existimo, quam ut inventam supponit Pappus septimo libro, nec enim illam veram esse demonstrat, sed, ut veram supponens, alias inde consequentias deducit. Hoe loco Pappus vocat minimum proportionem *μοναχής οὐκ ἔλεγον, minimum et singulare*, ideo scilicet quia, si proponatur questio circa magnitudines datas, duobus semper locis satisfit questioni, sed, in minimo aut maximo termino, unicus est qui satisfaciat locis: idcirco Pappus vocat *minimum et singulare*, id est unicam, proportionem omnium quæ proponi possunt minimum. Commandinus hoc loco dubitat quid per *μοναχές* intelligat Pappus, et veritatem quam modo explicui ignoravit⁽²⁾. Sed ecce propositionem:

Sit recta data OMID (fig. 95), et in ea quatuor puncta O, M, I, D data. Dividenda est portio MI in puncto N ita ut rectanguli OND sit ad rectangulum MNI proporcio minor quam proporcio ejuslibet rectanguli paris OND ad quodvis aliud par MNI.

Fig. 95.



Supponamus in notis lineam OM datam vocari *B*, lineam DM datam *Z*, et MI datam *G*; fingamus nunc MN, quod quærimus, vocari *A*: ergo rectangulum OND in notis erit

$$B \text{ in } Z - B \text{ in } t + Z \text{ in } t = tq.,$$

⁽¹⁾ Pappi s. éd. Commandin, fol. 159 recto, ligne 15; éd. Hultsch, page 644, ligne 3.

⁽²⁾ Pappi s. éd. Commandin (cf. éd. Hultsch, page 558, ligne 1), prop. 61:

Fol. 196 recto : « LEMM. XXI. Tribus datis rectis lineis AB BC CD, si fiat ut rectangulum ABD ad rectangulum ACD, ita quadratum ex BE ad quadratum ex EC, singularis proportio, et minima est rectanguli AED ad rectangulum BEC. »

Fol. 196 verso A : « COMMENTARIUS. *Greucus codex δι μοναχός λόγος οὐκ ἔλεγον, δι τοῦ ποδὸς καὶ προπόδου τῷ ποδὶ βεβηγεῖ, quibus verbis quid significetur, quidque per monachos, et epitagma in his terminatibus intelliget, satis percipi non potest, cum Apollonii libris carcamus, in quos ea conscripta sunt.* »

Les lettres A, B, E, C, D de Commandin correspondent respectivement aux lettres O, M, N, I, D de Fermat.

et rectangulum MNI

$$G \text{ in } A = 4q.$$

Oportet igitur proportionem

$$B \text{ in } Z = B \text{ in } A + Z \text{ in } A = 4q. \quad \text{ad} \quad G \text{ in } A = 4q.$$

esse minimam omnium quae fieri possunt qualibet alia divisione lineæ ML.

Sumanus iterum, loco A, A + E, et habebimus proportionem

$$\begin{aligned} B \text{ in } Z = B \text{ in } A + B \text{ in } E + Z \text{ in } A + Z \text{ in } E &= 4q. - Eq. - A \text{ in } E \text{ bis} \\ \text{ad} \quad G \text{ in } A + G \text{ in } E &= 4q. - Eq. - A \text{ in } E \text{ bis}, \end{aligned}$$

quam primæ comparare per adæqualitatem oportebit, id est : multiplicare primum terminum per quartum ex una parte, et secundum per tertium ex alia, et simul haec duo producta comparare.

Productum

$$B \text{ in } Z = B \text{ in } A + Z \text{ in } A = 4q., \quad \text{qui prior est terminus},$$

per

$$G \text{ in } A + G \text{ in } E = 4q. - Eq. - A \text{ in } E \text{ bis}, \quad \text{qui est ultimus terminus},$$

facit

$$\begin{aligned} B \text{ in } Z \text{ in } G \text{ in } A &= G \text{ in } B \text{ in } 4q. + G \text{ in } Z \text{ in } 4q. - G \text{ in } 4c. \\ &+ B \text{ in } Z \text{ in } G \text{ in } E = B \text{ in } A \text{ in } G \text{ in } E + Z \text{ in } A \text{ in } G \text{ in } E = 4q. \text{ in } G \text{ in } E \\ &- B \text{ in } Z \text{ in } 4q. + B \text{ in } 4c. - Z \text{ in } 4c. + Aqq. \\ &- B \text{ in } Z \text{ in } Eq. + B \text{ in } A \text{ in } Eq. - Z \text{ in } A \text{ in } Eq. + 4q. \text{ in } Eq. \\ &- B \text{ in } Z \text{ in } A \text{ in } E \text{ bis} + B \text{ in } Aq. \text{ in } E \text{ bis} - Z \text{ in } Aq. \text{ in } E \text{ bis} + 4c. \text{ in } E \text{ bis}. \end{aligned}$$

Productum autem

$$G \text{ in } A = 4q., \quad \text{secundi termini},$$

per

$$\begin{aligned} B \text{ in } Z = B \text{ in } A &+ B \text{ in } E + Z \text{ in } A + Z \text{ in } E = 4q. - Eq. - A \text{ in } E \text{ bis}, \\ &\quad \text{tertium terminum}, \end{aligned}$$

facit

$$\begin{aligned} & B \text{ in } Z \text{ in } G \text{ in } 4e + G \text{ in } B \text{ in } 4q, + G \text{ in } B \text{ in } 4e \text{ in } E + G \text{ in } Z \text{ in } 4q, \\ & + G \text{ in } Z \text{ in } 4e \text{ in } E - G \text{ in } 4e, - G \text{ in } 4e \text{ in } E q, - G \text{ in } 4q, \text{ in } E \text{ bis} \\ & B \text{ in } Z \text{ in } 4p, + B \text{ in } 4e, + B \text{ in } 4q, \text{ in } E - Z \text{ in } 4e, \\ & Z \text{ in } 4q, \text{ in } E + 4qq, + 4q, \text{ in } E q, + 4e, \text{ in } E \text{ bis}, \end{aligned}$$

Comparo haec duo producta per adæqualitatem; demamus quod ipsis communue est, et residuum dividamus per E : supererit,

$$\begin{aligned} & \text{ex una parte, } -B \text{ in } Z \text{ in } G - 4q, \text{ in } G - B \text{ in } Z \text{ in } E + B \text{ in } 4e \text{ in } E \\ & - Z \text{ in } 4e \text{ in } E - B \text{ in } Z \text{ in } 4e \text{ bis} - Z \text{ in } 4q, \text{ bis} + B \text{ in } 4q, \text{ bis}, \end{aligned}$$

et

$$\text{ex alia, } -G \text{ in } 4e \text{ in } E - G \text{ in } 4q, \text{ bis} + B \text{ in } 4q, -Z \text{ in } 4q,$$

Deleamus omnia homogena inter quae iterum reperitur E : supererit

$$\begin{aligned} & B \text{ in } Z \text{ in } G - 4q, \text{ in } G - B \text{ in } Z \text{ in } 4e \text{ bis} - Z \text{ in } 4q, \text{ bis} + B \text{ in } 4q, \text{ bis} \\ & \text{æquale } -G \text{ in } 4q, \text{ bis} + B \text{ in } 4q, -Z \text{ in } 4q., \end{aligned}$$

et, transponendo,

$$\begin{aligned} & -B \text{ in } 4q, + Z \text{ in } 4q, -G \text{ in } 4q, + B \text{ in } Z \text{ in } 4e \text{ bis} \\ & \text{erit æquale } -B \text{ in } Z \text{ in } G. \end{aligned}$$

Istius æquationis resolutione reperiemus valorem lineæ A , id est valorem MN , et consequenter punctum N , et inveniemus veritatem propositionis Pappi (⁴), qui docet, ad reperiendum punctum N , oportere facere

ut rectangulum OMD ad rectangulum OID ,

ita quadratum MN ad quadratum NI ;

æquationis enim resolutio nos ad eamdem constructionem dedit.


Ut tandem *tangentibus* applicetur haec methodus, sic procedere possum:

Sit, verbi gratia, *ellipsis* ZDN (fig. 96), ejus axis sit ZN et cen-

(4) Fair, dans la note 9 de la page 142, la traduction par Commandin du texte de Pappus et la correspondance indiquée pour les lettres.

trum R. Sumamus punctum, ut D, in ejus circumferentia, a quo duca-
mus lineam DM quae tangat ellipsin; ducamus præterea applicatam
DO et supponamus \angle in notis algebraicis OZ datam vocari *B*, et ON
datam vocari *G*; fingamus OM, quam quærimus incognitam, vocari *A*

Fig. 96.



(intelligimus autem per OM portionem axis contentam inter punc-
tum O et concursum tangentis).

Quoniam DM tangit ellipsin, si ducamus lineam IEV, parallelam DO,
per punctum V sumptum ad libitum inter O et N, certum est linea IEV
secari tangentem DM et ellipsin quoque, ut in punctis E et I; et, quia
linea DM tangit ellipsin, omnia puncta præter D erunt extra ellipsin :
ergo linea IV erit major linea EV. Erit igitur major proportio

quadrati DO ad quadratum EV quam quadrati DO ad quadratum IV;

sed

ut quadratum DO ad quadratum EV,

ita, proprietate ellipsis,

rectangulum ZON est ad rectangulum ZVN,

et

ut quadratum DO ad quadratum IV, ita quadratum OM ad quadratum VM :

major est igitur proportio

rectanguli ZON ad rectangulum ZVN

quam quadrati OM ad quadratum VM.

Fingamus \angle OV, sumptam ad libitum, æqualem *E*:

rectangulum ZON erit *B* in *G*;

rectangulum ZVN erit *B* in *G* + *B* in *E* + *G* in *E* = *Eq.*;

quadratum OM erit *Aq.*;

quadratum VM erit *Aq.* + *Eq.* - *A* in *E* bis.

Erit igitur major proportio

$$\begin{aligned} B \text{ in } G \text{ ad } B \text{ in } G - B \text{ in } E + G \text{ in } E &= Eq. \\ \text{quam } 4q. \text{ ad } 4q. + Eq. &= 4 \text{ in } E \text{ bis}, \end{aligned}$$

et consequenter, si multiplicetur prior terminus per ultimum et secundus per tertium,

$$B \text{ in } G \text{ in } 4q. + B \text{ in } G \text{ in } Eq. = B \text{ in } G \text{ in } 4 \text{ in } E \text{ bis},$$

productum scilicet prioris termini per ultimum, erit majus

$$B \text{ in } G \text{ in } 4q. - B \text{ in } E \text{ in } 4q. + G \text{ in } E \text{ in } 4q. = 4q. \text{ in } Eq.$$

Oportet igitur, juxta meam methodum, comparare haec duo producta per aequalitatem; demamus quod iis commune est et dividamus residuum per E : supererit,

$$\begin{aligned} \text{ex una parte, } & B \text{ in } G \text{ in } E - B \text{ in } G \text{ in } 4 \text{ bis}, \\ \text{et, ex alia, } & - B \text{ in } 4q. + G \text{ in } 4q. = 4q. \text{ in } E. \end{aligned}$$

Deleamus homogenea quae aliquid habent linea E : supererit,

$$\text{ex una parte, } - B \text{ in } G \text{ in } 4 \text{ bis}, \quad \text{et, ex alia, } - B \text{ in } 4q. + G \text{ in } 4q.$$

Quos duos terminos juxta methodum aequare oportet; et, transponendo terminos, ut par est, inveniemus

$$B \text{ in } A - G \text{ in } 4 = \text{æquale } B \text{ in } G \text{ bis}.$$

Vides hanc resolutionem eamdem esse cum Apolloniana (2) : nam, mea constructione, ad reperiendum tangentem, oportet facere

$$\begin{aligned} \text{ut } B - G \text{ ad } G, & \text{ ita } B \text{ bis ad } 4, \\ \text{id est } & \text{ut } ZO - ON \text{ ad } ON, \text{ ita } ZO \text{ bis ad } OM; \end{aligned}$$

sed, Apollonianâ, oportet facere

$$\text{ut } ZO \text{ ad } ON, \text{ ita } ZM \text{ ad } MN;$$

duæ autem illæ constructiones, ut palet, in idem recidunt.

(1) APOLLONIUS. *Coniques*, I, 34.

Plura possem alia exempla addere, tum primi, tum secundi casū meae methodi, sed hæc sufficiunt et eam esse generalem ac nunquam fallere satis probant. Demonstrationem regulæ non adjicio nec plorosque alias usus qui illius perfectionem confirmare possent, nec inventionem centrorum gravitatis, asymptotōn, quorum exemplum misi docissimo Domino de Roberval (¹).

tV.

METHODUS DE MAXIMA ET MINIMA (²).

Dum *syncretos* et *anastrophes* Vietææ (³) methodum expenderem, earumque usum in deprehendenda æquationum correlatarum constitutione accuratius explorarem, subiit animum nova ad inventionem maximæ et minimæ exinde derivanda methodus, cuius ope dubia quælibet ad διορισμόν pertinentia, quæ veteri et novæ molestiam exhibuere Geometriae, facillime profligantur.

Maximæ quippe et minimæ sunt unicæ et singulares, quod et Pappus (⁴) monuit et jam veteres norunt, licet Commandinus quid

(¹) Fermat semble ne faire allusion ici qu'à l'Écrit II qui précède. Cet Écrit fut effectivement envoyé à Roberval, par l'intermédiaire de Mersenne, en avril 1638; il n'y a au contraire, dans la correspondance connue de Fermat, aucun indice sur une application de sa méthode à la recherche des asymptotes.

(²) Cet important morceau a été conservé par une copie de Mersenne, aujourd'hui perdue elle-même, mais dont il subsiste deux transcriptions de la main d'Arbogast : l'une au net (Manuscrit du prince Boncompagni), l'autre en brouillon (Bibl. Nat., *Fonds français*, 3280, nouv. acq.), qui a servi à M. Ch. Henry pour le texte qu'il a donné : *Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat* (Rome, 1880), pages 180-183.

(³) VIETE, *De recognitione æquationum*, cap. 16, et *De emendatione æquationum*, cap. 3 (éd. Schooten, p. 104 et suiv., 134 et suiv.). La *syncretis* de Viète correspond à la recherche de la composition des coefficients d'une équation en fonction des racines de cette équation; l'*anastrophe* a pour objet l'abaissement du degré (impair) d'une équation, quand on connaît une racine de la transformée obtenue en changeant le signe de l'inconnue.

Dans tout ce fragment, au reste, Fermat emploie les expressions techniques de Viète et applique les procédés de ce dernier.

(⁴) Voir plus haut, page 142.

per γραφής intelligeret Pappus, ignorare se non diffitetur. Inde sequitur, ab utraque puncti determinationis constitutivi parte, posse sumi æquationem unam anticipitem et, ex duabus utrinque sumpfis, effici duas æquationes anticipites correlatas æquales et similes.

Proponatur in exemplum recta B ita secta ut rectangulum sub ipsius segmentis sit maximum (¹). Punctum proposito satisfaciens rectam datam bifariam secat, ut patet, et maximum rectangulum æquatur quadranti B quadrati; nec ex alia quavis rectæ illius sectione orietur rectangulum æquale quadranti B quadrati.

At, si recta eadem B proponatur secunda eà conditione ut rectangulum sub ejus segmentis sit æquale Z piano (quod supponendum minus quadrante B quadrati), tunc duo puncta proposito satisfacent, quæ quidem a puncto maximi rectanguli intercipliuntur.

Sit enim alieujus rectæ B segmentum A , fiet

$$B \text{ in } A = A \text{ quad.} \quad \text{æquale} \quad Z \text{ piano},$$

quæ æquatio est aneps et rectam A de duobus lateribus explicari posse indicat. Sit igitur æquatio correlata

$$\therefore B \text{ in } E = E \text{ quad.} \quad \text{æquale} \quad Z \text{ piano};$$

ex methodo Vietæa comparentur hæc due æquationes :

$$B \text{ in } A = B \text{ in } E \quad \text{æquabitur} \quad A \text{ quad.} = E \text{ quad.},$$

et, omnibus per $A = E$ divisis, fiet

$$B = \text{æqualis} \quad A + E,$$

ipsæque A et E erunt inæquales.

Si sumatur aliud planum, loco Z plani, quod sit majus quam Z planum, sed minus quadrante B quadrati, tunc rectæ A et E minus inter se different quam superiores, quum puncta divisionis magis accident ad punctum rectanguli maximi constitutivum, semperque, auctis divisionum rectangulis, ipsarum A et E differentia minuetur, donec per

(1) Voir plus haut la même question traitée, page 134.

ultimam maximi rectanguli divisionem evanescat, quo casu *quozzj*
vel minima contingat solutio, quum duæ aequales < fient > quantitates,
hoc est, A aequabitur E .

Quum igitor, in duabus superioribus aequationibus correlatis, per
methodum Vietæam, B aequabitur $A + E$, si E æquatur ipsi A (quod
contingere semper in puncto maxima vel minimæ constitutivo appa-
ret), ergo, in casu proposito,

$$B \text{ aequabitur } \text{I bis} :$$

hoc est, si recta B bifariam sectetur, rectangulum sub ipsius segmentis
erit maximum.

Esto aliud exemplum : *Recta B ita secunda est, ut solidum sub qua-
drato unius ex segmentis in alterum sit maximum* (¹).

Ponatur unum segmentum esse A ; ergo

$$B \text{ in } \text{I quad.} = \text{I cub. erit maximum.}$$

.Equatio correlata aequalis et similis est

$$B \text{ in } E \text{ quad.} = E \text{ cub.}$$

Comparentur juxta methodum Vietæ : ergo

$$B \text{ in } \text{I quad.} - B \text{ in } E \text{ quad.} \text{ aequabitur } \text{I cub.} - E \text{ cub.},$$

et, omnibus per $A - E$ divisis,

$$B \text{ in } \text{I} + B \text{ in } E \text{ aequabitur } A \text{ quad.} + A \text{ in } E + E \text{ quad.},$$

quea est constitutio aequationum correlatarum.

Ut queratur maxima, fiat E aequalis ipsi A : ergo

$$\overset{\text{ter.}}{B \text{ in } \text{I bis}} \text{ aequabitur } \text{I quad. ter.}$$

hoc est,

$$B \text{ bis} \text{ aequabitur } \text{I ter.}$$

Constat propositum.

Quia tamen operosa nimis et plerumque intricata est divisionum

(1) *Voir* plus haut la même question traitée, page 140.

illa per binomia practicee, convenientis visum est latera æquationum correlatarum inter se per ipsorum differentiam comparari ut, ea ratione, unicâ ad differentiam illam applicatione totum opus absolvatur.

Esto

$$Bq. \text{ in } A = 4c. \text{ aequandum maximo solido.}$$

Correlata, juxta superioris præcepta methodi, æquatio debuit sumi

$$Bq. \text{ in } E = Ec.$$

Sed, quoniam E (perinde atque A) est incerta quantitas, nihil vetat quominus vocetur $A + E$: erit igitur

$$Bq. \text{ in } A + Bq. \text{ in } E = 4c. - Ec. - 4q. \text{ in } E \text{ ter} - Eq. \text{ in } A \text{ ter},$$

ex una parte; ex altera

$$Bq. \text{ in } A = 4c.$$

Demptis æqualibus, patet æquationem integrum in homogenea ab E affecta iri devolutam, quia in utraque æquatione reperitur A : nempe

$$Bq. \text{ in } E \text{ aequabitur } Ec. + 4q. \text{ in } E \text{ ter} + Eq. \text{ in } A \text{ ter},$$

et, omnibus ipsis E applicatis,

$$Bq. \text{ aequabitur } Eq. + 4q. \text{ ter} + A \text{ in } E \text{ ter},$$

que est constitutio duarum hujusmodi æquationum correlatarum.

Ad inveniendam maximam, latera duarum æquationum inter se debent æquari, ut satisfiat methodi prædictæ præceptis, ex qua posterior haec et modum et rationem ipsam operandi desumpsit.

Equanda igitur sunt inter se A et $A + E$: ergo E dabit nihilum. Quin igitur $Bq.$, ex jam inventa æquationum correlatarum constitutione, aequetur

$$Eq. + 4q. \text{ ter} + A \text{ in } E \text{ ter},$$

ergo elidi debent homogenea omnia ab E affecta, utpote nihilum representantia: et manebit

$$Bq. \text{ aequale } 4q. \text{ ter},$$

que æquatio dabit maximum solidum quæsitum.

Ut autem plenius innotescat utriusque hujus nostræ methodi usum esse generalem, dispiciamus novas æquationum correlatarum species de quibus <tacet> Vieta, ex libro Apollonii *De determinata sectione* (propositione apud Pappum 61 Libri VII), cuius determinationes ipse Pappus innuit et profitetur difficiles (¹).

Sit recta BDEF (fig. 97), in quâ data puncta B, D, E, F. Intra puncta D et E sumendum punctum N, ut rectangulum BNF ad rectangulum DNE habeat minimam rationem.

Fig. 97.



Recta DE vocetur B , DF vocetur Z , BD vocetur D ; ponatur DN esse A : ergo

$$\text{ratio } D \text{ in } Z - D \text{ in } A + Z \text{ in } t - Aq. \text{ ad } B \text{ in } A - tq. \text{ est minima.}$$

Ratio correlata similis et æqualis esto

$$D \text{ in } Z - D \text{ in } E + Z \text{ in } E - Eq. \text{ ad } B \text{ in } E - Eq.,$$

juxta priorem methodum. Factum itaque sub mediis æquabitur facto sub extremis : hoc est, ex una parte,

$$\begin{aligned} D \text{ in } Z \text{ in } B \text{ in } E - D \text{ in } Z \text{ in } Eq. - D \text{ in } t \text{ in } B \text{ in } E + D \text{ in } t \text{ in } Eq. \\ + Z \text{ in } t \text{ in } B \text{ in } E - Z \text{ in } t \text{ in } Eq. - tq. \text{ in } B \text{ in } E + tq. \text{ in } Eq., \end{aligned}$$

ex altera parte,

$$\begin{aligned} D \text{ in } Z \text{ in } B \text{ in } t - D \text{ in } Z \text{ in } Eq. - D \text{ in } E \text{ in } B \text{ in } A + D \text{ in } E \text{ in } Eq. \\ + Z \text{ in } E \text{ in } B \text{ in } A - Z \text{ in } E \text{ in } Eq. - Eq. \text{ in } B \text{ in } t + Eq. \text{ in } Eq. \end{aligned}$$

Demptis communibus et facta congrua metathesi,

$$\begin{aligned} D \text{ in } Z \text{ in } B \text{ in } t - D \text{ in } Z \text{ in } E + D \text{ in } E \text{ in } Eq. - D \text{ in } t \text{ in } Eq. \\ - Z \text{ in } E \text{ in } Eq. + Z \text{ in } t \text{ in } Eq. + tq. \text{ in } B \text{ in } E - Eq. \text{ in } B \text{ in } t \\ \text{æquabitur } D \text{ in } Z \text{ in } Eq. - D \text{ in } Z \text{ in } Eq. \end{aligned}$$

(¹) Voir plus haut la même question traitée, page 142.

Singulis æquationis partibus per $A - E$ divisis (quod quidem, bina ex homogeneis correlata sigillatim inter se conferendo, facillimum : ut puta

$$D \text{ in } Z \text{ in } B \text{ in } A - D \text{ in } Z \text{ in } B \text{ in } E \text{ abs } A - E \text{ divisum} \quad \text{dat} \quad D \text{ in } Z \text{ in } B;$$

similiter

$$D \text{ in } E \text{ in } Aq. - D \text{ in } C \text{ in } Eq. \text{ abs } A - E \text{ divisum} \quad \text{dat} \quad D \text{ in } C \text{ in } E;$$

et sic de cæteris : homogenea enim inter se correlata satis facile disponuntur ad hujusmodi divisionem admittendam), fiet igitur, post divisionem,

$$\begin{aligned} D \text{ in } Z \text{ in } B + D \text{ in } C \text{ in } E - Z \text{ in } C \text{ in } E + B \text{ in } C \text{ in } E \\ \text{æquale} \quad D \text{ in } Z \text{ in } A + D \text{ in } Z \text{ in } E, \end{aligned}$$

que tandem æqualitas æquationum correlatarum constitutionem exhibet.

At, si ex hujusmodi constitutione quæratur minima, debet E , juxta methodum, aquari A : igitur

$$D \text{ in } Z \text{ in } B + D \text{ in } Aq. - Z \text{ in } Aq. + B \text{ in } Aq. \quad \text{æquabitur} \quad D \text{ in } Z \text{ in } A \text{ bis};$$

bujus æquationis resolutio dabit valorem A , ex quo minima ratio quæsita statim patebit.

Nec morabitur Analystam ultimæ istius æqualitatis ambiguitas : prodet quippe se, vel invito, latus utile. Imo et in æquationibus ambiguis quæ plura duobus habent latera, non deerit solitum ab utraque hac nostra methodo, sagaci tantisper Analystæ, præsidium.

Ex supradictæ questionis processu, patet priorem illam methodum intricatam nimis ut plurimum evadere, propter crebras illas divisionum per binomia iterationes. Recurrentum ergo ad posteriorem, quæ tamen, licet ex priori, ut jam dictum est, deducta, miram certe facilitatem et compendia innumera peritioribus abunde suppeditabit Analystis, imo et ad inventionem tangentium, centrorum gravitatis, asymptotōn, aliorumque id genus, longe expeditior alterā illā evadet et elegantior.

Confidenter itaque sicut olim, ita et nunc pronuntiamus semper et legitimam, non autem fortuitam (ut quibusdam visum) (¹), maximæ et minimæ disquisitionem hoc unico et generali confineri epitagmate :

Statuatur etc. (*voir* page 133, ligne 7, à page 134, ligne 6; *comparer* page 133, note 1) ... innotescet.

Si qui adhuc supersunt qui methodum hanc nostram debitam sorti pronuntiant,

Hos cupiam similes tentando excudere sortes (²).

Qui hanc methodum non probaverit, ei proponitur :

Datis tribus punctis, quartum reperire, a quo si ducantur tres rectæ ad data puncta, summa trium harum rectarum sit minima quantitas.

V.

AD METHODUM DE MAXIMA ET MINIMA APPENDIX (³).

Quia plerumque in progressu quæstionum occurruunt asymmetriæ, non dubitat Analysta triplicatas aut ulterioris etiam, si libeat, gradus positiones usurpare : earum quippe beneficio multiplices et intricati ut plurimum vitabuntur ascensus. Hujusce artificii methodus ita procedit ut exempla infra scripta declarabunt.

Sit semicirculus cuius diameter AB (fig. 98) et in eam perpendicularis DC. Quæritur maximum rectarum AC et CD aggregatum.

Diameter vocetur *B*; ponatur recta *AC* esse *A* : ergo

CD erit *latus* (*B* in *A* — *A* *quad.*).

(¹) Allusion à la lettre de Descartes à Mersenne pour Fermat, du 18 janvier 1638 : « Car premièrement la sienne [la règle de Fermat] est telle que, sans industrie et par hasard, on peut aisément tomber dans le chemin qu'il faut tenir pour la rencontrer. »

(²) Ce vers latin n'est tiré d'aucun classique; peut-être est-il de Fermat lui-même.

(³) Moreau inédit, publié sur la copie d'Arbogast, qui porte la mention « *d'après le manuscrit de Fermat* ».


Eo itaque deducitur quæstio ut

$$t + lat.(B \text{ in } t - t \text{ quad.})$$

sit maxima quantitas.

Quia, ex præceptis methodi, aequationes adæquandæ nūnū sunt

Fig. 98.



seansuræ, ponatur maxima illa quantitas esse O : Vieteām enim ignotarum quantitatū per vocales expressionem eur respuamus?

Ergo

$$t + lat.(B \text{ in } t - t \text{ quad.}) = \text{æquabitur } O,$$

ideoque

$$O - t = \text{æquabitur } lat.(B \text{ in } t - t \text{ quad.}),$$

et, omnibus in quadratum ducitis,

$$O \text{ quad.} + t \text{ quad.} - O \text{ in } t \text{ bis} = \text{æquabitur } B \text{ in } t - t \text{ quad.}$$

Hoc peracto, ita instituenda est transpositio ut maximus sub O gradus unam aequationis partem solus occupet, ut eā nempe ratione possit de maxima determinari, quo tendit artificium. Per translationem hujus modi,

$$B \text{ in } t - t \text{ quad. bis} + O \text{ in } t \text{ bis} = \text{æquabitur } O \text{ quad.}$$

Quum igitur, ex hypothesi, O sit maxima quantitas, ergo O quadratum erit quadratum maxime quantitatis, ideoque maximum: ergo

$$B \text{ in } t - t \text{ quad. bis} + O \text{ in } t \text{ bis} (\text{quæ omnia æquantur } O \text{ quadrato})$$

sunt maxima quantitas; quæ aequatio, quum vacet asymmetriæ, perinde ex methodo resolvatur ac si O quantitas esset nota. Ergo

$$\begin{aligned} & B \text{ in } t - t \text{ quad. bis} + O \text{ in } t \text{ bis} \\ \text{adæquabitur } & B \text{ in } t + B \text{ in } E - t \text{ quad. bis} - E \text{ quad. bis} \end{aligned}$$

$$- t \text{ in } E \text{ quater} + O \text{ in } t \text{ bis} + O \text{ in } E \text{ bis}.$$

Sublatis communibus, et reliquis ipsi E applicatis,

$$B + O \text{ bis} = \text{adæquabitur } E \text{ bis} + I \text{ quater.}$$

Expungatur E *bis* ex methodo : ergo

$$B + O \text{ bis} = \text{æquabitur } I \text{ quater},$$

ideoque

$$I \text{ quater} - B = \text{æquabitur } O \text{ bis},$$

et

$$A \text{ bis} - \text{dimid. } B = \text{æquabitur } O.$$

Hac æqualitate ex methodo stabilita, redendum ad priorem, in qua ponebamus

$$I + lat.(B \text{ in } I - I \text{ quad.}) = \text{æquari } O.$$

Quum igitur inventa sit

$$O = \text{æqualis } I \text{ bis} - \text{dimid. } B,$$

ergo

$$I \text{ bis} - \text{dimid. } B = \text{æquabitur } I + lat.(B \text{ in } I - I \text{ quad.}),$$

ideoque

$$I - \text{dimid. } B = \text{æquabitur } lat.(B \text{ in } I - I \text{ quad.}).$$

omnibusque in quadratum ducitis,

$$4 \text{ quad.} + B \text{ quad. } \frac{1}{4} = B \text{ in } I - \text{æquabitur } B \text{ in } I - I \text{ quad.},$$

et tandem

$$B \text{ in } A - I \text{ quad.} = \text{æquabitur } B \text{ quad. } \frac{1}{8};$$

que ultima æqualitas dabit valorem A in quæsita determinatione.

Hoc artificio uti possumus ad *inventionem coni maximi ambitus sphærae inscribendi* (¹).

Sit sphæra datae diameter AD (*fig. 99*). Conus quæsitus habeat altitudinem AC, latum AB, semidiametrum baseos BC. Rectangulum AB

(¹) Question proposée par Fermat à Mersenne dans sa lettre du 26 avril 1636.

in BC una cum BC quadrato continebit maximum spatium, ex Archimedē (¹).

Diameter vocetur B ; recta AC , A : ergo

$$AB \text{ erit latus } (B \text{ in } t) \quad \text{et} \quad BC \text{ erit latus } (B \text{ in } t - 1 \text{ quad.}).$$

Rectangulum AB in BC una cum BC quadrato erit


$$\text{latus}(B \text{ quad. in } 1 \text{ quad.} - B \text{ in } 1 \text{ cub.}) + B \text{ in } t - 1 \text{ quad.}$$

Hæc omnia æquantur maximo spatio : esto *O planō*. Ergo

$$O \text{ pl.} - 1 \text{ quad.} - B \text{ in } t \text{ æquabitur lateri } (B \text{ quad. in } 1 \text{ quad.} - B \text{ in } 1 \text{ cub.}).$$

Omnia ducentur quadratice, etc. ; tandem devenietur, ex superiori methodo, ad æquationem *O plani*, enjus beneficio prima æqualitas jam exposita resolvetur.

Fig. 90.



Non deerit tamen, hoc in exemplo, solutio ex methodo absque triplicata æqualitate : eo enim potest deduci quæstio ut, datâ rectâ AB in triangulo CBA , quæratur maxima proportio rectanguli CBA una cum CB quadrato ad quadratum AD , quo casu methodus vulgaris sufficit.

Recta AB data vocetur B ; ponatur CB esse A : ergo AC erit potentia B quad. — A quad. Sed

ut AC quadratum ad AB quadratum, ita AB quadratum ad AD quadratum;

ergo

$$AD \text{ quad.} \quad \text{erit} \quad \frac{B \text{ quad. quad.}}{B \text{ quad.} - 1 \text{ quad.}},$$

ad que rectangulum B in t + A quadrato debet habere maximum proportionem : hoc enim querimus.

(¹) ARCHIMEDE. *De sphæra et cylindro*, I, 15, donne la mesure de la surface latérale du cone.

Omnia ducantur in

$$B \text{ quad.} = A \text{ quad.};$$

ergo ratio

$B \text{ quad. quad. ad } B \text{ cub. in } 4 + B \text{ quad. in } 4 \text{ quad.} = B \text{ in } A \text{ cub.} = A \text{ quad. quad.}$
est minima. Sed $B \text{ quad. quad.}$ est quantitas data : rectae enim B datae potestas est : ergo

$$B \text{ cub. in } 4 + B \text{ quad. in } 4 \text{ quad.} = B \text{ in } 4 \text{ cub.} = A \text{ quad. quad.}$$

est maxima quantitas.

Ex methodo

$B \text{ cub.} + B \text{ quad. in } 4 \text{ bis} = \text{æquabitur} = B \text{ in } 4 \text{ quad. ter} + 4 \text{ cub. quater},$
quæ æquatio ad sequentem statim deprimitur

$$4 \text{ quad. quater} = B \text{ in } 4 = \text{æquate} = B \text{ quad.},$$

ideoque patebit solutio questionis.

Nec pluribus in re perspicua immoramus : constat nempe, per triplicatas aut quadruplicatas, imo et ulterius etiam, si libeat, promotas hypostases, evanescere omnino asymmetrias et si quæ alia remorantur Analystam impedimenta.

Elegantius tamen et fortasse magis γεωμετριζός quæstiones de maxima et minima speciales tangentium beneficio resolvuntur, licet et ipsæ tangentes ab universalis methodo deriventur.

Hujus rei unicum, quod multorum instar erit, proponatur exemplum :


In semicirculo FBD (fig. 100) ductâ perpendiculari BE, queritur maximum sub FE < in > EB rectangulum.

Si queratur rectangulum FEB æquale dato, ex nostra methodo, quærenda esset hyperbole sub angulo AFC eâ conditione ut rectangula similia FEB essent æqualia dato, punetaque intersectionum hyperboles et semicirculi quesitum adimplerent; sed, quoniam rectangulum FEB maximum querimus, quærenda hyperbole sub angulo AFC (asym-

ptotis AF, FC), quæ semicirculum non jam secet, sed tangat, ut in B: puneta enim contactus maximas et minimas determinant quantitates.

Sit factum. Quum igitur hyperbole in puncto B tangat semicirculum, ergo recta, in puncto B semicirculum tangens, tanget et hyperbolam.

Fig. 100.



Sit illa recta ABC. Quum in hyperbole per B transeunte dueta sit tangens eum asymptotis in punctis A et C concurrans, ergo, ex Apollonio⁽¹⁾, rectæ AB, BC sunt æquales, ideoque æquales rectæ FE, EC, et AF dupla BE sive AN. Est autem, propter circulum, BA æqualis AF: ergo BA est dupla AN et, in triangulo simili, posito centro M, semidiameter MB dupla ME. Datur autem semidiameter: ergo et punctum E.

Et generalis ad inventionem maximaæ et minimaæ geometrica est questionum ad tangentes abductio; nee ideo minoris facienda universalis methodus, qnum ejus ope et maxima et minima et ipsæ tangentes indigeant.

VI.

AD EAMDEM METHODUM⁽²⁾.

Doctrinam tangentium antecedit jamdudum tradita *Methodus de inventione maximaæ et minimaæ*, cuius beneficio terminantur quæstiones

⁽¹⁾ APOLLONIUS, *Coniques*, II, 3.

⁽²⁾ Cette pièce, imprimée dans les *Varia* (p. 69 à 73), est la seule pour laquelle il subsiste un original de Fermat (Bibl. Nat., *Fonds français*, n° 3280, nouv. acq., fol. 112 à 117), d'ailleurs sans titre.

omnes dioristicæ, et famosa illa problemata, quæ apud Pappum (¹), in præfatione Libri VII, difficiles determinationes habere dicuntur, facillime determinantur.

Lineæ curvæ, in quibus tangentes inquirimus, proprietates suas specificas vel per lineas tantum rectas absolvunt, vel per curvas rectis aut aliis curvis quomodo libet implicatas.

Priori casui jam satisfactum est præcepto quod, quia coneisum nimis, difficile sane, sed tamen <legitimum> (²) tandem reperatum est.

Consideramus nempe in plano cuiuslibet curvæ rectas duas positione datas, quarum altera diameter, si libeat, altera applicata nuncupetur. Deinde, jam inventam tangentem supponentes ad datum in curva punctum, proprietatem specificam curvæ, non in curva amplius, sed in invenienda tangente, per adæqualitatem consideramus et, elisis (quæ monet doctrina de maxima et minima) homogeneis, fit demum æqualitas quæ punctum concursus tangentis cum diametro determinat, ideoque ipsam tangentem.

Exemplis, quæ olim multiplicia dedimus, addatur, si placeat *tangens cissoidis* cuius Diocles (³) traditur inventor.

Esto circulus duabus diametris AG, BI (fig. 101) normaliter sectus, et sit crossois HIG in qua, sumpto quolibet puncto, ut H, ducenda est a puncto H tangent ad cissoidem.

Sit factum, et ducta tangens HF secet rectam CG in F. Ponatur recta DF esse A et, sumpto quolibet puncto inter D et F, ut E, ponatur recta DE esse E.

(¹) Voir plus haut, page 142, note 1.

(²) Le mot *legitimum* manque sur l'original de Fermat, ce qui prouve assez que cet original est lui-même défectueux. L'éditeur des *Varii* a restitué, pour l'adjectif manquant, *sufficiens*, expression qui n'est guère de la langue de Fermat et dont l'omission s'explique moins bien.

(³) La courbe connue sous le nom de *cissoidè* se trouve définie et donnée comme employée par Dioclès, dans le commentaire d'Eutocius sur la proposition d'Archimède, *De sphera et cylindro*, II, 2, éd. Torelli = II, 1, éd. Heiberg (Vol. III, p. 78 et suiv.). Le nom de *cissoidè* est emprunté à Proclus (*Commentaire sur le premier livre d'Euclide*), qui en parle comme d'une courbe fermée et présentant des points de rebroussement.

Quoniam igitur, ex proprietate specifica cissoidis, recta

MD sit ad DG int DG ad DH.

fiat jam in terminis analyticis per adæqualitatem

nt NE ad EG, ita EG ad portionem rectæ EN

que intercipitur inter punctum E et tangentem et est EO.

Voegelin

AD data, Z ; DG data, A ; DH data, R ;

DF quiesca, ut diximus, *A*; DE sumpta ad libitum, *E*:

112(1)


EG vocabular $V = E$:

EO vocabitur $\frac{R \ln 1 - R \ln E}{I}$;

EN vocabitur *latus* (Z in $N - Z$ in $E + N$ in $E - Eq.$).

Quoniam igitur, ex praecepto, proprietas specifica debet considerari,

Fig. 101.



non amplius in curva, sed in tangente, ideoque faciendum sit

ut NE ad EG, ita EG ad EO, que applicatur tangentie.

ergo, in terminis analyticis, faciendum

ut *latus* (Z in $V - Z$ in $E + N$ in $E - Eq.$) ad $V - E$.

$$\text{ita} = V - E - \text{ad} - R \ln \frac{1+R \ln E}{1-R \ln E},$$

et, quadratis singulis terminis ad vitandam asymmetriam, fiet

ut $Z \in N - Z \in E + N \in E = Eq$, ad $Nq, + Eq, - N \in E$ bis,
 ita $Vq, + Eq, - N \in E$ bis ad $\frac{Rq, \text{ in } tq, + Rq, \text{ in } Eq, - Rq, \text{ in } t \in E \text{ bis}}{tq}$.

Ducantur singula homogenea in A quadratum, et deinde quod tit
sub extremis adaequetur, ex preceptis artis, ei quod sit a medio. Elisis
deinde superfluis, ut monet methodus, tandem orietur aequalitas inter


Z in A ter + Vin t ex una parte, et Z in Vbis ex altera.

Construetur igitur tangens hoc pacto : Producatur semidiameter circuli dati CA ad punctum U, et fiat AU recta æqualis AC. Rectangulum ADG ad rectam UD applicetur et faciat latitudinem DF. Juncta FH tangent cisoïdem.

Indicemus etiam modum agendi in conchoide Nicomedea, sed indicemus tantum, ne prolixior evadat sermo.

Esto conchois Nicomedea, ut construitur apud Pappum et Entocium (⁴) figura sequens (fig. 102). Polus est punctum I, recta KG est

Fig. 102.



asymptos curva, recta HE perpendicularis ad asymptotum, punctum N datum in curva, ad quam ab eo puncto ducenda est tangens NBA, concurrens cum HE in puncto A.

Sit factum, ut supra. Ducatur NC parallela KG. Ex proprietate specifica curvæ, recta LN est æqualis rectæ HE. Sumatur quodlibet punc-

⁽¹⁾ PAPPUS (éd. Hultsch), livre III, pages 58 et suivantes, livre IV, pages 242 et suivantes; EUTOCIUS, Commentaire sur Archimède *De sph. et cyl.*, II (éd. Heiberg, vol. III, p. 117).

tum inter C et E, ut D, a quo rectæ CN parallela ducatur DB, occurrens tangenti in puncto B. Quia igitur proprietas specifica debet considerari in tangente, jungatur BI, occurrens rectæ KG in M et, ex præceptis artis, recta MB adæquetur rectæ HE : orietur tandem quæsita æqualitas.

Quod ut procedat,

CA, ut supra, vocetur *A*; recta CD vocetur *E*; recta EH data vocetur *Z*,

et reliquæ datae suis noninibus designentur.

Invenietur facillime recta MB in terminis analyticis, quæ si adæquetur, ut dictum, rectæ HE, solvetur quæstio.

Hæc de priore casu videntur sufficere. Licet enim praxes infinitæ suppetant, quæ prolixitates evitant, ex iis tamen nullo negotio deduci possunt.

Secundo casui, quem difficilem judicabat Dominus Descartes (¹), cui nihil difficile, elegantissimæ et non insubtili methodo fit satis.

Quamdiu rectis tantum lineis homogenea implicabuntur, querantur ipsa et designentur per præcedentem formulam. Imo et, vitandæ asymmetriæ causa, aliquando, si libuerit, applicatae ad tangentes ex superiori methodo inventas pro applicatis ad ipsas curvas sumantur; et demum (quod operæ pretium est) portiones tangentium jam inventarum pro portionibus curvæ ipsis subjacentis sumantur, et procedat adæqualitas ut supra monuimus : proposito nullo negotio satisfiet.

Exemplum in curva Domini de Roberval assignamus.


Sit curva HRIC (fig. 103), ejus vertex C, axis CF; et, descripto semicirculo COMF, sumatur punctum quodlibet in curva, ut R, a quo ducenda est tangens RB.

Ducatur a puncto R recta RMD, perpendicularis in CDF, quæ secet semicirculum in M. Ea igitur curvæ proprietas specifica est ut recta RD sit æqualis portioni circuli CM et applicatae DM. Dicatur in puncto M,

(¹) Comparer la lettre de Roberval à Fermat, du 4 août 1640, et celle de Descartes à Fermat (éd. Clerselier, III, 64), du 25 septembre 1638

ex praecedente methodo, tangens MA ad circulum : eadem nempe procederent si curva COM esset alterius naturæ.

Fig. 103.



Ponatur factum quod queritur, et sit :

recta DB quæsita æqualis $\frac{1}{t}$;

DA, inventa ex constructione, æqualis B;

MA, itidem inventa, vocetur D;

MD data vocetur R; RD data vocetur Z;

CM, portio circumferentiae data, vocetur N;

DE, recta nœcumque assumpta, vocetur E,

et a puncto E ducatur EOQN parallela rectæ RMD.

Fiat

$$\text{ut } A \text{ ad } A - E, \text{ ita } Z \text{ ad } \frac{Z \text{ in } \frac{1}{t} - Z \text{ in } E}{t},$$

quæ idcirco æquabitur rectæ NIUOE.

Igitur recta $\frac{Z \text{ in } \frac{1}{t} - Z \text{ in } E}{t}$ debet adæquari (propter proprietatem specificam curvæ quæ in tangentे consideranda est) rectæ OE una cum curva CO; curva autem CO æquatur curvæ CM minus curva MO : ergo recta $\frac{Z \text{ in } A - Z \text{ in } E}{t}$ debet adæquari rectæ OE et curvæ CM minus curva MO. Ut autem hi tres termini ad terminos analyticos reducantur, pro recta OE, ad vitandam asymmetriam ex superiori cautione, sumatur recta EU applicata tangentì, et pro curva MO sumatur portio tangentis MU, cui ipsa MO adjacet.

Ad inveniendam autem EU in terminis analyticis, fiet

$$\text{ut } B \text{ ad } B - E, \text{ ita } R \text{ ad } \frac{R \text{ in } B - R \text{ in } E}{B},$$

que idcirco aquabitur ipsi EU.

Ad inveniendam deinde MU, fiet

$$\text{ut } B \text{ ad } D, \text{ ita } E \text{ ad } \frac{D \text{ in } E}{B},$$

que idcirco, propter similitudinem triangulorum, ut supra, aquabitur ipsi MU.

Curva autem CM vocata est V; igitur in terminis analyticis fiet adæqualitas inter

$$\frac{Z \text{ in } U - Z \text{ in } E}{U} \text{ ex una parte,} \quad \text{et } \frac{R \text{ in } B - R \text{ in } E}{B} + V = \frac{D \text{ in } E}{B} \text{ ex altera.}$$

Ducantur omnia in $B \text{ in } U$, consistet adæqualitas inter

$$Z \text{ in } B \text{ in } U - Z \text{ in } B \text{ in } E \text{ et } R \text{ in } B \text{ in } U - R \text{ in } U \text{ in } E + B \text{ in } V \text{ in } U - D \text{ in } U \text{ in } E.$$

Quum autem, ex proprietate curvae,

$$Z = \text{æquetur } R + V,$$

ergo

$$Z \text{ in } B \text{ in } U \text{ ex una parte} = \text{æquatur } R \text{ in } B \text{ in } U + B \text{ in } V \text{ in } U \text{ ex altera;} \\$$

ideoque, ablatis communibus, reliqua comparentur.

$$Z \text{ in } B \text{ in } E \text{ nempe cum } R \text{ in } U \text{ in } E + D \text{ in } U \text{ in } E.$$

Fiat divisio per E ; et, quia nullum est hoc casu homogeneous superfluum, nulla fieri debet elisio. Aequetur igitur

$$Z \text{ in } B \text{ cum } R \text{ in } U + D \text{ in } U; \\ \text{fiet igitur} \quad \text{ut } R + D \text{ ad } B, \text{ ita } Z \text{ ad } U.$$

Constructio: Ad construendum igitur problema, si fiat

$$\text{ut aggregatum rectarum MA, MD ad rectam DA, ita RD ad DB.}$$

puncta BR tangent curvam CR.

Quia vero

ut summa rectarum MA, MD ad DA, ita MD ad DC.

ut facile est demonstrare, ideo faciendum erit


ut MD ad DC, ita RD ad BD,

sive, ut elegantior evadat constructio, juncta rectae MC ducenda erit parallela RB.

Eadem methodo species omnes illius curvæ tangentes suas nanciscentur : constructionem generalem olim dedimus (¹).

Quoniam vero quæsitum est *de tangente quadratarie sive quadratricis Dinostrati* (²), ita construimus ex præceptis præcedentibus.

Sit quadrans circuli AIB (fig. 104), quadrataria AMC in qua, ad datum punctum M, ducenda est tangens.



Juncta MI, centro I, intervallo IM, quadrans ZMD describatur et, ducata perpendiculari MN, fiat

ut MN ad IM, ita portio quadrantis MD ad rectam NO (³) ;

juncta MO tanget quadratariam. Hæc sufficiant.

(¹) En 1638 (voir plus haut la note 1 de la page 162). Cette construction générale, applicable aux cycloïdes allongées ou raccourcies, est perdue.

(²) PAPPUS (éd. Hultsch), livre IV, pages 250 et suivantes. Proclus (*Commentaire sur le premier livre d'Euclide*) attribue à Hippas l'invention de la quadratrice.

(³) L'original, comme les *Faria*, donne :


« ut IM ad MN, ita portio quadrantis MD ad rectam NO » ;

mais toute la ligne se trouve en surcharge d'une autre main, qui a corrigé le texte de Fermat, en sorte qu'on ne peut plus le discerner.

Quia tamen saepius curvatura mutatur, ut in conchoide Nicomedea, quæ pertinet ad priorem casum, et in omnibus speciebus curvæ Domini de Roberval (primâ exceptâ) quæ pertinet ad secundum, ut perfecte curva possit delineari, investiganda sunt ex arte puncta inflexionum, in quibus curvatura ex convexa fit concava vel contra : cui negotio eleganter inservit doctrina de maximis et minimis, hoc præmisso lemme generali :

Esto, in sequenti figura (fig. 105) (¹), curva AHFG, cujus curvatura in puncto H, verbi gratia, mutetur. Ducatur tangens HB, applicata HC. Angulus HBC erit minimus omnium quos tangentes cum axe ACD, sive infra, sive supra punctum H, efficiunt, ut facile est demonstrare.

Fig. 105.



Sumatur enim, supra H punctum, punctum M; tangens occurret axi inter A et B, ut in N : igitur angulus ad N major erit angulo ad B. Similiter, si infra punctum H sumatur punctum F, punctum D, in quo concurrit tangens FD cum axe, erit inferius puncto B, et tangens DF occurret tangenti BH ad partes F et H : igitur angulus ad D erit major angulo ad B.

Casus omnes non persequimur, sed modum tantum investigandi indicamus, quum curvarum formæ infinitas species exhibant.

Et igitur, verbi gratia, in exposito diagrammate, punctum H inve-

¹) La figure manque dans les *Varia*.

niatur, quæratur primum, ex superiore methodo, ad punctum quodlibet curvæ utenique sumptum, proprietas tangentis. Hæc inventa, quæratur, per doctrinam de maximis et minimis, punctum H a quo, ducendo perpendicularē HC et tangentem HB, recta HC ad CB habeat minimum proportionem : ea enim statione angulus ad B erit minimus. Dieo punctum H, ita inventum, esse initium mutationis in curvatura.

Ex predicta methodo de maximis et minimis derivantur artificio singulari inventiones centrorum gravitatis, ut alias indicavi Domino de Roberval (¹).

Sed et coronidis loco possunt etiam et, *datâ curvâ, inveniri ipsius asymptoti*, quæ in curvis infinitis miras exhibent proprietates. Sed haec, si libuerit, fusius aliquando explicabimus et demonstrabimus.

VII.

PROBLEMA MISSUM AD REVERENDUM PATREM MERSENNUM

10^a die Novembris 1642 (²).

Invenire cylindrum maximi ambitū in data sphera.

Detur sphæra ejus diameter AD (fig. 106), centrum C. Quæritur cylindrus maximi ambitū in ea inscribendus.

Sit factum, et cylindri quæsiti basis esto DE, latus EA (huius enim positioni aptari potest cylindrus, propter angulum in semicirculo rectum). Ambitus cylindri similis est quadrato DE et rectangulo DEA bis :

(1) Voir plus haut, page 136.

(2) Ce titre est tiré du manuscrit de la Bibliothèque Nationale, *Fonds latin*, 11197; il n'existe pas dans les manuscrits du prince Bonecompagni, où l'on trouve une ancienne copie du morceau, en dehors de celle d'Arbogast. Fermat avait proposé à Mersenne ce problème, dès le 20 avril 1636, en même temps que celui du cône inscrit de surface maximum (voir ci-dessus, p. 155). La solution, envoyée six ans après, est d'ailleurs purement synthétique.

Tout le morceau a été publié par M. Ch. Henry (*Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat*), pages 195-196, d'après la première source seulement.

Quærendum itaque maximum quadrati DE et rectanguli DEA bis aggregatum.

Quadratum DE æquatur rectangulo ADB (dmissâ perpendiculari EB), et rectangulum DEA æquatur rectangulo sub AD in BE. Quærimus igitur maximum rectanguli ADB et rectanguli sub AD in BE bis aggregatum et, omnibus ipsi AD rectæ datæ applicatis, queritur maximum rectarum DB et BE bis aggregatum.

Hoc autem est facile : fiat enim CB dimidia BE aut, quod idem est, sit BC quinta pars potentia quadrati CE dati, punctum E satisfaciet proposito.

Fig. 106.



Ducatur enim tangens EF cum diametro productæ in puncto F conveniens : Alio summan rectarum DB, BE bis esse maximum.

Quia enim CB sit dimidia BE, ergo BE erit dimidia BF; ergo BF erit aequalis dupla BE : tota igitur DF rectis DB et BE bis erit aequalis. Sed et patet aggregatum rectarum DB, BE bis esse maximum.

Sumatur enim quodvis punctum in semicirculo, $\angle \text{ut} > 1$, a quo demittatur perpendicularis IX.

A puncto autem I ducatur IG parallelâ tangentî, occurrens diametro in puncto G. Punctum G erit inter puncta F et D : alioqui parallela GI non occurret semicirculo.

Est

$$\text{ut } FB \text{ ad } BE, \quad \text{ita } GN \text{ ad } NI,$$

propter parallelismum; sed FB est dupla BE : ergo GN est dupla NI, ideoque GN est aequalis NI bis, et tota GD aggregato rectarum DN et NI bis. Quia igitur GD (enī æquatur aggregatum DN, NI bis) sit minor rectâ DF (enī æquatur rectarum DB, BE bis aggregatum), ergo rectarum DB, BE bis aggregatum est maximum, et cylindrus quæsus habet basim DE et latus EA.

Probabitur ex supra dictis rectam DE ad EA ita esse ut majus segmentum rectæ extremâ ac mediâ ratione sectæ ad minus.

Sed et cylindrum dati ambitus eadem viâ incenire et construere possumus.

Statim quippe deducetur questio ad querendam rectarum DN, NI bis sumnam æqualem datae rectæ. Sit recta data DG (quaæ quidem ex superiori determinatione non potest esse major rectæ DF). Fiat rectæ FE parallela recta GI : punctum I satisfaciët questioni et quandoque duos cylindros exhibebit, quandoque unicum, propositioni satisfacientes.

Quum enim punctum G erit inter F et A, duo cylindri præstabunt propositum; si vero punctum G sit in A aut ulterius, unicus tantum cylindrus præstabit questionem (¹).

(¹) Le manuscrit *Fonds latin* 11197, seul des trois sources, ajoute à cette solution les trois corollaires suivants, qu'on doit attribuer à Mersenne plutôt qu'à Fermat :

» COROLLARIUM PRIMUM. — *Tangens EF æqualis est diametro AD.*

» Quiaenam, in triangulo CEF rectangulo ad E, ex angulo E deducta est ad basim CF perpendicularis EB, erant similia triangula CEF, CEB et EFB; sed BC est dimidia ipsius BE ex constructione : ergo CE dimidia est ipsius EF. Est autem et CE dimidia diametri AD : ergo EF æqualis est ipsi AD.

» COROLLARIUM SECUNDUM. — Ex praecedente corollario deducitur elegans *constructio problematis* et multo facilior, que talis est.


» Sumatur in circumferentia circuli AED punctum quocumque E, ex quo deducatur recta EF tangens circulum, quaæ sit æqualis diametro circuli AED: et sic dabitur punctum F, ex quo per centrum C ducatur FCD secans circumferentiam in A et D punctis. Jungantur EA, ED: erit AE altitudo cylindri maximi quesiti et DE diameter basis ipsius cylindri.

» Demonstratio facilis est.

» COROLLARIUM TERTIUM. — Notatu dignum est DE esse ad EA in ratione majoris segmenti ad minus rectæ mediæ ac extremæ ratione divise.

» Fiat enim CN (fig. 107) æqualis CB: ergo ND æquabatur BA, et BN ipsi BE. Porro qua-

Fig. 107.




dratum ex DE æquale est rectangulo ADB sive duobus rectangulis : primo ADN (hoc est DAB), et rectangulo ex AD in NB (hoc est ex AD in BE); sed rectangulum DAB æquatur

VIII.

ANALYSIS AD REFRACTIONES ⁽¹⁾.

Esto circulus ACBI (*fig. 108*), ejus diameter AFDB separat duo media diversæ naturæ, quorum rarius sit ex parte ACB, densius ex parte AHB. Ponatur centrum circuli punctum D, in quod incidat radius CD a puncto C dato. Quaritur radius diaelasticus DI, hoc est punctum I ad quod vergit radius refractus.

Fig. 108.



Ducantur ad diametrum perpendiculares rectæ CF, HI. Quum datum sit punctum C et diameter AB, neenon et centrum D, datur pariter punctum F et recta FD.

Sit ratio mediorum, sive ratio resistentiae mediæ densioris ad resistentiam mediæ rarioris, ut recta data DF ad datam extrinsecus rectam *M*, quæ quidem minor erit rectâ DF, quum resistentia mediæ rarioris sit minor resistentiâ mediæ densioris, ex axiomate plus quam naturali.

Mensurandi igitur veniunt motus, qui fiunt per rectas CD et DI, bene-

quadrato ex AE; rectangulum vero ex AD in BE aequatur rectangulo AED. Hoc est rectangulo ex linea composita AED in AE; erit igitur

ut tota linea AED ad DE, ita DE ad AE :

ergo AED recta secta est in E in extrema ac media ratione, estque DE majus segmentum. AE vero minus. Quod erat probandum.

De hoc problemate vide Tractatum Domini de Roberval *De conis et cylindris sphera inscriptis et circumscriptis*: ibi enim verus est ejus locus. »

Le titre du Traité, auquel il est ainsi renvoyé, se retrouve dans une Lettre de Roberval à Hevelius, de 1656, qu'a publiée M. G. Henry (*Huyghens et Roberval*, Leyde, 1879, p. 38).

⁽¹⁾ Ce morceau, tiré de la Correspondance de Descartes, fut envoyé par Fermat à M. de La Chambre, en même temps que la Lettre du 1^{er} janvier 1662.

ficio rectarum M et DF : hoc est, motus, qui fit per duas rectas, repræsentatur comparative per summam duorum rectangulorum, quorum unum fit sub CD et recta M , et alterum sub DI et recta DF .

Eo itaque deducetur quæstio, ut ita secetur diameter AB in puncto H ut, ducta ab eo perpendiculari HI et juncta DI , summa duorum rectangulorum sub CD et M et sub DI et DF contineat minimum spatium.

Quod ut secundum nostram methodum, quæ jam apud Geometras invaluit et ab Herigono (¹) in *Cursu suo mathematico* ante annos plus minus viginti relata est, investigemus, radius CD datus vocetur N ; radius DI erit item N ; recta DF vocetur B et ponatur recta DH esse A . Oportet igitur N in $M + N$ in B esse minimum quantitatem (²).

Intelligatur quævis recta DO , ad libitum sumpta, esse æqualis ignotæ E , et jungantur rectæ CO , OI .

Quadratum rectæ CO , in terminis analyticis, erit

$$Nq. + Eq. - B \text{ in } E \text{ bis};$$

(¹) Dans le *Supplementum Cursus mathematici* de Pierre Hérigone (Paris, 1642: deuxième édition, 1644), qui forme le sixième Volume de l’Ouvrage, on trouve en effet, comme proposition XXVI et sous le titre *De maximis et minimis*, l’application de la méthode de Fermat à la solution des questions suivantes :

1. *Invenire maximum rectangulum contentum sub duobus segmentis propositæ rectæ lineæ* (voir plus haut, p. 134).

2. *Indagare maximum rectangulum comprehensum sub media et differentia extrema-rum triinn proportionalium.*

3. *Datum lineam secare in duo segmenta que habeant aggregatum suorum quadrato-rum omnium minimum.*

4. *Invenire maximum conorum rectorum sub æqualibus conicis superficiebus contentum.*

En outre de ces solutions, dans lesquelles Hérigone emploie d’ailleurs, comme dans tout son Ouvrage, son système particulier de notations algébriques, il donne, toujours d’après Fermat, la construction de la tangente en un point donné de la *parabole* (voir plus haut, p. 135), de l’*ellipse* (voir p. 145) et de l’*hyperbole*. Il ajoute enfin (p. 68) :

« Nec unquam fallit methodus, ut asserit ejus inventor, qui est doctissimus Fermat, consiliarius in parlamento Tolosano, excellens geometra nec ulli secundus in arte analytica : qui optime etiam restitut omnia loca plana Apollonii Pergei, que in hac urbe vidi-mus manu scripta in manibus plurimorum, quibus subnexa est etiam ab eodem auctore *Ad locos planos et solidos Iagoge.* »

Ce passage d’Hérigone a été reproduit par Samuel Fermat dans l’édition des *Faria* (à la dernière des pages non numérotées du commencement); mais, dans sa préface, il lui assigne à tort la date de 1634, qui est celle du premier Volume du *Cursus mathematicus*.

(²) Dans tout ce morceau, on a rétabli la notation de Viète au lieu de celle de Descartes suivie par Clerselier.

quadratum vero recte OI erit

$$\sqrt{q_1 + E q_2} + \sqrt{1} \text{ in } E \text{ bis :}$$

ergo rectangulum sub CO in M erit in iisdem terminis

$$\text{latus qual.} (\sqrt{M q_1} \text{ in } N q_2 + \sqrt{M q_1} \text{ in } E q_2 - \sqrt{M q_1} \text{ in } B \text{ in } E \text{ bis});$$

rectangulum vero sub IO in B erit

$$\text{latus qual.} (\sqrt{B q_1} \text{ in } N q_2 + \sqrt{B q_1} \text{ in } E q_2 + \sqrt{B q_1} \text{ in } \sqrt{1} \text{ in } E \text{ bis}).$$

Hæc duo rectangula debent, ex præceptis artis, adæquari duobus rectangulis M in N et B in N.

Ducantur omnia quadratice, ut tollatur asymmetria; deinde, ablatis communibus et termino asymmetro ex una parte collocato, fiat novus ductus quadraticus. Quo peracto, demptis communibus et reliquis per E divisis, ac tandem elisis homogeneis ab E affectis, juxta præcepta methodi quæ dudum omnibus innotuit, et facto parabolismo, fit tandem simplicissima æquatio inter A et M: hoc est, a primo ad ultimum abruptis omnibus asymmetriarum obicibus, recta DH in figura fit aequalis rectæ M.

Unde patet punctum diaelasticum ita inveniri si, duetis rectis CD et CF, fiat ut resistentia mediæ densioris ad resistentiam mediæ rarioris, sive

$$\text{ut } B \text{ ad } M, \text{ ita recta FD ad rectam DH},$$

et a puncto H excitetur recta HI ad diametrum perpendicularis et circulo occurrentis in puncto I, quo refractio verget: ideoque radius a medio raro ad densum pertingens frangetur versus perpendicularem, quod congruit omnino et generaliter invento theoremati Cartesiano, cuius accuratissimam demonstrationem a principio nostro derivatam exhibet superior analysis.

IX.

<SYNTHESIS AD REFRACTIONES>⁽¹⁾.

Proposuit doctissimus Cartesius refractionum rationem experientiae, ut aiunt, consentaneam; sed, eam ut demonstraret, postulavit et necesse omnino fuit ipsi concedi, luminis motum facilius et expeditius fieri per media densa quam per rara, quod lumini ipsi naturali adversari videtur.

Nos itaque, dum a contrario axiomate — motum nempe luminis facilius et expeditius per media rara quam per densa procedere — veram refractionum rationem deducere tentamus, in ipsam tamen Cartesii proportionem incidimus. An autem contrarià omnino viā eidem veritati occurri possit *ἀπαράλογότως*, videant et inquirant subtiliores et severiores Geometræ; nos enim, missâ matæotechniâ, satius existimamus veritate ipsa indubitanter potiri, quam superfluis et frustatorii contentionibus et jurgiis diutius inhaerere.

Demonstratio nostra unico nititur postulato : *naturam operari per modos et rias faciliores et expeditiores*. Ita enim *ῳτηγε* concipiendum censemus, non, ut plerique, *naturam per lineas brevissimas semper operari*.


Ut enim Galilæus⁽²⁾, dum motum naturalem gravium speenlatur, rationem ipsius non tam spatio quam tempore metitur, pari ratione non brevissima spatia aut lineas, sed quæ expeditius, commodius et breviori tempore perecurri possint, consideramus.

(1) Ce second morceau sur la loi de la réfraction, confondu avec le précédent dans la Correspondance de Descartes, en est évidemment distinct : c'est le travail que Fermat promet à M. de la Chambre à la fin de sa lettre du 1^{er} janvier 1662, si celui-ci le lui réclame, et c'est également à cette pièce que se réfère particulièrement Clerselier, dans sa lettre à Fermat du 20 mai 1662. D'après la copie de Clerselier, l'envoi à M. de la Chambre aurait eu lieu en février 1662.

(2) *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla Meccanica ed i movimenti locali*, del Sig^r Galileo Galilei (Leyde, Elzévirs, 1638). — Les nouvelles pensées de Galilée, etc., traduit de l'italien en français (Paris, Pierre Rocolet ou Henry Guenon, 1639).

Hoc supposito, supponantur duo media diversæ naturæ in prima figura (fig. 109), in qua circulus AHB^M, ejus diameter ANB separat illa duo media, quorum unum a parte M est rarius, alterum a parte H est densius; et a puncto M versus H inflectantur quælibet rectæ MNH, MRH occurrentes diametro in punctis N et R.

Fig. 109.



Quum velocitas mobilis per MN, quæ est in medio raro, sit major, ex axiomate aut postulato, velocitate ejusdem mobilis per NH, et motus supponantur uniformes in quolibet videlicet medio, ratio temporis motus per MN ad tempus motus per NH componitur, ut notum est omnibus, ex ratione MN ad NH et ex reciproca ratione velocitatis per NH ad velocitatem per MN.

Si fiat igitur

ut velocitas per MN ad velocitatem per NH, ita recta MN ad NH,
tempus motus per MN ad tempus motus per NH erit ut TN ad NH.

Pari ratione demonstrabitur, si fiat

ut velocitas per medium rarius ad velocitatem per medium densius,
ita MR ad RP,

tempus motus per MR ad tempus motus per RH esse ut PR ad RH.

Unde sequitur

tempus motus per duas MN, NH esse ad tempus motus per duas MR, RH
ut summa durarum TN, NH ad summa durarum PR, RH.

Quum igitur natura lumen a puncto M versus punctum H dirigat, debet investigari punctum, ut N, per quod *per inflexionem aut refractionem*

tionem brevissimo tempore a puncto M ad punctum H perveniat : probabile namque est naturam, quæ operationes suas quam citoissime urget, eo sponte collimaturam. Si itaque summa rectarum IN, NH, quæ est mensura motus per inflexam MNH, sit minima quantitas, constabit propositum.

Hoc autem ex theoremate Cartesiano deduci vera, non fucata, Geometria statim demonstrabit; proposuit quippe Cartesius :

Si a puncto M ducatur radius MN, et ab eodem puncto M demittatur perpendicularis MD, fiat autem

ut velocitas major ad minorem. ita DN ad NS,

a puncto autem S excitetur perpendicularis SH et jungatur radius NH, lumen a medio raro in punctum N incidens refringi in medio denso versus perpendicularem ad punctum H.

Huic vero theoremati Geometria nostra, ut constabit ex sequenti propositione pure geometrica, non refragatur.

Esto circulus AHB, ejus diameter ANB, centrum N, in ejus circumferentia sumpto quovis puncto M, jungatur radius MN et demittatur in diametrum perpendicularis MD. Detur pariter ratio DN ad NS et sit DN major ipsâ NS. A puncto S excitetur ad diametrum perpendicularis SH occurrens circumferentiae in puncto H, a quo jungatur centro N radius NH. Fiat

ut DN ad NS, ita radius MN ad rectam NI :

Aio summam rectarum IN, NH esse minimam : hoc est, si sumatur, exempli gratia, quodlibet punctum R ex parte semidiametri NB, et jungantur rectae MR, RH, fiat autem

ut DN ad NS, ita MR ad RP,

summam rectarum PR et RH esse majorem summam rectarum IN et NH.

Quod ut demonstremus, fiat

ut radius MN ad rectam DN, ita recta RN ad rectam NO,

et

ut DN ad NS, ita fiat NO ad NV.

Ex constructione patet rectam NO minorem esse rectam NR, quia recta DN est minor radio MN; patet etiam rectam NV minorem esse rectam NO, quum recta NS sit minor rectam ND.

His positis, quadratum rectae MR aquatur quadrato radii MN, quadrato rectae NR et rectangulo sub DN in NR bis, ex Euclide; sed, quum sit, ex constructione,

ut MN ad DN, ita NR ad NO,

ergo rectangulum sub MN in NO aequatur rectangulo sub DN in NR, ideoque rectangulum sub MN in NO bis aequatur rectangulo sub DN in NR bis : quadratum igitur rectae MR aquatur quadratis MN et NR et rectangulo sub MN in NO bis.

Quadratum autem rectae NR est majus quadrato rectae NO, quum recta NR sit major rectam NO : ergo quadratum rectae MR est majus quadratis rectarum MN, NO et rectangulo sub MN in NO bis. At haec duo quadrata, MN, NO, cum rectangulo sub MN in NO bis, sunt aequalia quadrato quod fit ab MN, NO tanquam ab una recta : ergo recta MR est major summa duarum rectarum MN et NO.

Quum autem, ex constructione, sit

ut BN ad NS, ita MN ad NI et ita NO ad NV,

ergo erit

ut DN ad NS,

ita summa rectarum MN, NO ad summam rectarum IN, NV.

Est autem etiam

ut DN ad NS, ita MR ad RP :

ergo

ut summa rectarum MN, NO ad summam rectarum IN, NV,

ita recta MR ad RP.

Est autem recta MR major summa rectarum MN, NO : ergo et recta PR est major summa rectarum IN, NV.

Superest probandum rectam RH esse majorem rectā HV; quo peracto, constabit summam rectarum PR, RH esse majorem summā rectarum IN, NH.

In triangulo NHR, quadratum RH aequatur quadratis HN, NR muletatis rectangulo sub SN in NR bis, ex Euclide. Qnum autem sit, ex constructione,

$$\begin{aligned} \text{ut } MN \text{ radius (sive NH ipsi aequatis) ad } DN, & \quad \text{ita NR ad NO,} \\ \text{ut autem } DN \text{ ad NS,} & \quad \text{ita NO ad NV,} \end{aligned}$$

ergo, ex aequo, erit

$$\text{ut } HN \text{ ad NS, ita } NR \text{ ad NV.}$$

Rectangulum ergo sub HN in NV aequale est rectangulo sub NS in NR, ideoque rectangulum sub HN in NV bis aequatur rectangulo sub SN in NR bis : quare quadratum HR aequatur quadratis HN, NR muletatis rectangulo $\langle \text{sub} \rangle HN \langle \text{in} \rangle NV$ bis.

Quadratum vero NR probatum est majus esse quadrato NV : ergo quadratum HR majus est quadratis HN, NV muletatis rectangulo $\langle \text{sub} \rangle HN \langle \text{in} \rangle NV$ bis. Sed quadrata HN, NV muletata rectangulo $\langle \text{sub} \rangle HN \langle \text{in} \rangle NV$ bis aequalia sunt, ex Euclide, quadrato rectae HV : ergo quadratum HR quadrato HV majus est, ideoque recta HR major rectā HV. Quod secundo loco fuit probandum.

Quod si punctum R sumatur ex parte semidiametri AN, licet rectae MR, RH sint in directum et rectam lineam constituant, ut in secunda figura (*fig. 110*), — demonstratio enim est generalis in quolibet casu — idem contingit : hoc est, rectarum PR, RH summa erit major summā rectarum IN, NH.

Fiat, ut supra,

$$\text{ut } MN \text{ radius ad } DN, \quad \text{ita } RN \text{ ad NO,}$$


et

$$\text{ut } DN \text{ ad NS,} \quad \text{ita } NO \text{ ad NV :}$$

patet rectam RN esse majorem rectā NO, rectam vero NO esse majorem rectā NV.

Quadratum MR aequatur quadratis MN, NR multatis rectangulo DNR bis sive, ex superiori ratiocinio, rectangulo MNO bis. Quum autem quadratum NR sit majus quadrato NO, ergo quadratum MR erit majus quadratis MN, NO multatis rectangulo MNO bis; sed quadrata MN, NO, multata rectangulo MNO bis, aequantur quadrato

Fig. 110.



rectæ MO : ergo quadratum rectæ MR quadrato rectæ MO majus erit, ideoque recta MR erit etiam major rectæ MO.

Quum autem sit, ex constructione,

ut DN ad NS, ita MN ad IN et ita NO ad NV.

ergo

ut MN ad IN, erit NO ad NV,

et, vicissim,

ut MN ad NO, ita erit NI ad NV,

et, dividendo,

ut MO ad ON, ita IV ad VN,

et, vicissim,

ut MO ad IV, ita ON ad NV, sive DN ad NS, sive MR ad RP.

Probatum est autem MR ipsa MO esse majorem : ergo PR recta IV major erit. Superest ergo probandum, ut ex omni parte constet propositum, rectam RH esse majorem summa duarum rectarum HN et NV; quod ex predictis est facilimum.

Quadratum enim RH aequatur quadratis HN, NR una cum rectangulo sub SN in NR bis sive, ex prædemonstratis, una cum rectangulo sub HN in NV bis; quadratum autem NR est majus quadrato NV : ergo

quadratum HR majus est quadratis HN, NV una cum rectangulo sub HN in NV bis. Unde sequitur rectam RH, ex superius demonstratis, esse majorem summā rectarum HN, NV.

Patet itaque rectas PR, RH (sive unicam rectam PRH quando id contingit) esse semper majores duabus rectis IN, NH. Quod erat demonstrandum.



NOVUS SECUNDARUM
ET
ULTERIORIS ORDINIS RADICUM
IN ANALYTICIS USUS.

Reductio secundarum et ulterioris ordinis radicum ad primas, quæ maximi est in Algebraicis momenti, unicam pro fundamento agnoscit duplicatae aequalitatis analogiam, eamque, quoties opus fuerit, iterandum progressus ipse quæsitionis ostendit.

Proponatur

$$A \text{ cubus} + E \text{ cubo} = \text{æquari} = Z \text{ solido};$$

item

$$B \text{ in } A + E \text{ quad.} + D \text{ in } E = \text{æquari} = N \text{ quad.}$$

Ut secunda radix devolvatur ad primam, hæc sunt preecepta :

Quaecumque a secunda radice adficiuntur homogenea in unam æquationis partem transeunto : ut, in superiori exemplo, quum

$$Ac. + Ec. = \text{æquetur} = Zs.,$$

ergo

$$Zs. - Ac. = \text{æquabitur} = Ec.$$

Similiter, quum

$$B \text{ in } A + Eq. + D \text{ in } E = \text{æquetur} = Nq..$$

ergo

$$Nq. - B \text{ in } A = \text{æquabitur} = Eq. + D \text{ in } E.$$

In utraque igitur æquatione homogenea abs E (sive abs secunda radice) affecta unam æquationis partem constituunt; si igitur duplicata

eiusmodi æqualitas ad analogiam revocetur, erit

$$\text{ut } Zs. - Ac. \text{ ad } Ec., \text{ ita } Nq. - B \text{ in } A \text{ ad } Eq. + D \text{ in } E.$$

Quum itaque factum sub extremis comparabitur facto sub mediis, tanquam ipsi æquale, omnia homogena divisionem admittent per E (sive per secundam radicem); ut patet, quia secundus et quartus terminus abs E adficiuntur.

Erit nempe

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } Eq. - Ac. \text{ in } Eq. + Zs. \text{ in } D \text{ in } E - Ac. \text{ in } D \text{ in } E \\ \text{æquale } Nq. \text{ in } Ec. - B \text{ in } A \text{ in } Ec. \end{aligned}$$

Omnia dividantur toties per E, donec aliquod ex homogeneis affectione sub E omnino liberetur: erit

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } E - Ac. \text{ in } E + Zs. \text{ in } D - Ac. \text{ in } D \\ \text{æquale } Nq. \text{ in } Eq. - B \text{ in } A \text{ in } Eq. \end{aligned}$$

Quo peracto, nova hæc æquatio uno ad minus gradu depressior erit (quoad secundam radicem) quam elatior ex duabus primum propositis: patet nempe elatiorem ex duabus primum propositis adfici sub cubo E, istius vero nullam abs E affectionem excedere Eq.

Nec tamen sic quiescendum, sed iteranda duplicateæ æqualitatis analogia, donec affectio secundæ radicis fiat tantum sub latere, ut asymmetria omnis evanescat.

Preparetur itaque ultima hæc æquatio juxta modum præscriptum, ut homogena sub E quomodocumque affecta unam æquationis partem faciant. Erit itaque

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } D - Ac. \text{ in } D - \text{æquale} \\ Nq. \text{ in } Eq. - B \text{ in } A \text{ in } Eq. - Zs. \text{ in } E + Ac. \text{ in } E. \end{aligned}$$

Sed, ex duabus primum propositis, quæ depressior est, exhibet æquationem sequentem, ut diximus:

$$Nq. - B \text{ in } A - \text{æquale } Eq. + D \text{ in } E.$$

Revocetur rursum ad analogiam duplicata ista æqualitas : erit itaque

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } D - Ac. \text{ in } D &= ad. Nq. \text{ in } Eq. - B \text{ in } A \text{ in } Eq. - Zs. \text{ in } E + Ac. \text{ in } E \\ &\quad \text{ut } Nq. - B \text{ in } A = ad. Eq. + D \text{ in } E. \end{aligned}$$

Quum itaque factum sub extremis æquabitur facto sub mediis, tanquam ipsi æquale, omnia homogena poterunt dividi per E, ut supra demonstratum est : erit nempe

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } D \text{ in } Eq. + Zs. \text{ in } Dq. \text{ in } E - Ac. \text{ in } D \text{ in } Eq. - Ac. \text{ in } Dq. \text{ in } E \\ \text{æquale } Nqq. \text{ in } Eq. - Nq. \text{ in } B \text{ in } A \text{ in } Eq. - Nq. \text{ in } Zs. \text{ in } E \\ + Nq. \text{ in } Ac. \text{ in } E - B \text{ in } A \text{ in } Nq. \text{ in } Eq. \\ - Bq. \text{ in } Aq. \text{ in } Eq. + B \text{ in } Zs. \text{ in } A \text{ in } E - B \text{ in } Aqq. \text{ in } E, \end{aligned}$$

et, omnibus abs E divisis, fiet tandem

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } D \text{ in } E + Zs. \text{ in } Dq. - Ac. \text{ in } D \text{ in } E - Ac. \text{ in } Dq. \\ \text{æquale } Nqq. \text{ in } E - Nq. \text{ in } B \text{ in } A \text{ in } E - Nq. \text{ in } Zs. + Nq. \text{ in } Ac. \\ - B \text{ in } A \text{ in } Nq. \text{ in } E + Bq. \text{ in } Aq. \text{ in } E + B \text{ in } Zs. \text{ in } A - B \text{ in } Aqq. \text{ in } E. \end{aligned}$$

Quo peracto, nova hæc æquatio unius adhuc gradus depressionem (quoad secundam radicem) lucrata est, ut hic patet : quum enim homogena sub E affecta in unam æquationis partem transierint, fiet

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } Dq. - Ac. \text{ in } Dq. + Nq. \text{ in } Zs. - Nq. \text{ in } Ac. - B \text{ in } Zs. \text{ in } A + B \text{ in } Aqq. \\ \text{æquale } Nqq. \text{ in } E - Nq. \text{ in } B \text{ in } A \text{ in } E - B \text{ in } A \text{ in } Nq. \text{ in } E \\ + Bq. \text{ in } Aq. \text{ in } E - Zs. \text{ in } D \text{ in } E + Ac. \text{ in } D \text{ in } E. \end{aligned}$$

Neque ulterius progrediendum, quum jam secunda radix sub latere tantum appareat, ideoque, solo applicationis beneficio, ipsius E relatio ad primam radicem manifestabitur : ut hic

$$\begin{aligned} Zs. \text{ in } Dq. - Ac. \text{ in } Dq. + Nq. \text{ in } Zs. - Nq. \text{ in } Ac. - B \text{ in } Zs. \text{ in } A + B \text{ in } Aqq. \\ \underline{Nqq. - Nq. \text{ in } B \text{ in } A - Nq. \text{ in } B \text{ in } A + Bq. \text{ in } Aq. - Zs. \text{ in } D + Ac. \text{ in } D} \\ \text{æquabitur } E, \end{aligned}$$

quo tendendum erat.

Ut igitur duæ primum propositæ radices in unam transeant, resu-

matur ex duabus prioribus aequationibus quam volueris; depressior tamen idonea magis, ne altius ascendat aequatio.

Quum itaque in una ex aequationibus primum propositis

$$B \text{ in } A + E q. + D \text{ in } E \quad \text{æquetur} \quad N q.,$$

loco ipsius E subrogetur iam agnitus ejus valor per relationem vel ad terminos cognitos vel ad priorem radicem, quae in exemplo proposito est A: et rursum sub hac nova specie ordinetur aequatio. Manifestum est evanuisse omnino secundam radicem et in aequationem ab omni asymmetria liberam itum esse, methodumque esse generalem.

Si enim plures duobus terminis proponantur incogniti, methodus iterata tertias, si opus fuerit, radices ad primas et secundas, deinde secundas ad primas, etc., eodem prorsus artificio reducat.

APPENDIX AD SUPERIOREM METHODUM (').

Superiori methodo debetur perfecta et absoluta asymmetriarum in Algebraicis expurgatio; neque enim symmetrica climactismus Vietœa (²), que unicum haec tenus ad asymmetrias fuit remedium, efficax satis et sufficiens inventa est.

Proponatur quippe

$$\begin{aligned} & \text{lat. cub.}(B \text{ in } A q. - A c.) + \text{lat. quad.}(A q. + Z \text{ in } A) \\ & + \text{lat. quad. quad.}(D c. \text{ in } A - A q q.) + \text{lat. quad.}(G \text{ in } A - A q.) \\ & \quad \text{æquari rectæ } N. \end{aligned}$$

Qua ratione ab asymmetris hujusmodi extrieabit se et questionem suam analysta Vietœus? An non potius, dum creset labor, creset dif-

(¹) Voir la lettre de Fermat à Carcavi, du 20 août 1650, lettre qui accompagnait l'envoi de tout le Traité. Voir également le billet de Fermat dans la lettre de Descartes (éd. Clercier, III, 83) du 18 décembre 1648, billet qui semble aussi avoir été adressé primitivement à Carcavi.

(²) VIETE. *De emendatione aequationum*, cap. V (éd. Schooten, p. 140).

ficultas, et tandem, fatigatus et delusus, novum ab Analytice lumen exposet?

Hoc sane luculenter superior methodus subministrat : unicum exemplum, idque brevissimum, adjungimus; recluso enim semel fundamento, cætera apertissime manifestantur.

Proponatur

$$\text{lat. cub.}(\text{Z in } \Lambda q. - \Lambda c.) + \text{lat. cub.}(\Lambda c. + \text{Bq. in } \Lambda) = \text{æquari} = \text{D}.$$

Ita primi ordinetur æquatio ut unica ex asymmetriis unam illius partem faciat : fiat nempe

$$\text{D} = \text{lat. cub.}(\Lambda c. + \text{Bq. in } \Lambda) = \text{æqualis} = \text{lat. cub.}(\text{Z in } \Lambda q. - \Lambda c.).$$

Hoc peracto, omnes termini asymmetri a secundis et ulterioribus, si opus fuerit, radicibus denominentur, excepto eo quem unicum in unam æquationis partem rejecimus : fingatur, verbi gratia,

$$\text{lat. cub.}(\Lambda c. + \text{Bq. in } \Lambda) \text{ esse E.}$$

Hac enim via ad eam, quam injungit superior methodus, duplicitæ æqualitatis analogiam deveniemus : erit nempe

$$\text{D} = \text{E} = \text{æqualis} = \text{lat. cub.}(\text{Z in } \Lambda q. - \Lambda c.),$$

et, omnibus in cubum ductis,

$$\text{Dc.} + \text{D in } \text{Eq. ter} = \text{Dq. in } \text{E ter} = \text{Ec.} = \text{æquabitur} = \text{Z in } \Lambda q. - \Lambda c.$$

Sed, ex hypothesi,

$$\text{Ec.} = \text{æquatur} = \text{Ac.} + \text{Bq. in } \Lambda.$$

Ergo oritur duplicita æqualitas et in utraque, juxta methodum, termini abs secunda radice affecti in unam æquationis partem sunt conjectandi : erit nempe

$$\text{Z in } \Lambda q. - \Lambda c. = \text{Dc.} = \text{æqualis} = \text{D in } \text{Eq. ter} = \text{Dq. in } \text{E ter} = \text{Ec.};$$

item

$$\text{Ac.} + \text{Bq. in } \Lambda = \text{æqualis} = \text{Ec.}$$

Iteretur toties operatio donec secunda radix ad primam revocetur :

quo peracto, loco ipsius E, novus ipsius valor usurpetur et sub hac nova specie quævis ex prioribus æqualitatibus ordinetur : omnia constabunt.

Nec innilia adjingo, aut moror in superfluis : quis enim non videt singulos terminos asymmetros posse eadem ratione, si non sufficient secundæ radiees, tertii, quartis, etc. in infinitum insigniri? Quo casu, quartam, sive ultimam, radicem tanquam secundam considerabis : reliquas vero tantisper vel pro primis vel pro terminis cognitis habebis, donec ultima illa omnino evanuerit sive ad primas, secundas et tertias reducta fuerit. Simili prorsus artificio tertias reduces ad secundas et primas, ac denique secundas ad primas, ut jam saepius inculcavimus.

Nulla est ergo asymmetria quam non cogat exsulare haec methodus, cuius usus præsertim eximius, imo et necessarius, in numerosa potestatum resolutione. Statim enim nempe atque asymmetriæ evanuerint, non deerit Vietæum (¹) in arithmeticis quæstionibus artificium et, si veris explicari numeris quæstio non possit, proximæ quantumvis libuerit suppetent solutiones, quum tamen proximas veris solutiones nullo pacto, quamdiu duraverint asymmetriæ, consequi possis.

Sed et ulterius inquirenti obtulit se mira ad locorum superficialium plenam et perfectam notitiam exinde derivanda methodus, quæ et iis problematis inservit, in quibus dantur ab initio plura quam requirat ipsa problematis construendi determinatio.

Quod ut clarius intelligas, sunt quedam problemata quæ unicam tantum agnoscunt positionem ignotam, quæ vocari possunt determinata, ad differentiam inter ipsa et problemata localia constituendam. Sunt alia quedam quæ duas positiones ignotas habent et ad unicam tantum nunquam possunt reduci : ea problemata sunt localia.

In prioribus illis unicum tantum punctum inquirimus, in istis lineam; sed, si problema propositum tres ignotas positiones admittat,

(¹) Fermat fait allusion au Traité *De numerosa potestatum purarum atque affectarum ad e regresin resolutione* de VIÈTE (éd. Schooten, p. 162-228).

problema hujusmodi non jam punctum duntaxat, aut lineam tantum, sed integrum superficiem quæstioni idoneam investigat : indeque oriuntur loci ad superficiem, etc. in reliquis. Sicut autem in prioribus data ipsa sufficiunt ad determinationem quæstionis, ita in secundis unum datum deest ad determinationem, in tertii vero duo tantum data determinationem possunt completere.

At contra potest fieri ut, quemadmodum in his casibus data aut sufficient aut desint, ita in plerisque aliis data ipsa superflua sint et abundant : exemplo res fiet evidens.

In recta AC (*fig. 94*) data, datur rectangulum ABC; datur etiam differentia quadratorum AB et BC.

Fig. 94.



In hoc casu plura patet offerri data quam determinatio ideoque solutione ipsius quæstionis exposeat. Frequentissimus tamen horum problematum, in Physicis præsertim et apud artifices, est usus, eaque omnia per applicationem simplicem beneficio nostræ methodi expediuntur, neque recurrendum ad extractionem radicum, licet æquationes ad quasvis potestates descendant.

Proponatur, verbi gratia, in quadam quæstione,

$$\Lambda \text{ cub.} + B \text{ quad. in } A = \text{equari} = Z \text{ quad. in } D;$$

item etiam, quum ex hypothesi quæstio supponatur esse abundans (has enim quæstiones *abundantes*, sicut locales *deficientes*, appellare consuevimus),

$$G \text{ sol. in } A = V \text{ quad. quad.} = \text{equari} = B \text{ quad. in } N \text{ pl.}$$

Duplicata haec æqualitas ad analogiam revocetur et, ex præscripta methodo, consideretur unica nostra radix ignota, quæ in hoc exemplo est Λ , sicut in præcedentibus secundam aut ulterioris ordinis radicem consideravimus, et toties, juxta methodum, iteretur operatio donec affectio sub Λ per simplicem applicationem possit expediri, sive non

tam ad primas radices quam ad terminos omnino notos reduci. Patebit solutio problematis simplicissima, nec analystam deinceps aequationes quadraticæ, cubicae, quadratoquadraticæ, etc. remorabuntur.

LUBET et, coronidis loco, famosi illius problematis :

Datis ellipsi et puncto extra ipsius planum, superficiem conicam, cuius vertex sit punctum datum et basis ellipsis data, ita plano secare ut sectio sit circulus,

solutionem, quæ huic methodo debetur, indicare, eamque simplicissimam.

Eo deducunt quæstionem Geometræ ut, sumptis quinque punctis ad libitum in ellipsi et junctis rectis a vertice conicæ superficie ad puncta illa, per junctas quinque rectas circulum describant; inveniuntque problema hoc paeto esse solidum. Sed, quum puncta in ellipsi sint infinita, si loco quinque punctorum sumantur sex, fiet problema abundans et orientur necessario duplicata æqualitas, quæ tandem ignorat quantitatem per simplicem applicationem patefaciet.

Eadem ratione, si detur quæcumque linea curva in plano aut etiam superficies localis, cujuscumque tandem gradus sint, invenientur diametri et axes figurarum; imo et in superficie locali exhibebuntur omnes omnino curvæ loci superficialis constitutivæ, etc.

Exponatur, verbi gratia, superficies conica, cuius vertex sit punctum datum, basis vero parabole aut ellipsis cubica aut quadratoquadraticæ aut ulterioris in infinitum gradus. Potest hujusmodi superficies conica, beneficio istius methodi, ita secari ut in ea exhibeatur quælibet curva quæ, ex constitutione figuræ, in ea superficie potest describi, et problematis solutio semper evadet simplicissima.

Nihil addimus de tangentibus curvarum (¹) et plerisque aliis hujus methodi usibus : fient quippe obvii nec sedulam indagatoris analytici meditationem effingent.

(¹) Voir plus haut, page 153.

— — — — —

⟨ AD ADRIANI ROMANI PROBLEMA ⟩⁽¹⁾.

— — — — —

VIRO CLARISSIMO CHRISTIANO HUGGENIO P. F. S. T. (2).

— — — — —

Dum Francisci Vietae⁽³⁾ celebre illud *Ad problema Adriani Romani responsum* accuratius anno superiore examinarem, et in verba capitum sexti incidisset quibus profitetur subtilis ille mathematiens haud scire se « an ipsemet » Adrianus « ejus quam proposuit aequationis genesim et symptomata pernoverit », subvenire cepit an ipsemet quoque Vieta aequationis illius famosae satis generalem tradiderit aut invenerit solutionem.

Proponentis quippe Adriani Romani verba haec sunt, emendante Vieta⁽⁴⁾:

Detur in numeris algebraicis

$$\begin{aligned}
 & 45 \textcircled{1} - 3795 \textcircled{3} + 95634 \textcircled{5} - 1138500 \textcircled{7} \\
 & + 7814375 \textcircled{9} - 34512075 \textcircled{11} + 105306075 \textcircled{13} - 232676280 \textcircled{15} \\
 & + 384942375 \textcircled{17} - 488494125 \textcircled{19} + 483841800 \textcircled{21} - 378658800 \textcircled{23} \\
 & + 236036652 \textcircled{25} - 117679100 \textcircled{27} + 46955700 \textcircled{29} - 14945040 \textcircled{31} \\
 & + 3764565 \textcircled{33} - 740259 \textcircled{35} + 111150 \textcircled{37} - 12300 \textcircled{39} \\
 & + 945 \textcircled{41} - 45 \textcircled{43} + 1 \textcircled{45} \text{ aequalis numero dato:}
 \end{aligned}$$

quaritur valor radicis.

(1) Ce morceau, qui, comme le précédent, concerne les travaux de Fermat sur Viète, a été publié par M. Ch. Henry (*Recherches, etc.*, p. 211-213) d'après le manuscrit Huygens 30 de l'Université de Leyde.

(2) *Lisez*: Petrus Fermatius, senator Tolosanus.

(3) VIÉTE, édition Schooten ou des Elzévirs, pages 305-324.

(4) De fait, Fermat ne cite exactement ici ni l'énoncé d'Adrien Romain, dont il a toutefois conservé les notations, ni la formule adoptée par Viète, page 308.

Sane perquam eleganter et doctissime, suo more, questionem propositam abduxit Vieta ad sectiones angulares et tabulam feliciter construxit, pag. 318 editionis Elzevirianæ (¹), ad quotlibet in infinitum terminos, methodo qua usus est, facile extendendam, ejus beneficio dignoscitur quænam æquationes ad speciales angularum sectiones pertineant.

Si enim, in sedibus numerorum imparium, sumatur primo

$$1C - 3N \quad \text{æqualis} \quad \text{numero dato}$$

qui non sit major binario, reducitur quæstio ad trisectionem anguli. Si deinde

$$1QC - 5C + 5N \quad \text{æquetur} \quad \text{numero dato}$$

qui non sit etiam binario major, reducitur quæstio ad quintusectionem anguli. Si

$$1QQC - 7QC + 14C - 7N \quad \text{æquetur} \quad \text{numero dato}$$

qui non sit item binario major, reducitur quæstio ad septusectionem; et si tabulam in infinitum extendas, juxta methodum a Vieta præscriptam, terminus æquationis ab Adriano propositæ erit quadragesimus quintus tabulæ, et quætionem ad inveniendam quadragesimam quintam anguli dati partem deducet.

Verum observandum est in his omnibus æquationibus contingere, ut iis solum ipsarum casibus inserviant sectiones angulares et methodus Vietæ, in quibus numerus datns, cui proponitur æquandus quilibet in numeris algebraicis tabulæ terminus, binarium non excedit, ut jam diximus: si enim numerus datus sit binario major, silet statim omne quætionum angularium mysterium et ad quætionis propositæ solutionem inefficax dignoscitur.

Proposuerat tamen generaliter Adrianus *dato termino posteriore, inve-*

(¹) Théorème V du Traité de VIETE : la Table, poussée seulement jusqu'au neuvième terme, et qui se trouve à la page 319, donne en fait le développement de $2\cos nx$ suivant les puissances de $2\sin x$, si n est pair, ou de $2\cos x$, si n est impair. Le premier membre de l'équation d'Adrien Romain est précisément le développement de $2\cos 45x$ suivant les puissances de $2\cos x$.

niendum esse priorem : aliunde igitur quam a Vieta et a sectionibus angularibus petendum auxilium.

Proponatur, in primo easu, $1C - 3N$ æquari numero qui non sit binario major, reducitur quæstio ad trisectionem, ut jam indicavimus. Sed, si $1C - 3N$ æquetur 4 vel alteri euilibet numero binario majori, tunc æquationis propositæ solutionem per methodum Cardani analystæ expedient. An autem, in ulterioribus in infinitum casibus, solutiones per radicum extractionem fieri possint, nondum ab analytis tentatum fuit; quidni igitur in hac parte Algebraam liceat promovere, tuis præcipue, Huggeni Clarissime, auspiciis, quem in his scientiis adeo conspicuum eruditum omnes merito venerantur (¹)?

Proponatur itaque

$$1QC - 5C + 5N \quad \text{æquari} \quad \text{numero } 4$$

vel alteri euilibet binario majori. Obmutescet in hoc easu methodus Vietæ; hoc itaque, ut generaliter Adriano proponenti satisfiat, confidenter pronuntiamus : in omnibus omnino tabule prædictæ casibus, quoties numerus datus est binario major, solutiones propositæ quætionis per extractionem radicum commodissime dari posse.

Observavimus quippe, imo et demonstravimus, in omnibus illis easibus, quæstiones posse deduci, sicut in cubicis ad quadraticas a radice cubica, ex methodo Cardani et Vietæ (²), sic in quadratothicis ad quadraticas a radice quadratothicæ, in quadratoquadratothicis ad quadraticas a radice quadratoquadratothicæ, et ita uniformi in infinitum progressu.

Sit

$$1C - 3N \text{ æqualis } 4,$$

(¹) Lors de l'envoi par Fermat de ce travail (en 1661?), Huygens était déjà célèbre, non seulement pour ses découvertes astronomiques et son application du pendule aux horloges, mais pour ses travaux de Mathématique pure, quoiqu'on n'eût imprimé de lui que les *Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli* (1651) et le Traité *De ratiociniis in ludo aleæ* (1657).

(²) On sait qu'en fait la méthode de Viète (*De emendatione æquationum*, cap. VI) n'est pas précisément identique à celle de Cardan ou plutôt de Ferrari (*Hieronymi Cardani Ars magna sive de regulis algebraicis*, 1545).

verbi gratia. Norunt omnes radicem quæsitam, ex methodo prædicta, æquari

$$\text{radici cubicæ binomii } z + \sqrt[3]{3} + \text{ radice cubica apotomes } z - \sqrt[3]{3}.$$

Sed proponatur, in exemplo Vietæ et Adriani,

$$+QC - 5C + 5N \quad \text{æquari} = 4,$$

vel alteri cilibet numero binario majori.

Fingemus, perpetuâ et ad omnes tabulæ easus produceendâ in infinitum methodo, radicem quæsitam esse $\frac{1Q+1}{1N}$, cuius beneficio resolvendo hypostases, evanescunt semper homogenea simplici per extractionem radicum quætionis resolutioni contraria; et, in hoc easu ad exemplum præcedentis, radix proposita æquabitur

$$\begin{aligned} &\text{radici quadratocubicæ binomii } z + \sqrt[3]{3} \\ &+ \text{ radice quadratocubica apotomes } z - \sqrt[3]{3}. \end{aligned}$$

Si

$$+QQC - 7QC + 14C - 7N,$$

qui est numerus tabulæ septimus apud Vietam (ad exponentem namque maximæ potestatis, qui est in hoc easu 7, respicimus), æquetur similiter numero 4, fingatur, ut supra, radix quæsita esse $\frac{1Q+1}{1N}$: evanescunt pariter in hoc easu homogenea omnia solutioni per extractiones radicum adversa, et radix quæsita æquabitur

$$\begin{aligned} &\text{radici quadratoquadratocubicæ binomii } z + \sqrt[3]{3} \\ &+ \text{ radice quadratoquadratocubica apotomes } z - \sqrt[3]{3}; \end{aligned}$$

et sic in infinitum.

Quod tu, Vir Eruditissime, non solum experiendo deprehendes, sed et demonstrando, quandocumque libuerit, assequeris: ea enim est æquationum ex tabula Vietæ derivandarum specifica proprietas, ut semper ipsarum solutiones, in iis easibus in quibus homogeneum

comparationis est binario majus, simplices omnino extractionis radicum beneficio evadant.

Vel igitur numerus datus, termino tabulae analyticæ aequandus, est binarius vel minor binario vel eodem binario major.

Primo casu semper radix proposita est ipse binarius.

Secundo devolvitur quæstio proposita secundum Vietam ad angulares sectiones.

Tertio per nostram methodum jam expositam, hoc est per extractionem radicum, facile expeditur.

Sit itaque numerus ille analyticus Adriani superius expositus

$$45 \textcircled{1} - 3795 \textcircled{3} \text{ etc.} \quad \text{æqualis} \quad \text{numero } 6,$$

radix quæsita erit

$$\begin{aligned} \text{radix quadragesimæ quintæ potestatis binomii } &= 2 + \sqrt[3]{3} \\ + \text{ radice quadragesimæ quintæ potestatis apotomes } &2 - \sqrt[3]{3}. \end{aligned}$$

Nec amplius in re perspicua et jam satis exemplificata immorandum, nisi quod monendum superest : extractionem radicis quadragesimæ quintæ potestatis, sive inventionem quadraginta quatuor mediarum proportionalium inter duas quantitates datas, expediri facillime per extractionem radicis cubicæ bis factam et extractionem radicis quadratocubicæ semel : quod numeri 5 et 9, qui numerum 45 metiuntur, satis indicant : 5 enim ad radicem quadratocubicam refertur et 9 ad radicem cubicam bis sumptam : ternarius enim, qui est cubi exponens, bis ducens novenarium producit.

Ideoque, per inventionem duarum mediarum proportionalium inter duas bis factam et inventionem quatuor mediarum inter duas semel, inveniuntur quadraginta quatuor mediae et quæstioni nostræ satisfit, quemadmodum Vieta inventionem sectionis anguli in 45 partes, quæ est quæstio vel æquatio Adriani, ad æquationem cubicam bis factam et ad quadratocubicam semel, sive ad dupliem trisectionem et ad unicam quintusectionem, abduxit.

Nihil de multiplicibus aequationis vel quæstionis propositæ solutio-
nibus adjungimus; primogenitam tantum repræsentamus, de reliquis,
quarum operosior est disquisitio, alias fortasse, si otium suppetat,
fusius acturi.

Vale, Vir Clarissime, et me ama.

AD BON. CAVALIERII QUESTIONES RESPONSA.⁽¹⁾

Dudum est ex quo, ad similitudinem *paraboles Archimedea*, *reliquas in infinitum quadravimus in quibus abscissæ a diametro sunt inter se ut quævis applicatarum potestates*. Hanc scientiam, primis jam olim a nobis adinventam, Dominio de Beaugrand aliisque communicavimus; fatendum tamen Dominum de Roberval, qui nobis indicantibus hujusmodi quæstiones est aggressus, earum solutiones suopte ingenio, quod perspicax et in his scientiis felicissimum habet, reperiisse.

Sed et pariter quoque centra gravitatum in his figuris et ab ipsis compositis deteximus, idque methodo nobis peculiaris⁽²⁾, ejus etiam beneficio tangentes in lineis quibuscumque curvis, ipsarumque

(1) Inédit, d'après deux copies, sans titre (l'une ancienne, l'autre d'Arbogast), dans les manuscrits du prince Boncompagni. — Ce morceau, adressé à Cavalieri par l'intermédiaire de Mersenne avant 1644, résume les premiers travaux de Fermat sur les quadratures et cubatures, travaux dont il n'a d'ailleurs développé plus tard qu'une partie dans son dernier Traité : *De aequationum localium transmutatione, etc.*

Mersenne a reproduit presque textuellement la plus grande partie de ce morceau dans la *Prefatio ad Mechanica*, IV, de ses *Cogitationes Physicomathematica*, où, venant de parler des quadratures obtenues par Roberval, qu'il appelle *noster Geometra*, il s'exprime ainsi sur les travaux de Fermat :

« Generalem etiam regulam vir alius summus invenit quā praedicta solvit, non solum quando partes diametri cum applicatarum potestatibus conferuntur, sed etiam cùm quilibet partium diametri potestates cum quibuslibet potestatibus applicatarum comparantur : que quia satis commodè figurā precedentī possunt eo modo intelligi quo ipse voluit, me requirente. Bonaventura Cavallero Geometrae subtilissimo innotescere, iisdem Lector noster perfruatur. »

Il termine comme suit la reproduction du texte de Fermat (d'ailleurs sur la même figure) :

« Si vero figura circumvolvatur circa EF, solidum queratur, non simplex, uti superiora, sed compositum, ejus rationem ad cylindrum ambiens, et centrum gravitatis vir idem summus, et noster Geometra dudum eruere : a quibus tam omnium curvarum tangentes, quām areas, solidū, et centra gravitatis omnium figurarum curvis, et rectis comprehensarum, posses accipere. »

(2) *Voir* plus haut, page 136.

asymptos, imo et quacumque ad inventionem maxima et minima pertinent problemata, feliciter construximus.

Sed ad rem : querit eruditissimus Bonaventura Cavalieri *quid de predictis quadrationibus sit definiendum*. Hunc operi regulam generalem aptavimus, cuius ope non tantum quando partes diametri cum potestatis applicatarum conferuntur, solutionem damus, sed et quum quilibet partium diametri potestates cum quibuslibet applicatarum potestatis comparantur : ita enim generaliter pronuntiamus.


Sit figura quaevis parabolica, si placet, EAF (*fig. 111*), sitque, exempli causa,

$$\begin{aligned} &\text{ut cubus CA ad cubum BA,} \\ &\text{ita quadratoquadratum EC ad quadratoquadratum DB.} \end{aligned}$$

Sumo exponentes potestatum tam in applicatis quam in diametro. Exponens quadratoquadrati est 4 in applicatis, exponens cubi in diametro est 3.

Aio igitur parallelogrammum EH esse ad figuram EAF ut summa

Fig. 111.



exponentium ambarum potestatum ad exponentem potestatis applicatarum. Erit igitur in hoc exemplo

parallelogrammum ambiens ad figuram EAF ut 7 ad 4.

Hinc patet, si sit, verbi gratia,

$$\begin{aligned} &\text{ut quadratoquadratum EC ad quadratoquadratum DB,} \\ &\text{ita CA simpliciter ad AB,} \end{aligned}$$

quum exponens lateris sit unitas, ideo

parallelogrammum ad figuram hoc casu esse ut 5 ad 4.

Nec est dissimilis in omnibus omnino hujusmodi figuris in infinitum progressus.

Verum igitur est quod dubitanter proponebat Vir doctissimus, nempe quum potestates applicatarum cum longitudine tantum portionum diametri, sive, ut loquuntur analystæ, cum latere conferuntur :

parallelogrammum esse	$\left\{ \begin{array}{l} \text{trianguli duplum,} \\ \text{ad parabolam ut } 3 \text{ ad } 2, \\ \text{ad parabolam cubicam ut } 4 \text{ ad } 3, \\ \text{ad quadratoquadraticam ut } 5 \text{ ad } 4, \\ \text{etc., in infinitum.} \end{array} \right.$
-----------------------	---

Sed si, manente recta CA, figura circumducatur ut fiat solidum, inventur proportio cylindri EH ad hujusmodi solidum, hoc pacto :

Summa dupli exponentis potestatis in diametro et exponentis potestatis in applicatis semel sumpti, ad exponentem potestatis in applicatis est ut cylindrus ad solidum.

Exemplum : esto

ut cubus EC ad cubum DB, ita quadratum CA ad quadratum BA.

Exponens quadrati in diametro est 2, cuius duplum 4; junctum 3, exponenti potestatis in applicatis semel sumpto, facit 7 : est igitur

ut 7 ad 3 (exponentem potestatis in applicatis), ita cylindrus ad solidum.

Quo posito, secundæ quæstiōni fit satis.

Centra gravitatum, in omnibus hujusmodi figuris, tam planis quam solidis, secant diametros in proportione vel parallelogrammi ad figuram planam, vel cylindri ad solidum.

Sed, si figura circumvolvatur circa EF, fit jam solidum non simplex, ut superiora, sed compositum. Ejus tamen proportio ad cylindrum ambientem facillime ex simplicibus accuratus Geometra derivabit, imo et ipsam centri gravitatis positionem. Quæ tamen omnia, si placet Domino Bonaventuræ, demonstrative et prolixius exsequemur.

Dum querit *an curva ultra triangulum et parabolam* (¹) possint esse
conicæ sectiones, non videtur meminisse singularium proprietatis : tam
enim hoc <est> impossibile quam sectionem sphærae per planum
dare parabolam aut hyperbolam aut ellipses.

Ut, horum vice, problemata quaedam ex Italia communicet, ex animo
rogamus.


(1) Cavalieri n'avait sans doute posé la question que sur les courbes dont il est parlé plus haut.

(AD LALOVERAM PROPOSITIONES)⁽¹⁾.

I.

Sit (fig. 112) parabole BAD, cujus axis AC, applicata BC, rectum latus AE. Quæritur ratio curvae AB ad rectam BC.

Fig. 112.



Esto hyperbole MLO, ejus centrum G, transversum latus FL æquale rectæ AE quæ est rectum datae paraboles latus; axis hyperboles sit LN.

(1) Ce morceau figure comme *Pars prior de l'Appendix secunda* (p. 391 à 395) dans l'ouvrage : *Veterum Geometria promota in septem de Cycloide libris, et in duabus adjectis Appendicibus.* — Auctore ANTONIO LALOVERA Societatis Jesu, — Tolose, apud Arnauldum Colomerium, Regis et Academie Tolosance Typographum, M.DC.LX. Cum privilegio.

L'attribution à Fermat est justifiée par le préambule ci-après de l'*Appendix secunda* (p. 390-391) :

« Quod olim fecit Conon illi apud Archimedem laudatissimus, cum aliquot reconditum Geometriae theorematum à se primum repertorum nudam propositionem ad Amicos privatum misit demonstratione penes se pressū: fortasse quia (quod sape evenit) illam è mentis arcano in adversaria nondum transtulerat : hoc ipsum alter seculi nostri Conon D. de Fermat cum sape alias, tam nuperrimè de argumento summiè arduo praestitit. Possitremas ego istas propositiones, quoniam mirificè illustrant ea quæ de quadraticibus unguicularibus in quinto, et de spirabilibus lineis in sexto libro serripsi, huic operi attexere (quod singulari ejus molestie inopinatum profectò accidet) non dubito : fieri eam nequit quin illis inspectis, quilibet alijs meis ausis faveat et de publici hæc ad Geometrica inventa access-

rectum vero illius latus sit aequale lateri transverso, ut nempe rectangulum quodvis FNLM sit aequale quadrato applicatae MN. Ad punctum G excitetur perpendicularis GH aequalis rectae BC in parabola; deinde, ductis rectis HM et LI, ipsis GN et GH parallelis, per punctum M, in quo recta HM occurrit hyperbolæ, ducatur applicata MN.

Aio quadrilaterum MHGL, ejus tria latera sunt rectæ MH, HG, GL, quartum vero latus curva hyperbole ML, esse ad rectangulum IG ut curva parabolica AB est ad rectam BC.

II.

Data sit (*fig. 113*) parabole BAD, ejus axis AC, applicata BC, rectum latus AE; circa applicata BC volvatur spatium parabolium BAC. Quæritur dimensio superficie curvæ illius solidi.

Exponatur hyperbole MNH, ejus axis HI, transversum latus HF aequale quartæ parti lateris recti paraboles, sive rectæ AE; rectum vero illius hyperboles latus sit aequale transverso, ut nempe rectangulum

sione non summopere gaudeat. Ista si pro meis evulgare decrevissem, Vir quidem modestissimus, qui non sibi sed Geometrie famam querit, aequissimo rem tulisset animo: id tamen alienissimum à me semper fuit: nec existim Geometrae gravius quicquam objici posse: quem quod alieni exprobari aliquando audivi, *totus non es tuus, totus es alienus;* et *hac ipsa ratione qua Geometra es,*


Culus cùm fueris, cris comatus.

Hunc autem jamdiu esse morem Viro Clariss. ut sua per Amicorum manus Geometrica tacitè spargat. Inculenter testatur R. P. Mersenn. prop. 47. Hydr., pag. 193: *taceo,* inquit, *varios illos περὶ ἑπτάρη, de maximis et minimis, de tangentibus, de locis planis, solidis et ad sphararum, quos Clariss. Senator Tolosanus D. Fermatius huc ad nos misit.* Plures alia ejus inventa commemorat in *prefat.* ad Mechanica n. 4, in Ballisticis pag. 57, in Analyti pag. 385. Hinc factum est ut in ore summorum etiam in Italia Geometraru Torrielli et Cayalerii semper fuerit, quod testatur doctissimus Bullialdus in prafatione opusculi *de Porismatibus* (*). Ceterum non res tantum, sed verba etiam ipsa sunt integrissimi Senatoris: quibus omnibus de meo adjicio in posteriore parte innumeratas curvilinearum figurarum, in quibus est Nicomedea conchoides, quadraturas: quae omnia si vera esse comprobantur, ex totâ istâ appendice confirmabitur illud, quod quidam dixit: *hac tempestate in Geometricis inventum et superatum feliciter esse Bonæ Spei promontorium illud, unde expedita e cœstat navigatio ad inaccessas autē tetragonismorum præsertim regiones.* „

* Voir plus haut p. 58 la note 2 de la page 55.

quodvis FH sit æquale quadrato applicatae IM . Fiat recta HI æqualis rectæ AC axi paraboles, et ducatur applicata IM . A rectangulo sub CA

Fig. 113.




in curvam parabolicam BA auferatur spatium hyperbolicum IMH ; reliquum quadretar.

Diagonia illius quadrati erit radius circuli <æqualis> superficie curvae solidi quod fit a rotatione spati ABC circa applicatam BC .

III.

Sit semiparabole quavis AC (fig. 114), ejus vertex A , axis AB ; ab ea curva formentur aliae curvae infinitæ, ut AF , AE , AD , etc.

Fig. 114.



Ita autem formantur: in curva AF , applicata BF est æqualis curvae parabolice CA et, sumpto similiter quovis puncto N , a quo ducatur applicata NP , applicata NP est etiam æqualis curvae parabolice AO . In curva EA , applicata EB æquatur curvae secundi gradus FA , et illius applicata QN æquatur portioni <ejusdem curvæ> secundi gradus PA . Item in curva AD , applicata BD æquatur curvae tertii gradus EA , appli-

cata vero NR portioni ejusdem curvæ tertii gradus QA : et sic in infinitum.

Aio omnes hujusmodi in infinitum curvas rationem habere datam ad parabolæ primarias, hoc est simplices; enuntiari quippe potest generale theorema hoc pacto :

Continuetur parabole primaria AG in infinitum per puncta, verbi gratia, M, L, K, et illius axis similiter ad puncta quotlibet G, H, I producatur; fiant rectæ BG, GH, III singulae æquales axi AB, et ducantur applicatae GM, HL, IK.

Curva parabolica AM est ad curvam secundi gradus AF ut applicata GM ad applicatam BC.

Curva parabolica AL est ad curvam tertii gradus AE ut recta HL ad BC rectam.

Curva parabolica AK est ad curvam quarti gradus AD ut applicata KI ad rectam BC.

Et sic in infinitum.

Si vero intelligantur AMG, AFB circa applicatas GM, BF rotari, superficies curva ex rotatione spatii AMG circa rectam GM erit ad superficiem ex rotatione spatii AFB circa rectam BF ut cubus rectæ GM ad cubum rectæ BC.

Similiter superficies curva ex rotatione spatii ALH circa HL erit ad superficiem curvam ex rotatione spatii AEB circa rectam BE ut cubus rectæ HL ad cubum rectæ BC.

Et sic in infinitum.

IV.


Esto figura semicycloides BA (*fig. 115, 116*), a qua formetur alia curva DA eà conditione ut applicatae BC, CD; FO, EO sint inter se semper in eadem ratione data. Demonstrarunt Geometrae (¹) semicy-

(¹) Fermat et Roberval sur l'énoncé de Wren (*Histoire de la Roulette dans les Œuvres de Pascal*, t. V, p. 172-173). La démonstration de Fermat est perdue; Lalouyère (p. 183) en dit : « Hujus rei demonstrationem more antiquorum à Geometra celeberrimi nominis Folosano subtilissime elaboratam legi. »

cloidem BA esse duplam rectæ AC, que est diameter circuli cycloidem producentis. Quæritur relatio curvarum AD ad alias lineas aut curvas aut rectas.

Ita autem generaliter definimus : Si haec novæ curvæ sint intra cycloidem et diametrum circuli generantis, ut contingit in figura quarta (*fig. 115*), omnes haec curvæ AD earumque portiones erunt æquales

Fig. 115.



curvis parabolicis; quod si novæ curvæ sint exteriores cycloidi, ut in figura quinta (*fig. 116*), omnes haec curvæ AD earumque portiones datam habebunt rationem ad summam rectarum et circumferentiarum circularium.

Enunciari potest in figura quarta (*fig. 115*) generalis propositio hoc pacto : Fiat

ut differentia quadratorum BC et CD ad quadratum CD,
ita quadrupla rectæ AC ad rectam AM,

et per punctum A tanquam verticem describatur parabole cujus rectum latus sit AM et axis AC; occurrat autem parabole rectæ BDC productæ in puncto G, rectæ vero FEO in puncto H. Ratio curvæ AG parabolicæ ad curvam AD erit data, eadem nempe potestate quæ est quadrati BC ad differentiam quadratorum BC, CD.

Eadem vero erit ratio portionum AH et AE.


Ratio vero superficierum curvarum quæ oriuntur ex rotatione spati ACB circa applicatam CG et ex rotatione spati ADC circa rectam DC eadem est quæ curvarum AG et AD. Similiter in portionibus AOH, AEO circa rectas OH et OE rotatis.

In figura autem quinta (*fig. 116*), in qua curva AD est exterior cycloidi AB, fiat

ut differentia quadratorum CB, CD ad quadratum CD,
ita recta AC ad AM

rectæ AC in directum positam; super rectâ AM describatur semicirculus, quem rectæ DBC, EFO secent in punctis G et H. Ratio curvae

Fig. 116.



$AD < ad >$ summa curvae circularis AG et rectæ GC dabitur: erit
nempe

ut quadratum BC ad differentiam quadratorum OC, CB,


ita potestate summa lineæ circularis AG et rectæ GC ad curvam AD,

et similiter summa lineæ circularis AH et rectæ HO in eadem erit ra-
tione ad curvam AE.

V.

Sit in figura sexta (fig. 117) parabole AC, cujus vertex A, axis AB,

Fig. 117.



applicata CB; a curva parabolica CA deriventur aliae in infinitum curvae
CD, CE, CF, simili qua in figura tertia (fig. 114) usi sumus methodo,
nisi quod in hac terminum applicatae servamus, in illa vero terminum
axis cumdem semper retinemus.

Ducatur nempe GHOM (fig. 117) axi AB parallela: ea erit natura

curvarum hujus speciei, ut recta BD, quae secat in D curvam CD secundi gradūs, sit æqualis curvæ parabolice AC, recta item GI sit æqualis CH portioni parabolice; recta autem BE quæ secat \angle in E curvam tertii gradūs COE, sit æqualis curvæ DIC secundi gradūs; et sic de cæteris in infinitum, eamque portionibus.

Aio omnes hujusmodi curvas, CD, EC, FC in infinitum, æquales esse curvis parabolicis primariis seu simplieibus, diversis tamen a parabolis quæ æquantur curvis juxta methodum tertiae figuræ generatis. En itaque theorema generale :

Exponatur parabole RP, cujus axis RQ æqualis axi AB prioris paraboles, rectum vero latus RU sit duplum recti lateris AN : Aio parabolam RP ita descriptam æqualem esse curvæ CD.

Si vero, manente axe RQ æquali axi AB, rectum latus RU fiat triplum recti lateris AN, tunc curva parabolica RP erit æqualis curvæ COE.

Si vero, manente semper axe RQ æquali axi AB, rectum latus RU fiat quadruplum recti lateris AN, tunc curva parabolica RP erit æqualis curvæ CMF.

VI.

Si autem circa rectas AB, BD, BE, BF rotentur spatia ACB, DCB, ECB, FCB in infinitum, dantur circuli æquales omnibus et singulis superficiebus curvis solidorum inde oriundorum, cædem omnino facilitate quæ in conoide parabolico, ex parabola AC circa axem AB descripto, circulum curvæ ipsius superficieæ æqualem repræsentamus. Ejus vero constructionem non adjungeremus, quum jam ab aliis (¹) inventam audierimus (licet eorum scripta hac de re ad nos non pervenerint), nisi quod nostra hæc constructio ad methodum generalem in omnibus conoidibus circa axes BD, BE, BF novarum istarum curvarum in infinitum producendis facillime producitur.

(¹) Roberval (d'après Merseyne, *Cogitata physico-mathematica*, 1634, p. 99); Huygens, dans une Lettre à Carcavi du 16 janvier 1659 (comparer *Oeuvres de Pascal*, édition de 1779, t. V, p. 403 et 455; *Lettre de J. Dettonville à Monsieur Hugguens de Zulichem, en lui envoyant la dimension des Lignes de toutes sortes de Roulettes, lesquelles il montre estre égales à des Lignes Élliptiques*. A Paris, M.DC.LIX).

In figura sexta (*fig. 117*) circa rectam BD rotetur curva CD, superficies curva inde oriumda hoc paeto invenitur :

Fiat, ex superiore methodo, curva parabolica RP æqualis curvæ CID; circa rectam RQ rotetur parabole RP. Superficies conoidis parabolici RPQ ad superficiem conoidis DICB erit ut applicata PQ ad applicatam CB.


Si PR parabole juxta præcedentem methodum fiat æqualis curvæ COE, conoides parabolicum RPQ dabit superficiem curvam quæ ad superficiem curvam conoidis EOCB erit ut applicata PQ ad applicatam CB.

Et sic in infinitum.

VII.

Sit in figura septima (*fig. 118*) parabole FBAD, ejus axis EA, applicata FE. Queritur dimensio superficiei curvæ solidi quod fit a spatio ABFE circa axem AE rotato.

Fig. 118.



Fiat AC æqualis quartæ parti recti lateris et applicetur CB; fiat EH æqualis AC et applicetur GH; quadretur CBGH (hoc autem est facile ex Archimede).

Diagonia quadrati spatio CBGH æqualis est radius circuli æqualis superficiei curvæ conoidis FAD circa axem AE.

VIII.


Videat subtilis ille Geometra (¹), qui nuper æqualitatem helicis et paraboles demonstravit, an potuerit universalius concipi theorema et

⁽¹⁾ Lettre de A. Dettonville à Monsieur A. D. D. S., en lui envoyant la démonstration à la manière des anciens de l'égalité des lignes Spirale et Parabolique. A Paris, M. DG.LVIII. — Œuvres de Pascal, t. V, pages 426 à 52.

helices infinitae cum infinitis parabolis eleganter comparari, sequentis propositionis beneficio generaliter, si libuerit, enuntianda et exemplificanda.

Proponatur (*fig. 119*) helix cuiuscumque in infinitum speciei in figura 38 libelli Dettonvillani⁽¹⁾, in qua potestas quævis radii AB ad

Fig. 119.



potestatem similem rectæ AC sit in ratione potestatis ejuslibet circumferentiae totius BE8B ad potestatem similem portionis peripherie E8B.

Exponatur separatim parabole cujus semibasis sive ultima applicatarum RP aequetur radio AB, axis vero AR portioni circumferentiae totius BE8B, ejus numerator aequetur exponenti potestatis diametri AB, denominator vero aequetur aggregato exponentium potestatum diametri AB et circumferentiae BE8B; denique potestates applicatarum in parabola, quarum exponens aequatur aggregato exponentium potestatum diametri AB et circumferentiae BE8B, sint inter se ut potestates portionum axis, quarum exponens est aequalis exponenti circumferentiae BE8B.

Aio helicem ita efficiam parabolæ ita constructæ fore semper et in quoenamque casu aequali.

Exempli gratia, proponatur primum helix Archimedea et parabole

(1) La figure que nous reproduisons d'après Lalouvre ne présente pas toutes les complications de celle de Pascal. Fermat cite d'ailleurs le Volume : *Lettres de A. Dettonville contenant quelques-unes de ses Inventions de Géométrie*, — à Paris, chez Guillaume Desprez, rue Saint-Jacques, à l'Image Saint-Prosper, M.DC.LIX, — Volume qui réunit, sous neuf paginations successives, mais avec des planches de figures formant une seule série, les différents écrits publiés sous le nom de Dettonville.

simplex et sit

ut radius AB ad rectam AC,
ita circumferentia tota BE8B ad ejusdem portionem E8B.

Construatur separatim parabole AQP, cuius ultima applicatarum sive basis RP sit aequalis radio AB; axis autem AR sit aequalis portioni circumferentiae BE8B, cuius numerator sit aequalis exponenti potestatis diametri AB, qui in hoc casu est 1; denominator vero aequetur summae exponentium potestatum diametri et circumferentiae, hoc est binario : nam exponens potestatis peripherie in hoc casu est etiam 1. Sit itaque AR axis aequalis dimidio circumferentiae helicis constitutive; sit autem in parabola ut potestas applicata RP, cuius exponens aequatur summae exponentium diametri et circumferentiae, hoc est, in hoc casu, numero 2, ad potestatem similem applicatae 6Q, ita potestas rectae AR, cuius exponens aequatur exponenti circumferentiae BE8B, sive 1 in hoc casu, ad similem potestatem rectae A6, hoc est :

sit
ut quadratum rectae RP ad quadratum rectae 6Q,
ita recta RA ad rectam 6A.

Curva parabolica PQA erit aequalis helici BCDA.

Esto jam

ut quadratum AB ad quadratum AC,
ita tota circumferentia BE8B ad portionem E8B :

exponens potestatis diametri AB in hoc casu est 2, circumferentiae vero, 1. Parabole ita constructa juxta praedictum canonem :

Applicata RP aequabitur radio AB, axis AR aequabitur hessi vel duobus trientibus circumferentiae BE8B et erit

ut cubus RP ad cubum 6Q, ita recta RA ad rectam 6A.

Hujusmodi vero parabole helici correlatae aequalis erit.

Esto deinde

ut recta AB ad rectam AC,
ita cubus circumferentiae BE8B ad cubum portionis E8B.

In parabola, applicata RP aequabitur radio AB, axis vero AR aequabitur

quadranti circumferentiae BE8B, et erit

ut quadratoquadratum RP ad quadratoquadratum 6Q,
ita cubus RA ad cubum 6A.

Hæc autem parabole huic helici erit æqualis.

Denique sit in helice

ut quadratum radii AB ad quadratum rectæ AC,
ita cubus circumferentiae BE8B ad cubum portionis E8B.

In parabola huic helici correlata et æquali, applicata RP erit æqualis, ut semper, radio AB, recta vero RA erit æqualis duabus quintis partibus circumferentiae BE8B, et erit in parabola

ut quadratoebus applicatae RP ad quadratoeubum applicatae 6Q,
ita rectæ AR cubus ad cubum rectæ 6A.

Nec dissimilis in helicibns et parabolis cuiuslibet speciei invicem comparandis in infinitum erit methodus. Helicis autem, sive deminutæ sive auctæ, portiones cum portionibus parabolæ correlatae nullo negotio comparabuntur. Unde sequitur dari intra cirenum infinitas numero helices specie et quantitate diversas; imo dantur infinitæ ipsa circumferentia majores: quod inter miracula geometrica potest numerari. Nulla tamen datur quæ non sit minor aggregato circumferentia et radii, et nulla etiam quæ non sit radio major (¹).

(¹) Après ce fragment, le texte de Lalouvère continue par un *Scholium* commençant par ces mots : « *Iactenus Viri Clarissimi propositiones non minus arduae quam novæ* » et finissant par ceux-ci : « *nisi nefas putaremus quicquam hocce in loco demere vel addere tam præcloris Viri doctissimi inventis* ».

On lit encore dans le même Ouvrage (Livre II) :

Page 21 : « *Cyclo cylindricam figuram primi nominis* vocamus eam quæ intelligitur in superficie cylindri recti describi eo modo quo circulus in plano, nempe si, pede circini extremo manente in dato superficie cylindrica puneto, ipse circinus circunducatur notans in superficie cylindrica lineam donec ad idem punctum circuitu peracto redeat, quoties iste redditus fuerit possibilis. Circini autem crura si deducta fuerint intervallo diametri bascos cylindri, vocetur *cyclo cylindrica primaria* et antonomasticè *cyclo cylindrica*; si alio quovis intervallo, dicatur *cyclo cylindrica secundaria*. Quod si figuratur extra illam superficiem, *nominis secundi* appellabitur . . . »

Page 29 : « De hac figurâ quadrandâ ut cogitarem fecit Clarissimus D. de Fermat; postea

enim quam primum hujus operis librum vulgavi (^a), nescio qua se dante occasione significavit mihi invenisse se solidi, motu cujuslibet cyclo cylindrica primi nominis circa basim geniti, proportionem cum cylindro circa eandem basim genito motu rectanguli ejus unum latus sit eadem basis, alterum aequum axem cyclo cylindrica. Ubi primū solus fui, copi mecum cogitare quid istud rei foret, reperique tandem post aliquot dies non tantum proportionem illam, quam mihi vir optimus non expresserat, sed etiam quadraturam cyclo cylindrica primariae primi nominis. Hoc, cùm iterum illum alloquerer, ipsi denuntiavi, deque meo invento pro sua qua me licet immerentem complectitur benevolentia, et pro studio illo quo artum omnium incrementa mirificè foveat, mihi amplè gratulatus est. Aliquot post diebus literis ad D. Careavi datis inserui quantum hae in re deberem integerim illi Senatori, quanti facerem subtilissimam quam mihi tunc communicaret demonstracionem circa proportionem cylindri et solidi... »

Et toujours sur le même sujet, page 34 : « Doctissimus D. de Fermat, methodo subtilitatis proorsus mirabilis, istam proportionem in quaenque primi nominis cyclo cylindrica mihi demonstravit : quam quidem methodum suis in operibus, qua totâ Europâ enixè expetuntur, edet, uti spes est, Amicorum omnium precibus tandem victus. »

(^a) C'est à dire après le 23 juillet 1658, mais avant le 5 septembre 1658, date de la réponse faite par Pascal à la lettre Talonvère à Careavi. Il faut entendre au reste, pour la question imaginée par Fermat, que la surface du cylindre est développée sur un plan.



DE LINEARUM CURVARUM
CUM LINEIS RECTIS COMPARATIONE
DISSERTATIO GEOMETRICA ⁽¹⁾.

Nondum, quod sciām ⁽²⁾, lineam curvam pure geometricam rect datae geometræ adæquarunt. Quod enim a subtili illo mathematico Anglo nuper inventum et demonstratum est : *cycloidem nempe primariam diametri circuli ipsam generantis esse quadruplam*, hoc suam, ex sententia doctissimorum geometrarum ⁽³⁾, videtur habere limitatio-

(¹) Cette Dissertation, comme l'Appendice qui suit, a été imprimée du vivant de Fermat, sous le même titre, suivi des indications « Autore M.P.E.A.S. — Tolosæ, apud Arnaldum Colomerium, Regis et Academia Tolosana Typographum, MDCLX. » et avec une pagination spéciale, à la suite du Traité de Lalouère sur la cycloïde (*voir* plus haut, p. 199, note 1). La réimpression des *Faria* ne diffère que par la correction des fautes indiquées par les errata de l'édition anonyme et par la substitution de majuscules aux minuscules pour les lettres des figures.

(²) On ne peut mettre en doute l'assertion de Fermat : au moment de l'impression de cet Ecrit, il connaît donc la rectification de la cycloïde par Wren, rendue publique en 1658 à l'occasion des problèmes proposés sur cette courbe par Pascal ; au contraire, il ignore, non seulement, bien entendu, la découverte de William Neil (reportée à l'année 1657, mais publiée en 1673 seulement par Wallis, *Philosophical Transactions*, p. 6146-6149), mais encore, ce qui peut surprendre réellement, la Lettre de Henri Van Heuraet insérée pages 517-520 de l'édition latine de la *Géométrie* de Descartes par Schooten (Amsterdam, Elzévirs, 1659). Il n'est guère douteux que Fermat n'ait eu bientôt après connaissance de cette Lettre et qu'il ne soit alors applaudi d'avoir caché son nom en publiant un travail pour lequel il avait incontestablement été devancé. Il ne s'agit pas d'ailleurs ici d'une ancienne découverte que Fermat aurait tenue secrète plus ou moins longtemps ; sa Dissertation est de fait une réplique au petit Traité de Pascal (Dettonville), de l'*Égalité des lignes spirale et parabolique*, du 10 décembre 1658. Cependant Fermat n'en semble pas moins être le premier qui ait considéré la courbe $y^3 = a \cdot x^2$, en généralisant la notion de parabole. *Voir* plus haut, page 195.


(³) *Lettre de A. Dettonville à Monsieur Hngguens de Zulichem*; Paris, 1659 — *Oeuvres de Pascal* (éd. de 1779), tome V, page 413 : « A quoi M. de Sluze ajouta cette belle re-

nem : ii quippe hanc esse legem et ordinem naturæ pronuntiant ut non sinat inveniri rectam curvæ aequalem, quin prius supposita fuerit alia recta alteri curvæ aequalis. Quod quidem in exemplo cycloidis ab ipsis allato ita se habere deprehendunt, nec nos diffitemur, quum constet descriptionem cycloidis indigere aequalitate alterius curvæ cum recta, hoc est, circumferentiae circuli cycloidem generantis cum recta quæ est basis ipsius cycloidis. Sed quam vera sit hæc, quam statnunt, lex naturæ, et quam perieulosum ab uno aut altero experimento statim ad axioma properare, infra patebit : nos enim *curvam vere geometricam, et ad cujus constructionem nulla talis alterius curvæ cum recta aequalitas præcessisse supponatur, rectæ datæ aequalem esse demonstrabimus et paucis, quantum fieri potuerit, totum negotium absolvemus.*

PROPOSITIO I.

Sit, in figura prima (fig. 120), curva quævis AHMG in casdem partes cava, exempli causa, una ex parabolis infinitis in qua tangentes extra

Fig. 120 (1).



curvam cum base AF et axe FG concurrent, et sumatur in hujusmodi curvâ quodvis punctum H per quod ducatur tangens HK, in qua sumptis ex utraque parte punctis K et L demittantur perpendiculares IB, KD in basim AF, quæ secant curvam in punctis R et M : Aio portionem tangentis III portione curvæ RH esse minorem, portionem autem ejusdem tangentis HK portione curvæ HM esse majorem.

marque dans sa réponse du mois de septembre dernier, qu'on devoit encore admirer sur cela l'ordre de la nature, qui ne permet point qu'on trouve une droite égale à une courbe, qu'après qu'on a déjà supposé l'égalité d'une droite à une courbe. »

Quum enim, ex hypothesi, tangens KI ocurrat basi AF extra curvam, ergo angulus CHI , qui sit ab intersectione perpendicularis in basim HC et tangentis HI , erit minor recto, ideoque a puncto H demissa perpendicularis in rectam BI cadet in punctum V supra puncta B , R , I . Patet itaque rectam HV minorem esse rectam HI ; item rectam HI minorem esse rectam quae puncta H et R conjungit: ergo, a fortiori, recta HI minor erit portione curvae HR , quam recta ab H ad R dueta subtendit. Quod primo loco fuit demonstrandum.

Aio jam portionem KH portione curvae HM esse majorem.

A puncto K ducatur ad eamdem curvam tangens KN , et demittatur perpendicularis NE . Ex prædemonstratis, probatum est rectam KN esse minorem portione curvae NM ; sed, ex Archimedē (¹), summa tangentium HK , KN est major tota portione curvae HN : ergo portio tangentis HK portione curvae HM major erit. Quod secundo loco fuit ostendendum.

Nec moveat tangentem a puncto K ultra punctum G aliquando ocurrere curvam: hoc enim casu aliud punctum inter K et M sumi poterit, et omnia ad præcedentem demonstrationem aptari.

INDE SEQUITUR, si a punctis K et I ducantur perpendiculares ad axem, curvam in punctis O et P secantes, hoc casu tangentem HI curvam HO esse majorem, tangentem vero HK curvam HP esse minorem.

Si enim imaginemur inverti figuram ita ut axis in locum baseos, basis in locum axis transferatur, non solum similis in hoc casu, sed eadem omnino erit demonstratio.

PATET AUTEM, ex ipsa constructione, si rectæ BC et CD sint æquales, portiones tangentis HI et HK esse item inter se æquales, quod tamen summopere notandum.

PROPOSITIO II.

Ad dimensionem linearum curvarum non utimur inscriptis et cir-


(¹) ARCHIMÈDE, *De sphera et cylindro*, I, λεπτωτήματα 2 : édition Heiberg, volume I, pages 8-10.

enunciatis more Archimedeo (¹), sed circumscriptis tantum ex portionibus tangentium compositis : duas enim series tangentium exhibemus, quarum una major est curvâ, altera minor. Demonstrationes autem multo faciliorem et elegantiorem per circumscriptas solas evadere analystæ experientur.

Possibile igitur, ut vult methodus Archimedea, pronuntiamus cuilibet ex curvis jam predictis circumscribere duas figuras ex rectis constantes, quarum una superet curvam intervallo quovis dato minore, altera autem superetur a curva intervallo etiam dato minore.

Exponatur curva aliqua ex predictis in secunda figura (fig. 121). Secetur basis AG in quotlibet portiones æquales AB, BC, CD, DE, EF,

Fig. 121 (2).



FG, et a punctis B, C, D, E, F erigantur perpendicularares BQ, CV, DZ, ER, FM, quæ occurrant curvæ in punctis P, T, Y, N, O; ducantur item tangentes AQ, PV, TZ, YR, NM, OL.

Ex prima propositione patet tangentem AQ portione curvæ AP esse majorem; item tangentem PV portione curvæ PT esse majorem, et sic de reliquis, tandemque etiam ultimam OL portione curvæ OH esse majorem. Ergo figura, constans ex omnibus istis tangentium AQ, PV, TZ, YR, NM, OL portionibus, curvâ ipsâ major erit.

At exponatur eadem curva in tertia figura (fig. 122), enjus basis AG in eundem portionum æqualium numerum dividatur in punctis B, C, D, E, F; a punctis B, C, D, E, F, ut supra, erigantur perpendicularares BR, CQ, DO, EL, FI, quæ occurrant curvæ in punctis S, P, N, M, K; a puncto autem S (in hac tertia figura) ducatur tangens ST, occurrens


(1) ARCHIMEDE. *Circuli dimensiones*, prop. 1; mais la méthode d'Archimède est surtout développée dans le Traité *De sphera et cylindro*, où elle est appliquée à la mesure des surfaces du cône, du cylindre et de la sphère.

perpendiculari AT; deinde a punctis P, N, M, K, H ducantur tangentes PR, NQ, MO, KL, HI, occurrentes perpendicularibus BS, CP, DN, EM, FK in punctis R, Q, O, L, I.

Ex prima propositione patet tangentem ST portione curvæ AS esse minorem; item tangentem PR portione curvæ PS esse minorem, et sic deinceps, tandemque ultimam HI (quæ parallela est basi) portione curvæ KH esse minorem. Ergo figura, constans ex omnibus istis tangentium ST, PR, NQ, MO, KL, HI portionibus, curvà ipsâ minor erit.

Quum autem, ex corollario propositionis primæ, partes tangentium ab eodem puncto curvæ utrumque productarum et portionibus baseos hinc inde æqualibus oppositarum sint inter se æquales, patet (quum

Fig. 133 (3).




secundæ et tertiae figuræ curvæ supponantur æquales aut eadem potius, licet vitandæ confusionis causâ duas figuræ descripserimus) tangentem ST tertiae figuræ æqualem esse tangenti PV secundæ figuræ. Quum enim punctum S in tertia figura idem omnino sit cum puncto P secundæ figuræ et portiones baseos AB, BC in utraque figura sint inter se æquales, portiones tangentium ex utraque parte ipsis oppositarum, nempe recta ST in tertia figura et recta PV in secunda, inter se æquales erunt.

Probabitur similiter tangentem PR tertiae figuræ æqualem esse tangenti TZ secundæ, et sic de ceteris; quo peracto, constabit primam tantum secundæ figuræ et ultimam tertiae nulli ex portionibus figuræ contrariae æqualem esse: excessus igitur, quo figura secunda superat tertiam, est idem quo tangens AQ secundæ figuræ superat tangentem HI tertiae figuræ. Sed recta HI, propter parallelas, æqnatur portioni baseos FG sive AB (supponuntur enim omnes baseos portiones æquales in utraque figura): ergo figura secunda, ex tangentibus curvâ majori-

bus composita, superat figuram tertiam, ex tangentibus curvâ minoribus compositam, eo ipso quo in secunda figura tangens AQ superat portionem baseos AB, ipsius oppositam intervallo.

Si igitur velimus duas figuras curvæ circumscibere, alteram majorem curvâ, alteram verò minorem, quæ se invicem exceedant intervallo minore quocumque dato, facilissima erit constructio. Quum enim, ex *Methodo tangentium* jam cognita, detur tangens ad punctum A (*fig. 121*),

Fig. 121 (2).



dabitur angulus QAB; sed angulus QBA est rectus : ergo datur triangulum QAB specie, datur itaque ratio rectæ AQ ad AB. Cavendum itaque est ut divisio baseos ita instituatur ut differentia rectarum AQ et AB sit minor quâcumque rectâ datâ : quod ita assequemur, si quæramus duas rectas in data ratione quæ se invicem exceedant rectâ datâ quæ sit minor è quæ data est. Hoe autem problema est facile, et cœrandum deinde ut portio quælibet baseos, AB, non sit major minore duarum quæ dicto problemati satisfaciunt.

Quum igitur hac ratione invenerimus duas figuras curvæ circumscriptas, alteram majorem, alteram minorem dictâ curvâ, quæ se invicem exceedunt intervallo minore quo cumque dato, a fortiori major ex circumscriptis superabit curvam intervallo adhuc minore, et minor ex circumscriptis superabitur a curva intervallo adhuc minore.


Pauli itaque ex nostra hac methodo per duplum circumscriptiōnē commōdūm p̄eberi adītūm ad methodū Archimedēam, quum agitur de dimensione linearū curvarū. Quod semel monuisse et demonstrasse sufficiet.

His positis, secure pronuntio inveniri posse curvam vere geometricam datæ rectæ æqualem : ea vero est una ex infinitis parabolis, quas olim spe-

culati sumus (¹), illa nempe in qua cubi applicatarum ad axem sunt inter se ut quadrata portionum axis. De quo ne dubitent geometræ, ita breviter demonstro.

PROPOSITIO III (²).

Sit in quarta figura (fig. 123) parabola, quam jam indicavimus. MVA, cuius vertex A, axis AN, et in qua, sumpcio quovis puncto I et ductis

Fig. 123 (¹).

perpendicularibus seu applicatis ad axem rectis MN, IF, cubus recte MN sit ad cubum recte IF ut quadratum recte NA ad quadratum recte FA, idque semper contingat; probandum est curvam MVA recte datae aequaliter esse.

Fiat

ut quadratum axis AN ad quadratum applicatae NM,

ita recta NM ad rectam AD ipsi AN perpendiculararem.

Patet rectam AD esse rectum dictæ paraboles latus, hoc est :

solidum sub AD in quadratum recte AN aequari cubo applicatae NM,

item, sumpcio quovis alio puncto, nli I,

solidum sub AD in quadratum AF aequari cubo applicatae IF;

quod non eget demonstratione : in facilibus enim non immoramus.

(¹) *Voir plus haut, page 195.*

(²) L'énoncé qui suit est en réalité celui de la proposition IV ; l'objet de la proposition III se borne à un lemme déterminant la longueur de la tangente dans la parabole $y^3 = ax^2$.

Ducatur tangens ad punctum I, et sit illa IOE, quæ cum axe AN in puncto E concurrat. Ex *Methodo tangentium* constat rectam FA rectæ AE esse duplam, ideoque

$$\begin{array}{l} \text{rectam FE} \\ \text{quadratum vero rectæ EF esse ad quadratum rectæ AF ut } 9 \text{ ad } 4. \end{array}$$

A recta AD abscindatur nona ipsius pars CD, et reliqua CA bisectetur in B; erit igitur

$$DA \text{ ad } AB \text{ ut } 9 \text{ ad } 4. \quad \text{sive ut quadratum EF ad quadratum AF.}$$

Solidum itaque sub AD in quadratum AF æquale erit solido sub quadrato FE in rectam AB; sed solidum sub AD in quadratum AF est æquale cubo rectæ IF; ergo solidum sub recta AB in quadratum EF est æquale eidem cubo rectæ IF. Est ergo

$$\begin{aligned} &\text{ut quadratum EF ad quadratum IF, ita recta IF ad rectam AB,} \\ &\text{et, componendo, summa quadratorum EF et FI, hoc est unicum} \\ &\text{quadratum tangentis IE est ad quadratum IF,} \\ &\text{ut summa rectarum IF et AB ad AB.} \end{aligned}$$

Si autem ducatur a puncto I perpendicularis ad basim, recta HI et alia quavis perpendicularis GQVO occurrens applicatae IF in Q, curva in V et tangentis in O, propter similitudinem triangulorum, erit

$$\begin{aligned} &\text{ut IO ad IQ sive ipsi æqualem HG,} \\ &\text{ita tangens IE ad applicatam IF,} \\ &\text{et} \\ &\text{ut quadratum IO ad quadratum HG, ita quadratum IE ad quadratum IF.} \end{aligned}$$

Et autem

$$\begin{aligned} &\text{quadratum IE ad quadratum IF,} \\ &\text{ita summa rectarum IF et AB ad rectam AB.} \end{aligned}$$

Ergo

$$\begin{aligned} &\text{quadratum IO ad quadratum HG erit semper} \\ &\text{ut summa rectarum IF et AB ad rectam AB.} \end{aligned}$$

Quod demonstrare oportuit.

INDE SEQUITUR, si rectae MN ponatur in directum recta NX rectæ AB aequalis, esse semper

ut quadratum tangentis IO ad quadratum rectæ HG,

vel ut quadratum tangentis IY ex altera parte ad quadratum rectæ oppositæ RH (utrobique enim, propter parallelas, eadem est ratio).


ita rectam IX ad rectam NX.

Recta enim IX aequalis est summe rectarum HF et AB, et recta NX est aequalis AB. Hoc autem patet ex constructione : recta enim IX, propter parallelas, aequalis est rectæ HF, et reliqua NX facta est aequalis rectæ AB.

PROPOSITIO IV.

Exponatur in quinta figura (fig. 124) nostra haec parabole AXE, cujus sit ea, ut diximus, natura ut cubi applicatarum sint inter se in ratione quadratorum portionum axis. Sit ejus axis AI, basis aut semi-basis EI.

Fig. 124 (5).



Ex datis axe AI et applicata IE invenitur, ut superius diximus, rectum latus AD, a quo abscissâ nonâ ipsius parte CD, et reliquâ AC bifurciam divisâ in B, seeetur basis EI in quotlibet libuerit portiones aequales EF, FG, GH, HI, et a punctis F, G, H excitentur perpendiculares FX, GY, HZ, curvæ ocurrentes in punctis X, Y, Z. Ad puncta autem E, X,

Y, Z ducantur tangentes ER, XS, YT, ZV, oecurrentes perpendicularibus FX, GY, HZ, IA productis, in punctis R, S, T, V. Ponatur recta EI in directum recta IK aequalis rectæ AB.

Patet, ex praecedente propositione et ipsius corollario,

quadratum tangentis ZV ad quadratum rectæ III
esse ut rectam HK ad rectam KL;

similiter

ut quadratum tangentis YT ad quadratum rectæ GH,
ita rectam GK ad rectam KL;

item

quadratum tangentis XS ad quadratum rectæ FG
ut rectam FK ad rectam KL;

denique

ut quadratum tangentis ER ad quadratum rectæ EF,
ita rectam EK ad rectam KL.

His positis, a puncto K excitetur KL perpendicularis ad rectam EK, et fiat recta KL aequalis rectæ KL sive AB; intelligatur jam per punctum K, tanquam verticem, axem autem KE, describi parabole simplex sive Archimedea, cujus rectum latu sit KL, et sit illa parabola KMQ, ad quam excitetur perpendicularares EQ, FP, GO, HN, IM, quæ erunt, ut patet, applicatae paraboles et in directum posite perpendicularibus FX, GY, etc.

Quadratum tangentis ZV, ut jam diximus, est ad quadratum rectæ III,

ut recta HK ad rectam KL;

sed, ut recta HK ad rectam KL, ita, singulis in rectam KL ductis,

rectangulum sub HK in KL ad rectangulum sub HK in KL;

rectangulum vero sub HK in KL, ex natura paraboles Archimedee, aequatur quadrato applicata HN, et rectangulum sub HK in KL aequatur quadrato rectie KL, quum rectæ HK, KL factæ fuerint aequales. Erit igitur

ut quadratum HN ad quadratum KL,

ita quadratum tangentis ZV ad quadratum rectæ III.

ideoque

ut recta HN ad KL , ita tangens ZV ad rectam HH .

Similiter probabimus esse

ut tangentem YT ad rectam GH , ita applicatam GO ad KL :

item

ut tangentem XS ad rectam FG , ita applicatam FP ad KL :

denique

ut tangentem ER ad rectam EF , ita esse applicatam EQ ad KL .

Quum igitur sit

ut tangens ZV ad rectam HH , ita applicata HN ad KL ,

rectangulum sub extremis aequabitur rectangulo sub mediis, ideoque

rectangulum sub NH in HH aequabitur
rectangulo sub KL in tangentem ZV .

Similiter

rectangulum sub OG in GH aequabitur
rectangulo sub KL in tangentem YT ;

item

rectangulum sub PF in FG aequabitur
rectangulo sub KL in tangentem XS ;

denique

rectangulum sub EQ in EF aequabitur
rectangulo sub KL in tangentem ER .

Quid autem pluribus in re proclivi et jam ad methodum Archimedeanam sponte sua vergente immoramus? Per inscriptas enim et circumscriptas in segmento parabolico figuras, rectangula omnia QEF , PFG , OGH , NHI segmentum ipsum parabolicum EQMH designabunt. Omnes autem tangentes ER , XS , YT , ZV , per iteratam secundum nostrae praescripta methodi circumscriptionem, curvam ipsam EXYZA etiam designabunt: ergo segmentum parabolicum EQMH aequaliter rectangulo sub KL in curvam EXA . Datur autem in rectilineis segmentum parabolicum

EQMI quadravit enim parabolam Archimedes (¹), ideoque ipsius segmenta) : ergo rectangulum sub KL in curvam EXA etiam datur. Datur autem recta KL : ergo datur curva EXA et ipsi alia recta potest constitui æqualis. Quod erat demonstrandum.

Si quibusdam tamen hæc demonstratio brevitate nimiè laborare videatur, eam integrum, insistendo vestigiis Archimedis, non gravamur separatim adjungere, ut eam legant et examinent qui superiora non sufficere existimabunt.

Probandum est segmentum parabolicum EQMI rectangulo sub data KL in curvam EXA æquale esse.

Fiat, ex Archimede, segmentum illud parabolicum EQMI æquale rectangulo sub data recta KL in datam rectam β . Si probaverimus rectam β æqualem esse curvæ EXA, constabit propositum.

Aio itaque rectam β curvæ EXA esse æqualem : si enim æqualis non est, erit vel major vel minor.

Sit primo recta β major quam curva EXA, et sit earum excessus, si fieri potest, recta δ .


Ex propositione secundâ hujus, possumus curvæ EXA circumseribere figuram ex portionibus tangentium compositam, que superet curvam intervallo minore rectâ δ . Fiat igitur illa circumscriptio et in figura separata (*fig. 125*), quam etiam quintam romano charactere notavimus, circumscripta illa constet ex portionibus tangentium ER, XS, YT, ZV.

Circumscripta illa, ex prædemonstratis, est major curvâ EXA : sed et recta β posita est major eâdem curvâ : quum ergo circumscripta superet curvam minore intervallo quam recta β superet eamdem curvam, ergo circumscripta minor est rectâ β . Rectangulum itaque sub recta KL in circumscriptam est minus rectangulo sub KL in rectam β ; at rectangulum sub KL in β factum est æquale segmento parabolico EQMI : ergo rectangulum sub KL in circumscriptam est minus dicto segmento parabolico EQMI.

(1) ARCHIMÈDE, *Quadratura parabolæ*, prop. 17; édition Heiberg, vol. II, page 334.

Probavimus autem rectangulum sub KL in portionem tangentis ER aequari rectangulo sub QE in EF; item rectangulum sub KL in XS aequari rectangulo sub PF in FG; item rectangulum sub KL in YT aequari rectangulo sub OG in GH; denique rectangulum sub KL in ZV

Fig. 15 (V).



equari rectangulo sub NH in HI : ergo rectangulum sub KL in totam circumscriptam est aequale summae rectangulorum sub QE in EF, sub PF in FG, sub OG in GH et sub NH in HI. Si autem in rectas FP, GO, HN, IM (que sensim decessunt quo propius accedunt ad verticem parabolas) continuatas demittantur perpendiculares (seu parallela basi) a punctis Q, P, O, N rectae $Q\gamma$, $P\theta$, $O\lambda$, $N\varphi$, patet

rectangulum QEF	aequale esse	rectangulo sub QE in EF;
item rectangulum 9F	aequari	rectangulo sub PF in FG;
rectangulum 7G	aequari	rectangulo sub OG in GH;
denique rectangulum 9H	aequari	rectangulo sub NH in HI.

Ergo rectangulum sub KL in circumscriptam est æquale rectangulis γE, δF, λG, ςH.

Sed probavimus rectangulum sub KL in circumscriptam esse minus segmento parabolico EQMI : ergo summa rectangularium γE , θF , λG , ζH erit minor dicto segmento parabolico EQMI. Quod est absurdum : illa enim rectangularia constituant figuram ex rectangularibus compositam.


et segmento parabolico, ut patet, circumscriptam, ideoque ipso segmento majorem.

Recta itaque β non est major curvæ EXA; sed neque minorem esse probabimus.

Sit enim recta β minor curvæ EXA, si fieri potest, et curva superet rectam β intervallo δ .

Circumseribatur in figura separata (fig. 126), quam etiam quin-

Fig. 126. ($\sigma\chi\mu\alpha\zeta$).



tam charactere graeco notavimus, figura constans ex portionibus tangentium curvæ EXA minor, sed quam tamen ipsa curva superet intervallo minore ipso δ ; et sit illa figura constans ex portionibus tangentium AR, XS, ZT, AV.

Quum itaque curva sit major β intervallo δ , et eadem curva superet circumscriptam intervallo minore ipso δ , ergo circumscripta erit major recta β , ideoque rectangulum sub KL in circumscriptam erit majus segmento parabolico EQML.

Sed rectangulum sub KL in circumscriptam aequatur, ex praedemonstratis, rectangulis sub PF in FE, sub OG in GF, sub NH in HG et sub MI in HI : est enim

ut XR ad FE, ita FP ad KL,
ideoque

rectangulum sub KL in XR aequatur rectangulo sub PF in FE,
et sic de reliquis.

Quam igitur rectangulum sub KL in circumscriptam sit majus segmento parabolico EQMI, ergo summa rectangulorum, sub PF in FE, sub OG in GF, sub NH in HG et sub MI in HI, est major dicto segmento parabolico. Sed omnia illa rectangula, ductis perpendicularibus (seu basi parallelis) rectis $P\gamma$, $O\theta$, $N\lambda$, $M\varphi$, quae omnes cadent in applicatas intra parabolen (prout enim applicatae magis distant a vertice, eo magis semper augentur), erunt aequalia rectangulis PE, OF, NG, MH; ergo summa omnium illorum rectangulorum, PE, OF, NG, MH, erit major segmento parabolico. Quod est absurdum: rectangula enim illa, PE, OF, NG, MH, componunt figuram ex rectangulis compositam et ipsi segmento parabolico inscriptam, ideoque ipso minorem.

Recta itaque β non est minor curvæ EXA: quum igitur nec sit major, nec minor, erit ipsi curvæ aequalis. Quod prolixius, ut omnis removatur scrupulus, fuit demonstrandum.

EX IAM DEMONSTRATIS patet eadem facilitate demonstrari posse segmentum parabolicum quodvis EQPF, a priore abscissum, rectangulo sub data KL in curvam EX aequale esse; ideoque, si detur in basi quodvis punctum, ut F, quum ex Archimede segmentum parabolicum EQPF in rectilineis detur, dari etiam et rectangulum sub KL data in portionem curvæ EX; datur autem recta KL: ergo et curva EX. Dato itaque quovis puncto in base, ut F, dari portionem curvæ ipsi oppositam, et rectam posse assignari huic aequalem, manifestum est.


NEC MOVEAT, ad rectam illam curvæ EXA aequalem inveniendam, construendam videri parabolen simplicem, quo easu problema solidum evaderet. Qnum enim supponatur ad veritatem tantum inquirendam et demonstrationem rite conficiendam paraboles illius descriptio, nihil vetat quominus calculum ipsum, dissimulatà illà imaginarià paraboles descriptione, per rectas et circulos et expediamus et exhibeamus. Is autem calculus, nisi fallor, talis est:

Esto in figura sexta (fig. 127) curva parabolica DAC, ejus naturæ ut cubi applicatarum DB et NM sint inter se ut quadrata portionum axis BA et AM; dentur autem altitudo AB et semibasis BD, aut

tota DBC : Aio dari rectam curvæ DAC aequalem (quod jam probatum est) in calculo vere geometrico.

Sit rectum istius paraboles latus AO , quam datam esse ex datis axe et applicatâ, ex supra dictis, constat. A recta AO auferatur nona ipsius pars EO ; reliqua vero AE fiat aequalis recta YK , cui in directum ponatur KX aequalis semibasi (seu applicatæ) DB . Super recta YX tanquam diametro describatur semicirculus YTX et, recta YK bisectâ in puncto R , excitetur perpendicularis RT , semicirculum secans in T .

Fig. 127 (6).



Rectæ RT fiat aequalis recta RV , et super recta VX tanquam diametro describatur semicirculus VQX , ad ejus circumferentiam a puncto R excitetur perpendicularis RQ . Super rectis TR , RQ describantur semicirculi TPR , RGQ , et ipsis applicentur rectæ TP , RG , quæ singulæ sint ipsis RY aequales. Junctis autem rectis RP , QG , aio rationem curvæ parabolice DAC ad basim DBC esse eamdem quæ est dupli quadrati rectæ QG ad triplum quadratum rectæ RP , ideoque esse datam.

Fiat itaque ut triplum quadratum rectæ RP ad duplum quadratum rectæ QG , ita recta DC ad rectam HH ; recta illa HH , quæ data est ex constructione, aequalis erit curvæ parabolice DAC .


Quod si cum praecedente demonstratione non conveniat, ab ipsa erit emendandum.

Si HEC NON SUFFICIANT ad obtainendum a geometris ut nostra haec curva

parabolica inter admiranda Geometriae colloctetur, illud fortasse ab ipsis quæ mox sequentur impetrabunt. Quid enim mirabilius quam ex una hac curva derivari et formari alias numero infinitas, non solum ab ipsa, sed inter se, specie differentes, quæ tamen singulæ rectis datis æquales esse demonstrentur? Propositio generalis hæc est :

Sit, in septima figura (fig. 128), curva nostra parabolica CMA, cujus altitudo AB, semibasis CB, et ab ea curva formentur aliae in infinitum

Fig. 128 (7).



hac ratione ut, ductis perpendicularibus ad basim rectis DMNL, EKHI utcumque, secantibus curvam in punctis M, K, nova curva CNIG, ex hac formanda, sit ejus nature ut recta DN sit semper aequalis portioni prioris curvae, nempe CM, ipsam respicienti; item recta EI sit aequalis portioni prioris curvae CMK et sic in omnibus aliis quibuslibet perpendicularibus : hac nova curva CNIG erit diversæ a priore speciei⁽¹⁾.

Formetur pariter ab ipsâ tertia curva CLHF, in qua rectæ DL, EH sint semper aequales portionibus curvis CN et CNI secundæ curvæ; et a tertia pari ratione formetur quarta, a quarta quinta, a quinta sexta, et eo progrediantur in infinitum ordine.

Aio omnes istas curvas CNIG, CLHF et reliquas in infinitum, perinde ac primam parabolicam CMKA, rectis datis aequales esse.

Notandum autem istas omnes in infinitum curvas esse pure geom-

(1) Fermat n'a pas reconnu que, loin d'être différentes de la parabole primitive, toutes les courbes qui en sont ainsi dérivées successivement peuvent lui être superposées à la suite d'une simple translation.


trieas, nec in illis itaque ad legem illam et ordinem naturæ de quibus initio hujus Dissertationis locuti sumus recurrendum. Licet enim rectæ DN et EI curvis CM et CMK supponantur æquales, eadem tamen ipsæ non tam suppositæ sunt quam ex prædictis demonstratae esse pariter rectis æquales : dato quippe quolibet puncto D, quum ex præcedentibus detur recta æqualis portioni curvæ CM, ergo recta DN, quæ curvæ CM ex constructione ponitur æqualis, ut recta vere data, non ut æqualis curvæ, considerari debet ; et sic de reliquis. Curva igitur supra descripta CNIG vere geometrica est ; quam postquam æqualem esse rectæ datae demonstraverimus, sequetur tertiam curvam ab ea formandam, nempe CLHF, esse quoque pure geometricam, et sic omnes alias in infinitum.

Demonstratio difficilis non erit, si prius præmiserimus generalem, qua huic operi omnino inservit, propositionem :

PROPOSITIO VI.

Esto, in figura octava (fig. 129), qualibet curva, ejusdem cum præcedentibus naturæ, ONR, cuius vertex O, axis vel applicata OVI (eadem

Fig. 129 (8).



enim semper est demonstratio) ; et ab ea formetur alia curva OAE, cuius ea sit proprietas ut applicata sint æquales portionibus abscissis a priore curva : exempli gratia, applicata VA sit æqualis curvæ ON, applicata IE sit æqualis curvæ OR, et sic de reliquis. Ad datum punctum, in nova hac curva, ducetur tangens hoc pacto : sit datum punctum E; ducatur appli-

cata EI, secans priorem curvam in R; ducatur recta RC tangens in dicto puncto R priorem curvam et occurrens axi in puncto C; fiat

ut RC ad CI, ita recta IE ad rectam IB,

et jungatur EB : Aio rectam EB tangere novam curvam EAO in puncto E.

Sumpto enim quovis puncto in axe, ut V, et ductâ applicatâ VA, quae secet priorem curvam in N, tangentem RC in S, secundam curvam in A, rectam vero EB in Y, si probaverimus rectam VY semper esse majorem applicatâ VA, recta EB non secabit novam curvam a parte verticis.

Hoc autem facillime probamus : Recta VA est æqualis curvæ ON sive differentiae inter curvas OR, NR; at recta RS est minor curvæ RN, per consequentiam primæ propositionis : ergo differentia inter curvam OR et rectam RS est major differentiæ inter eamdem curvam OR et curvam RN. Sed recta VY est æqualis differentiae inter curvam OR et rectam RS, *ut mox probabimus* : ergo recta VY, occurrens rectæ EB, erit major rectâ VA, occurrente curvæ OAE. Unde patet omnia puncta rectæ EB versus verticem esse extra curvam, ideoque recta EB curvam ab ea parte non secabit.

Imo nec inferius : Sumatur enim quodvis punctum, ut H, a quo ducatur applicata HZ, secans priorem curvam in D, tangentem RC productam in F, secundam curvam in Z, et rectam EB productam in Q. Si probemus rectam HQ, in quoenamque casu, majorem esse rectâ HZ, patebit omnia puncta rectæ EB, etiam inferius sumpta, extra curvam jacere, unde patebit dictam rectam EB tangere secundam curvam in dicto puncto E.

Recta HZ est æqualis, ex constructione, curvæ OD, hoc est summae curvarum OR, RD; quum autem recta RF sit portio tangentis RC inferioris sumpta, erit, ex consecratio primæ hujus, recta RF major curvæ RD, ideoque summa curvæ OR et rectæ RF erit major summa ejusdem curvæ OR et curvæ RD. Summa autem curvæ OR et rectæ RF est æqualis, *ut mox probabimus*, rectæ HQ; summa vero curvarum OR, RD est æqualis rectæ HZ, ex constructione : ergo recta HQ semper

et in omni casu major erit applicatæ HZ, ideoque recta EB in dicto puncto E tanget secundam curvam.

PROBANDUM autem reliquimus differentiam curvæ OR et rectæ RS aequari rectæ VY.

Ducatur recta EM parallela axi et occurrat rectæ VY productæ in M.
Ex constructione est

$$\text{ut EI ad IB, ita RC ad CI;}$$

sed

$$\text{ut EI ad IB, ita YV ad VB, et ita YM ad ME;}$$

$$\text{ut autem RC ad CI, ita RS ad VI;}$$

ergo

$$\text{ut YM ad ME, ita RS ad VI.}$$

Sunt autem rectæ ME, VI aequales, propter parallelas : ergo rectæ YM, RS erunt aequales. Sunt autem aequales etiam rectæ EI, VM : ergo differentia inter rectas EI et MY erit recta VY. Sed recta EI, ex constructione, aequatur curvæ OR : ergo differentia inter curvam OR et rectam MY (sive ipsi aequali RS) aequabitur rectæ VY. Quod primo erat probandum.

Nec dissimili ratiocinio procedet demonstratio infra applicatam EI : Dicità enim recta EP parallela axi, probabimus rectam QP aequalem esse rectæ RF.

Est enim

$$\text{ut EI ad IB, hoc est QH ad HH, hoc est QP ad PE,}$$


$$\text{ita recta RC ad CI, hoc est RF ad HH;}$$

sunt autem aequales PE, HH : ergo et rectæ QP, RF. Recta autem HQ aequatur rectis HP, PQ, quarum prior HP aequatur rectæ HE sive curvæ OR, posterior autem PQ aequatur, ex demonstratis, rectæ RF : ergo summa curva OR et rectæ RF est aequalis rectæ HQ. Quod secundo loco fuit probandum.

Patet itaque rectam EB in puncto E secundam curvam tangere, quod erat demonstrandum.

SIT IAM (¹), in nona figura (fig. 130), curva nostra parabolica GKA, cuius altitudo AE, semibasis GE, rectum latus AD, cujus nona pars, ut supra, sit CD, et recta AC bifariam secetur in B. A priori haec curvā formetur alia, versus punctum G, quae sit GNS, occurrens axi prioris in S, et nova hujus curvæ proprietas haec sit ut, sumpto quovis puncto,

Fig. 130 (9).



ut F, et erectā perpendiculari FKN occurrente duabus curvis in K et N, recta FN sit semper æqualis curvæ prioris portioni GK. Ducatur parallela basi KM, et ad idem punctum K ducatur recta TKH tangens priorem et occurrens axi in T et basi in H; per punctum vero N, in secunda curva, ducatur tangens RNXI occurrens basi in I, et a punctis quibuslibet, in ea ex utraque parte sumptis, ut R et X, demittantur in basim perpendiculares XY et RV.

Ex praecedentibus patet quadratum tangentis KT in priore curva ad quadratum FE, sive

quadratum KL ad quadratum FV esse semper
ut rectam FE, una cum recta AB, ad ipsam AB;
sed

ut quadratum KT ad quadratum FE sive ad quadratum KM,
ita quadratum KH ad quadratum HF (propter parallelas) :

(¹) Ici commence la démonstration d'un nouveau lemme qui devrait être compté comme proposition VII, ce qui figure ci-après sous ce dernier titre n'étant, en fait, que la démonstration ajournée de la proposition V (page 227), dont le numérotage a été omis.

ergo

quadratum KH est ad quadratum HF ut recta FE, una cum AB, ad AB.

Ut autem quadratum KH ad quadratum HF,

ita, ex praecedente propositione,

quadratum rectae FN ad quadratum rectae FI :

quum enim latera, ex vi illius propositionis, sint proportionalia, erunt
proportionalia et quadrata. Ergo

quadratum NF ad quadratum FI est ut recta FE, una cum AB, ad AB,

et componendo, quadrata duo NF et FI, sive unicum

quadratum NI erit ad quadratum FI ut FE, una cum AB bis, ad AB.

Sed

ut quadratum NI ad quadratum FI,

ita quadratum RN ad quadratum rectae FV ex una parte,

et ita quadratum rectae NX ad quadratum rectae FY ex altera :

ergo, sumpto quovis puncto in secunda hæc curva, ut N, erit semper

ut quadratum portionis tangentis ad illud punctum ductæ ex alterutra parte

ad quadratum portionis basis ipsi oppositæ,

ita summa rectæ FE, una cum AB bis, ad AB.

Si igitur basi GE ponatur in directum recta EO rectæ AB dupla, et ad punctum O erigatur perpendicularis OP ipsi AB æqualis, erit semper
ut quadratum portionis NR, in hæc secunda curva, ad quadratum portionis basis FV, vel ut quadratum portionis tangentis NX ad quadratum portionis basis FY, ita recta FO ad rectam OP.

His ita se habentibus, patet cæteras in infinitum curvas, modo quem supra indicavimus describendas, ejus esse naturæ ut :

In tertia, verbi gratia, quadratum portionis tangentis ad quadratum portionis basis ipsi oppositæ sit ut portio basis FE initium sumens a puncto F, in quo cadit perpendicularis a puncto contactū in basim demissa, una cum recta AB ter sumplâ, ad ipsam AB;

In quarta curva, erit ut quadratum portionis tangentis ad quadratum portionis basis ipsi oppositae ut recta FE, una cum AB *quater* sumptā, ad ipsam AB;

Et sic de reliquis in infinitum.


Eadem enim semper demonstratio, ut evidens est, in omnibus casibus locum habet.

Nec difficilis, hoc supposito, ad theorema generale erit aditus.

PROPOSITION VII.

Esto, in figura decima (*fig. 131*), curva nostra parabolica EA, cuius axis AI, semibasis IE. Ab ea formetur secunda curva EXYZ θ , cuius ea

Fig. 13c (top).



sit natura, ut supra diximus, ut quævis applicata EX sit æqualis portioni prioris curvæ ab applicata illa, seu mavis vocare perpendiculari-
tarem, abscisse. Dividatur basis in quotlibet partes æquales EF, FG,
GH, HI, et ducantur a punctis F, G, H perpendicularares secantes novam
hanc secundam curvam in punctis X, Y, Z. Sit prioris curva rectum
latus AD, a quo absindatur nona pars CD, et reliqua AC bisectetur
in B. Rectæ AB bis sumptæ fiat æqualis rectæ IK que sit in directum
basi, et ad punctum K erigatur perpendicularis KL æqualis rectæ AB.

Per punctum K et axem KE intelligatur describi parabole simplex (sive Archimedea), cuius rectum latus KL, et sit illa parabola KMOQ. A punctis E, F, G, H, I ducantur perpendiculares ad axem et occurrentes hunc parabolae in punctis Q, P, O, N, M.

Ex corollario praecedentis, quum curva EX0 sit secunda curva a priore derivata seu formata eà ratione quam jam saepius explicimus, sequitur, sumpto in ea quolibet puncto, ut Y, et ductâ portione tangentis YT, esse

ut quadratum YT ad quadratum GH, ita rectam KG ad rectam KL.

Sed, ut recta GK ad rectam KL, ita, singulis in rectam KL ductis,

rectangulum GKL ad quadratum KL;

ex natura autem parabolae simplicis, rectangulum GKL aequaliter quadrato applicatae GO : ergo

quadratum YT est ad quadratum GH ut quadratum GO ad quadratum KL,

ideoque

ut recta YT ad rectam GH, ita recta GO ad rectam KL.

Rectangulum itaque sub extremis aequaliter rectangulo sub mediis : rectangulum ergo sub GO in GH aequaliter rectangulo sub KL in YT.

Si igitur ducantur aliae tangentes ER, XS et ZV, occurrentes perpendicularibus in punctis R, S, V, probabitur similiter

rectangulum sub QE in EF aequari rectangulo sub KL in ER;

item

rectangulum sub PF in FG aequari rectangulo sub KL in XS;

et sic de reliquis in infinitum.

Unde tandem, per abductionem ad methodum Archimedeanum pari quod, in quarta propositione hujus, indicavimus artificio, conficietur et concludetur segmentum parabolicum EQMI aequaliter rectangulo sub


KL in secundam curvam EX0; sicut et singula segmenta parabolica, EQPF verbi gratia, rectangulo sub KL in portionem curvae EX, vel segmentum EQOG rectangulo sub KL in portionem curvae EXY, et sic in infinitum.

Dantur antem in rectilineis haec omnia segmenta parabolica, ex vi quadraturae parabolas ab Archimede demonstratae, et datur etiam recta KL : ergo dantur tam tota secunda curva EX0 quam ipsius portiones EX, EY etc., per rectas perpendiculares ad puncta F, G <etc. > data abscissæ.

Ad tertiae curvae cum rectâ datâ aequalitatem, similis fiet construc-
tio, nisi quod recta IK ponetur *tripla* rectæ AB; in quarta curva, eadem
IK ponetur *quadruplicata* rectæ AB, et tandem generalis inter omnes istas
in infinitum curvas a priore derivandas ita statuetur ratio : erunt
nempe singulæ inter se ut segmenta parabolica ejusdem parabolas et
ejusdem altitudinis, quæ a vertice parabolas distabunt per rectum
latus toties sumptum quotæ erunt in ordine curvae inter se compa-
randæ.

Exempli gratia, sit, in undecima figura (*fig. 132*), curva nostra

Fig. 132. v. 11)



parabolica EMA, cuius axis AF, semibasis EF, rectum latus AD, a quo
deemptâ nonâ parte CD, reliqua AC bisecetur in B; et a primâ illâ curvâ
formetur secunda EOS ejus naturæ ut, sumpto quolibet pnneto in

base N, recta NO, perpendicularis ad basim et oecurrentis curvis in M et O, sit æqualis portioni prioris curvæ EM. A secunda formetur tertia EVR, in qua recta NV sit æqualis portioni secundæ curvæ EO; item a tertia EVR formetur quarta EXL, in qua recta NX sit æqualis portioni tertie curvæ EV. Exponatur separatis parabole simplex sive Archimedea, cujus axis infinitus GKQY, vertex G, rectum latus GH æquale rectæ AB. Quæritur ratio, verbi gratia, quartæ curvæ EXL ad primam EMA.

Quia prior ex ipsis est quarta ordine, ab axe abscindenda est GY quadrupla recti lateris GH, deinde ponenda ipsi in directum recta YT æqualis semibasi EF, et ducendæ applicatae rectæ YT, $\theta\lambda$. Quia vero posterior ex duabus comparandis est prima ordine, abscindenda est ab axe recta GK recto lateri semel tantum æqualis, deinde ipsi ponenda in directum recta KQ semibasi etiam EF æqualis, et ducendæ applicatae KL, QP.

Erit, ex demonstratis et canone generali ab illis deducto, ut segmentum parabolicum YT λ ad segmentum parabolicum KIPQ, ita quarta curva EXL ad primam EMA. Sed ratio segmentorum paraboliorum inter se data est, ex Archimedæ: ergo et ratio curvarum inter se data erit. Data est autem prima, ex demonstratis: datur igitur et quarta, et ipsi recta data æqualis assignari potest, et perpetua illa ratio, remotâ, si libet, parabolâ, ad phrasim geometricam ope regulæ tantum et circini accommodari.

Quod autem de totis jam probatum et in canonem deductum est, idem de portionibus illarum curvarum inter se comparandis contingere, beneficio segmentorum paraboliorum portiones semibasis ipsis curvarum portionibus oppositas pro altitudine habentium, quis non videt?


Num autem nec de solidis ex dictis in infinitum curvis conficiendis, nec de superficiebus ipsorum curvis, nec de centris gravitatum aut linearum istarum aut dictorum solidorum aut superficierum curvarum, adjungimus, quum methodi hac de re generales a summis et insignibus

geometris (¹) jam vulgatae ista omnia, post cognitam specificam curvæ datae proprietatem, ignorari non sinant, licet in multis casibus propriam ab unoquoque adjungi operi industriam non inutile futurum existimemus.

Sed antequam manum de tabula tollam, succurrat examinanda sequens propositio :

Sit, in figura duodecima (fig. 133), curva nostra parabolica COA, cuius vertex A, axis AB, semibasis CB. Ab ea formentur aliae curvæ infinitæ, modo quem jam explicauimus, non ex parte baseos ut supra, sed ex

Fig. 133 (12).



parte verticis. Sint illæ curvæ a prima effingenda ALF, AGE etc. in infinitum eà conditione ut, sumpto quovis puncto in axe D et ductâ ad axem perpendiculari DOI secante curvas in punctis O, I, G, recta DI sit in secunda curva semper aequalis portioni primæ curvæ AO, item recta DG in tertia curva sit semper aequalis portioni secundæ curvæ AL, et sic in infinitum. Hujusmodi omnes curvæ non solum specie inter se et a prima AOC different, sed etiam ab iis quas ex parte baseos supra effinximus. Quæritur ergo an curvæ illæ omnes ALF, AGE etc., sic in infinitum effingenda, datis rectis an vero alijs curvis sint aequales.

Inquirant illud Geometræ et miraculum augeri experientur : sane, si methodi, quibus utuntur ad dimensionem curvarum, sint generales

(¹) Fermat fait ici allusion aux travaux de Pascal et de Roberval, aussi bien qu'aux siens propres. Quant aux courbes dont il va parler désormais, elles diffèrent bien de la parabole $y^3 = ax^2$ (développée de la parabole ordinaire), mais elles peuvent encore toutes être superposées à une seule d'entre elles par une simple translation. En tout cas, la rectification de cette nouvelle courbe, qui est la développée de l'hyperbole équilatère, appartient sans conteste à Fermat.

et sufficienes, quod ipsis affirmantibus in dubium revocare non ausim, primo statim obtutu rem factam habebunt et a labore superfluo geometram jam fatigatum liberabunt.

Si quid antem in superioribus demonstrationibus concisum minime invenerint, id aut suppleant rogo, aut condonent.

— — — — —

APPENDIX AD DISSERTATIONEM


DE LINEARUM CURVARUM CUM LINEIS RECTIS COMPARATIONE.

Ut ultime, quam in Dissertatione proposuimus, quæstioni satisfiat, premittenda videntur propositiones sequentes :

PROPOSITIO 4.

Sint, in figura prima (fig. 134), due curvæ AIF, 3Z8, quarum axes AE, 3z sint inter se aequales. Ducantur autem ad axes applicatae quotlibet quæ, in utraque figura, æquidi a vertice intervallo distent.

Fig. 134 (i).



Sint, exempli gratia, applicatae prioris BM, CI, DH, EF; posterioris vero applicatae sint 4T, 5Z, 6g, 78; et sit rectæ AB, quæ designat intervallum applicatae BM a vertice, æqualis recta 43, quæ designat inter-

vallum etiam applicatae $\frac{4}{7}TA$ a vertice. Sit pariter CA aequalis $5\frac{3}{7}$; item DA aequalis $6\frac{3}{7}$; denique EA , quod jam supposueramus, aequalis $7\frac{3}{7}$.

Si singulae ex applicatis sint semper ad abscissas per tangentes ab axe in ratione correlatarum,

hoc est: si, ductis tangentibus ad puncta F, H, I, M ex una parte et ad puncta $8, 9, Z, T$ ex altera, semper contingat ut applicata FE , verbi gratia, sit ad rectam KE , quam tangens FK abscedit ab axe, in eadem ratione quae est applicatae $8\frac{7}{2}$ ad rectam $7\frac{2}{2}$, quam tangens $8\frac{2}{2}$ ab axe pariter abscedit; item applicata DH sit ad abscissam ab axe per tangentem quae dicitur ad punctum H ut applicata $6\frac{9}{2}$ ab abscissam ab axe per tangentem ad punctum 9 dicitur; et sic de reliquis:

atio duas istas curvas $AIE, 3Z8$ esse inter se aequales, imo et similes ideoque easdem, et applicatas unius figuræ applicatis alterius quæ a vertice aequaliter distant esse pariter aequales.

Ductis enim ad puncta H, I, M , in prima figura, portionibus tangentium HO, IN, MR , que occurrant applicatis in punctis O, N, R ; item, ductis portionibus tangentium, in secunda figura, $9V, ZY, TX$, que occurrant applicatis in punctis V, Y, X , ex suppositione

ut FE ad EK (in prima figura), ita est $8\frac{7}{2}$ ad $7\frac{2}{2}$ (in secunda).

Sed anguli ad puncta E et 7 sunt recti: ergo triangula $FEK, 8\frac{7}{2}2$ sunt similia;

ut ergo FK ad KE , ita $8\frac{2}{2}$ ad $7\frac{2}{2}$.

Sed

ut FK ad KE ,

ita (productâ applicatâ DH ad punctum G) recta FG ad rectam DE ,

et

ut $8\frac{2}{2}$ ad $7\frac{2}{2}$,

ita (productâ applicatâ $6\frac{9}{2}$ ad punctum P) recta SP ad $6\frac{7}{2}$:

ergo

ut recta FG ad rectam DE , ita recta SP ad $6\frac{7}{2}$.

Sunt autem rectæ $DE, 6\frac{7}{2}$ aequales, quum rectæ EA et $7\frac{3}{7}$, item rectæ

DA et 63 sint inter se æquales : ergo et portiones tangentium FG, 8P erunt inter se æquales.

Similiter probabimus portionem tangentis HO æqualem esse portioni tangentis gY; item portionem tangentis IN æqualem esse portioni tangentis ZY; denique portionem tangentis MR æqualem esse portioni tangentis TX.

Quum ergo series tangentium in prima figura sit æqualis seriei tangentium in secunda, per abductionem ad impossibile more Archimedeo facile concluditur curvam AIF curvae 3Z8 æqualem esse, quod primo loco fuit probandum; imo et pariter concluditur portiones curvae correlatas esse inter se æquales : portionem nempe FH portioni 8g, portionem curvae III portioni gZ, et sic de reliquis.

Superest probandum applicatas pariter unius figuræ applicatis alterius esse æquales.

Quum, ex suppositione, applicatae sint semper ad abscissas ab axe per tangentes in eadem utrobique ratione, ergo anguli GFE, P87, qui fiunt ab intersectione tangentium et applicatarum, erunt inter se æquales; item anguli OHD et VgG; item anguli NIC et YZ5; denique anguli RMB et XT4. Quum ergo portiones omnes prioris curvae, FH, HI, IM, MA, sint æquales portionibus posterioris, 8g, gZ, ZT, T3, singulæ singulis, imo et earumdem portionum sit eadem utrobique inclinatio (inclinationem enim curvarum metuntur tangentes, que in utraque figura æquales semper, ut probavimus, conficiunt angulos), ergo curvae AMHF, 3TZg8 non solum sunt inter se æquales, sed etiam similes : unde, si intelligantur altera alteri superponi, congruent omnino, ideoque non solum axes sed applicatas æquales, aut easdem potius, habebunt. Quod secundo loco fuit demonstrandum.

PROPOSITIO II.

Sint due, in secunda figura (fig. 135), parabolæ ejusdem naturæ AOD, XIG, quarum axes sint AC, XF, semibases DC, GF, et sit, verbi gratia,

ut cubus DC ad cubum applicatae BO,
ita quadratum CA ad quadratum BA,

et similiter

ut cubus GF ad cubum applicatæ YX,
ita quadratum FX ad quadratum YX

(dicit enim propositio sit generalis, a parabola nostra non discedimus);
sit autem ut axis unius ad semibasem, ita etiam axis alterius ad semibasem, nempe

ut axis CA ad semibasem DC, ita axis XF ad semibasem GF:

Aio duas hancas parolas esse inter se in ratione axium vel semibasium.
hoc est


curvam AOD esse ad curvam XIG ut est axis AC ad axem XF,
vel ut semibasis CD ad semibasem GF:

hae quippe due rationes, ex suppositione, sunt eadem.

Demonstratio est in promptu.

Secetur enim uterque axis in quotlibet partes æquales. Ducas tan-

Fig. 135. — 2).



tum, ad vitandam confusionem et prolixitatem, assumemus: secetur ergo bifariam axis AC in B et axis FX in Y et, ductis applicatis BO, YI, ducantur ad puncta D, O tangentes DN, OM, quarum prior occurrat applicatae BO in puncto E, posterior vero rectæ AV, applicatis parallelae, in puncto V; item, in altera figura, ducantur ad puncta G, I tangentes GK, IS, occurrentes applicatae YI et ipsi parallelae XR in punctis H, R.

Ex suppositione est

ut DC ad CA, ita GF ad FX;

sed, ex natura istius parabolas,

recta CA est ad CN abscissam per tangentem ut 2 ad 3;

item

recta FX est etiam ad rectam FK per tangentem abscissam ut 2 ad 3;

ergo, ex aequo, est

ut DC ad CN, ita GF ad FK.

Sunt ergo aequiangula triangula DNC, GKF; ergo

ut DN ad NC, ita GK ad KE.

Sed

ut DN ad NC, ita DE ad CB,

et

ut GK ad KE, ita GH ad FY;

ergo

ut DE ad CB, ita GH ad FY.

Similiter probabitur esse

ut OV ad BA, ita IR ad XY.

Quum ergo portiones axium, AB, BC ex una parte et XY, YF ex altera, sint inter se aequales, ergo

ut omnes tangentium portiones DE, OV ad totum axem AC,

ita omnes tangentium portiones GH, IR ad totum axem NF.

Omnis autem portio tangentium DE et OV et plures, si opus sit, beneficio abductionis ad impossibile, ut jam saepius et indicatum et probatum est, designant totam curvam DOA; item omnes portiones tangentium GH, IR et plures etiam, si opus sit, designant totam curvam GIX; ergo

ut curva DOA ad axem AC, ita curva GIX ad axem NF,

et, vicissim et convertendo, erit

axis AC ad axem XF sive basis DC (ex suppositione) ad basim GF
ut curva DOA ad curvam GIX.

Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO III.


*Esto, in tertia figura (fig. 136), curva AO, ejus axis AC, basis CO,
et ab ea intelligatur formari alia curva ejusdem et axis et verticis, in
qua applicatae sint semper in ratione applicatarum prioris curva: sit
nempe*

ut basis CO ad basim CV,

ita applicata BP prioris curvae ad applicatam BR posterioris curvae
et ita applicata DE ad applicatam DN.

et sic in infinitum; si ad punctum quodlibet prioris curvae, ut O, duca-
tur tangens OH cum axe conceniens in punto H, et continuetur CO donec
occurrat secundae curvae in V, aio rectam, que puncta V et H conjungit,
tangere secundam curvam, et semper contingere ut tangentes correlatae
in utraque curva ad idem punctum a vi occurrant.

Fig. 136 (3).



Ducantur enim applicatae BPR, DEN, occurrentes curvis in punctis
P, R, E, N et rectis OH, VH productis in punctis Q, S, F, M.

Si probaverimus rectam BS, supra rectam CV ductam, semper majo-
rem esse rectam BR, item rectam DM, inferius ductam, esse etiam sem-
per majorem applicatam DN, patebit rectam MVSH tangere secundam
curvam in puncto V.

Ex constructione

ut CO ad CV, ita est applicata BP ad applicatam BR;

sed, propter parallelas COV, BQS, que secantur a tribus rectis CH, OH, VH ad idem punctum vergentibus, est etiam

ut CO ad CV, ita recta BQ ad rectam BS :

ergo

ut recta BP ad rectam BR, ita est recta BQ ad rectam BS,

et, viceversa,

ut recta BP ad rectam BQ, ita est recta BR ad rectam BS.

Quoniam autem recta OQH tangat priorem curvam in puncto O, recta BQ erit major rectâ BP : ergo etiam recta BS erit major rectâ BR. Quod primo loco fuit probandum.

Nec dissimilis in applicata inferius sumptù erit demonstratio : ex suppositione enim est

ut CO ad CV, ita DE ad DN,

et, propter parallelas, est etiam

ut CO ad CV, ita DF ad DM :

ergo

ut DE ad DN, ita est DF ad DM.

Est autem DE minor DF : ergo et DN ipsâ DM minor erit.


Recta itaque MVSII in puncto V tangit secundam curvam.

Lemma ad id quod sequitur.

Sit, in quarta figura (*fig. 137*), parabole nostra GLA, ejus axis AE, semibasis EFG, tangens GL. Constituatur ad eundem axem AE alia parabola ejusdem naturae FNA, ejus semibasis EF sit potestate *subdupla* prioris semibasis EG, et semper contingat applicatam quamvis, ut NO, applicatio OL ad priorem curvam esse pariter potestate subduplam. Sit rectum prioris GLA parabolæ latus recta AD, ejus noua pars

sit CD, et reliqua AC bisectur in B. Ducatur ad secundam parabolam tangens ad punctum F recta FH, que in eodem puncto H cum axe conueniet, non solum ex vi propositionis praecedentis, sed quia, ex natura

Fig. 137 (4).



istarum parabolarum, in utrâque recta EA est ad rectam EH ut 2 ad 3, ex superius demonstratis.

A10

quadratum FE esse ad quadratum EH
ut est dimidia rectae AB ad rectam EG.

Jam enim, in propositione III Dissertationis, demonstratum est
quadratum GE esse ad quadratum EH ut est recta AB ad rectam EG :
ergo, sumptis antecedentium dimidiis, erit

ut quadratum EF,

quod supponimus esse dimidium quadrati GE,

ad quadratum EH, ita dimidia rectae AB ad rectam GE

Probabimus pariter, si recta FE sit potestate subtripla rectae GE,
hoc est, si quadratum FE sit subtriplo quadrati GE, esse

ut quadratum FE ad quadratum EH,
ita tertiam partem rectae AB ad rectam GE;

et sic de subquadruplo, subquintuplo et reliquis in infinitum.

Quoniam autem, in ratione *subdupla*, probaverimus esse

ut quadratum FE ad quadratum EH, ita dimidiam AB ad rectam GE.

ergo, componendo, erit ut summa quadratorum FE, EH, sive ut unum

quadratum FH ad quadratum EH,

ita dimidia AB una cum GE ad ipsam GE.

Si vero recta EF sit potestate *subtripla* rectæ GE, erit

ut quadratum FH ad quadratum EH,

ita tertia pars AB una cum GE ad ipsam GE.

Si recta EF sit potestate *subquadruplica* rectæ GE, erit

ut quadratum FH ad quadratum EH,

ita quarta pars AB una cum EG ad ipsam EG;


et sic in infinitum et in quacunque applicata idem contingat.

PROPOSITIO IV.

His præmissis, theorema generale haud difficulter detegimus.

Sit, in figura quinta (fig. 138), parabole nostra AC, ejus axis AB, semibasis BC, et ab ea formentur aliæ in infinitum curvæ AD, AE, AF,

Fig. 138 (5).




quarum ea sit proprietas ut, ductâ quâlibet applicatâ BCDEF, recta BD sit semper æqualis priori curvæ CA, recta BE æqualis secundæ curvæ AD, recta BF æqualis tertiae curvæ AE, idque semper in omnibus ad illas curvas applicatis contingat: Alio omnes illas et singulas in infinitum curvas AD, AE, AF etc. esse semper datis lineis rectis æquales, perinde ac curvas quas in Dissertatione, diversâ et dissimili ex parte baseos methodo, construximus.

Theorema generale ita se habet :

Exponatur separatim (fig. 139) eadem parabole O₃M aequalis omnino et similis ipsi AC, cuius ideo axis MN aequalis est axi AB et semi-basis ON semibasi BC (separatim enim, ad vitandam confusionem, figuram construendam duximus). Fiat recta NP rectæ NM potestate dupla, recta NQ ejusdem NM potestate tripla, recta NR ejusdem NM potestate quadruplicata, et sic in infinitum. Manente autem eadem semibasi ON,

Fig. 139 (5).



construantur parabolæ per vertices P, Q, R ejusdem cum parabola O₃M vel AC naturæ, et sint ille O₄P, O₅Q, O₆R etc. Alio parabolæ O₄P curva AD esse aequalem, parabolæ vero O₅Q curva AE esse æqualem, denique parabolæ O₆R curva AF esse aequalē, et sic in infinitum.

Quoniam in nostris parabolis O₄P, O₅Q, O₆R, ductâ applicatâ 23 456, sit semper, ex natura dictarum parabolarum,

ut cubus rectæ ON ad cubum rectæ 4:2;

ita quadratum rectæ sive axis NP ad quadratum P:2;

item

ut cubus ON ad cubum 5:2, ita quadratum NQ ad quadratum Q:2;

denique

ut cubus ON ad cubum 6:2, ita quadratum NR ad quadratum R:2.


patet, ex prædemonstratis in Dissertatione, singulas ex istis parabolis rectis datis aequales esse : ergo, post demonstrationem theorematis

nostri generalis, constabit singulas quoque ex curvis AD, AE, AF rectis datis aequales esse.

Demonstratio autem theorematis generalis hæc est :

Sit rectum parabolas istius latus recta AS (*fig. 138*), a qua si demas nonam partem SY, reliquam biseces in puncto V, et ad puncta C, D, E

Fig. 138 (5).



ducantur tangentes ad novas curvas, CI, DH, EG, quæ occurrant axi in punctis I, H, G.

Ex demonstratis in tertia Dissertationis propositione,

quadratum BC est ad quadratum BI ut recta AV ad rectam BC,

et, componendo,

quadratum CI est ad quadratum BI ut recta AV una cum BC ad BC.

Sed ex propositione VI Dissertationis,

ut est quadratum tangentis CI ad quadratum BI,

ita quadratum rectæ BD se habet ad quadratum rectæ BH,

quam abscindit tangens DH : ergo

ut quadratum BD ad quadratum BH, ita recta AV una cum BC ad BC,

et, componendo,

ut quadratum tangentis DH ad quadratum BH,

ita recta AV una cum BC bis sumptâ ad ipsam BC.

Sed

ut quadratum tangentis DH ad quadratum HB, ita,

ex eadem Dissertationis propositione,

quadratum BE est ad quadratum rectæ BG a tangentे EG abscissa :

ergo

ut quadratum rectæ BE ad quadratum rectæ BG,
ita est recta AV una cum BG bis sumptà ad ipsam BC.

Similiter probabitur, si dueatur ad curvam EA applicata ZTK secans curvam AC in T, et intelligatur ad punctum K ducendi tangens ad curvam AKE, esse pariter

ut quadratum KZ ad quadratum rectæ
quam tangēns per punctum K ducta ab axe abseindit,

ita rectam AV una cum ZT bis sumptà ad ipsam ZT,
et sic semper continget.

Exponatur separatim ad vitandam confusionem eadem curva AKE, quæ sit in figura separata (*fig. 140*) $\beta\gamma\lambda$. Basis $\lambda\delta$ sit itaque æqualis

Fig. 138 (5).





Fig. 140 (5).



basi EB, tangens $\lambda\gamma$ tangentи EG, axis $\delta\beta$ axi BA, abscissa per tangentem ab axe $\delta\gamma$ abscissæ BG, applicata $\nu\varphi$ applicatæ ZK. Ab hac curva $\lambda\gamma\beta$ formetur alia ipsa minor $0\pi\beta$, ea conditione ut applicatae novæ istins curvæ sint semper subduplae potestate applicatarum prioris : verbi gratia, recta $\delta\theta$ sit subdupla potestate rectæ $\delta\lambda$; item applicata $\nu\pi$ sit subdupla potestate rectæ $\nu\varphi$; et sic de reliquis. Ducantur in hac nova curva, tangentes ad puncta $0, \pi$, rectæ $0\gamma, \pi\gamma$.

Ex præcedente tertia propositione patet tangentes $0\gamma, \lambda\gamma$ ad idem punctum γ cum axe concurrere; item tangentes ad puncta φ, π ductas

ad idem etiam punetum, verbi gratia γ , cum axe concurrere, quoniam applicatae utriusque figuræ sint in eadem semper inter se ratione.

Exponatur adhuc separatim (*fig. 139*) parabole ejusdem cum para-

Fig. 139 (5).





Fig. 141 (5).



bolis OM, OP etc. (*fig. 139*) naturæ, cujus axis 98 sit æqualis axi MN sive AB sive $\beta\lambda$, semibasis autem 8 χ sit subdupla potestate semibaseos NO sive BC; et sit illa χ 119, a qua formetur alia 912 ψ , cujus idem sit axis 98, applicata vero 8 ψ sit æqualis curvæ χ 119, item applicata 101112 sit æqualis curvæ 119, et sic de reliquis.

Probandum primo curvas $\theta\pi\beta$ et ψ 129 esse easdem, hoc est, omnino æquales et similes. Quod sic demonstrabitur :

Probavimus

quadratum BE esse ad quadratum BG,

sive quadratum $\beta\delta$ ad quadratum $\delta\gamma$,

ut rectam AV una cum CB bis sumptâ ad rectam CB;

ergo, sumptis antecedentium dimidiis, quoniam posnerimus rectam $\theta\delta$ esse potestate subduplicem rectæ $\beta\lambda$, quadratum rectæ $\theta\delta$ erit dimidium quadrati $\lambda\delta$, ideoque

ut quadratum $\theta\delta$ ad quadratum $\delta\gamma$,

ita dimidia AV una cum CB erit ad ipsam CB.

Similiter probabimus in alia qualibet applicata, ut $\pi\gamma$, esse

quadratum $\pi\gamma$ ad quadratum $\gamma\tau$

ut dimidiâ AV una cum ZT ad ipsam ZT;

et sic de reliquis.

Disquirendum jam an eadem proprietas curvæ $\psi_{12}g$ conveniat.
Quod ita fiet :

In curva $\gamma_{11}g$, ejus semibasis γ_8 est potestate subdupla semiba-

Fig. 138 (5).





Fig. 140 (5).



seos BC et axis $8g$ aequalis axi AB , ex lemma superiori, ductis tangentibus ad puncta γ , ψ rectis γ_2 , ψ_2 ,

quadratum γ_8 est ad quadratum 8φ ut dimidia rectæ AV ad rectam CB ;
recta enim γ_8 est potestate subdupla rectæ CB : ergo, componendo,

$$\begin{aligned} \text{quadratum } \gamma_2 &\text{ est ad quadratum } 8\varphi \\ &\text{ut dimidia } AV \text{ una cum } CB \text{ ad ipsam } CB. \end{aligned}$$

Similiter, si intelligatur recta 9_{10} aequalis rectæ AZ , hoc est si puncta 10 et Z aequaliter a vertice distent,

quadratum tangentis ad punctum 11 ductæ erit ad quadratum abscissæ ab axe
ut dimidia AV una cum recta ZT ad ipsam ZT .

Sed,

$$\text{ut quadratum } \gamma_2 \text{ ad quadratum } 8\varphi, \quad \text{ita},$$

ex propositione VI Dissertationis, esl

quadratum applicatae ψ_8 ad quadratum a tangente abscissæ 8φ ,

(et, similiter,

$$\begin{aligned} \text{ut quadratum tangentis ad punctum } 11 \text{ ductæ} \\ \text{ad quadratum abscissæ ab axe,} \\ \text{ita quadratum applicatae } 12_{10} \end{aligned}$$

ad quadratum abscissæ ab axe per tangentem ad punctum 12 (ductam)):

ergo

ut quadratum ψ_8 ad quadratum 8φ , ita dimidia AV una cum BC ad BC .

Sed in alia figura (fig. 140) probavimus

quadratum applicatae $\theta\delta$ esse ad quadratum abscissæ a tangentे $\theta\gamma$
ut est dimidia ΔV una cum BC ad CB :

ergo, in duabus curvis $\psi_{12}\varphi, \theta\pi\beta$, erit

ut ψ_8 ad abscissam 8τ , ita applicata $\theta\delta$ ad abscissam $\theta\gamma$,

et in omnibus aliis punctis idem semper continget, et eodem modo pro-
babinius nempe applicatam, verbi gratia,

ψ_{13} esse ad abscissam a tangentē ad punctum 12 ducta ut est $\pi\tau$ ad $\gamma\tau$,

et sic de reliquis.

Per primam itaque propositionem hujus Appendix, quum curvæ
 $\psi_{12}\varphi, \theta\pi\beta$ habeant eundem axem, et applicatae sint ad abscissas ab
axe per tangentes utrobique in eadem correlatarum ratione, illæ curvæ
erunt inter se æquales, et ipsæ etiam ipsarum semibases, et omnes

Fig. 138 (5).





Fig. 140 (5).



similiter applicatae a vertice aequidistantes. Ex constructione autem
semibasis ψ_8 est aequalis curva $\chi_{11}\varphi$: ergo curva $\chi_{11}\varphi$ est aequalis
rectæ $\theta\delta$. Recta autem $\theta\delta$ est potestate subdupla rectæ $\theta\lambda$ ex construc-
tione: ergo curva parabolica $\chi_{11}\varphi$ est potestate subdupla rectæ $\theta\lambda$.
Recta autem $\theta\lambda$ est aequalis rectæ BE et recta BE supposita est, in con-
structione curvarum a primaria AC derivatarum, aequalis esse curva
 AD : ergo parabole $\chi_{11}\varphi$ est subdupla potestate curva AD. Sed eadem
curva $\chi_{11}\varphi$ est subdupla potestate parabolæ $O\psi P$: basis enim χ_8 est
facta potestate subdupla baseos BC sive NO , et similiter axis χ_8 sive
 AB sive NM est potestate subduplus axis NP ; quum ergo parabole

$O\dot{4}P$, $\gamma\ddot{1}\dot{1}9$ sint ejusdem naturae et tam axis quam basis paraboles $\gamma\ddot{1}\dot{1}9$ sint potestate subduple axis et baseos paraboles $O\dot{4}P$, ergo et ipsa parabola $\gamma\ddot{1}\dot{1}9$, ex propositione II hujus Appendix, erit subduplicata parabolas $O\dot{4}P$. Quum ergo, ut iam probavimus, eadem parabola $\gamma\ddot{1}\dot{1}9$ sit subduplicata tam parabolas $O\dot{4}P$ quam curva AD, curva AD et ipsa parabola $O\dot{4}P$ erunt inter se aequales. Quod erat demonstrandum.

Nec dissimili, ad probandum curvam AE aequalem esse parabolam $O\dot{5}Q$, intendum artificio.

Quum enim

$$\begin{aligned} &\text{quadratum BE esse ad quadratum BG} \\ &\text{ut est recta AV una cum BC bis sumptu ad ipsam BC} \end{aligned}$$

probatum fuerit, ergo, componendo et ulterius progrediendo, erit

$$\begin{aligned} &\text{quadratum tangentis EG ad quadratum rectae BG} \\ &\text{ut recta AV una cum BC ter sumptu ad ipsam BC.} \end{aligned}$$

Est autem, ex praedemonstratis in sexta propositione Dissertationis,

ut quadratum EG ad quadratum BG, ita quadratum BF
ad quadratum abscissae ab axe per tangentem ad punctum F ductam :

ergo

$$\begin{aligned} &\text{quadratum BF erit ad quadratum illius abscissae} \\ &\text{ut est recta AV una cum BC ter ad BC.} \end{aligned}$$

In reliquis imitabimur omnino et sequemur vestigia demonstrationis

Fig. 139 (5).





Fig. 140 (5).



præcedentis, nisi quod in figura separata (fig. 140), postquam $\lambda\dot{2}$

fuerit facta æqualis ipsi BF, recta $\delta\theta$ fiet subtripla potestate ipsius BF vel $\delta\lambda$, curva $\lambda\beta\beta$ curvæ FA fiet æqualis, curva $\theta\pi\beta$ ejus erit naturæ ut omnes applicatae sequantur rationem basium $\lambda\delta$, $\theta\delta$. In alia autem figura separata (*fig. 141*) in qua curvae $9+1\gamma$ et $9+2\psi$, recta $9+8$ erit æqualis, ut supra, rectæ MN vel AB vel $\beta\delta$, basis vero 8γ fiet subtripla potestate baseos ON vel CB, et fiet $\gamma+19$ parabole ejusdem cum parabolis CFA vel O3M naturæ; a qua quum formabitur curva $\psi+29$, ejus applicatae 8ψ , $10+2$ sint, ut supra, æquales curvis $\gamma+9$, $+19$, probabimus, ut supra, curvam $\beta\pi\theta$ et curvam $9+1\gamma$ esse inter se æquales et similes, hoc est, easdem.

Unde concluditur bases $\theta\delta$ et $\psi+8$ esse æquales, ideoque basim $\psi+8$ sive curvam $9+1\gamma$ esse potestate subtriplam rectæ $\delta\lambda$ sive BF sive curvæ AE; est autem etiam, ex prædemonstratis, parabole $\gamma+19$ subtripla potestate paraboles O5Q : ergo curva AE et parabole O5Q erunt inter se æquales.

Eodem ratiocinio in ulterioribus casibus utemur et generalem nostri theorematis veritatem evinceamus.

Qui autem superiorem Dissertationem et hanc ad ipsam Appendicem accenatus legerint, præcipua methodi nostræ fundamenta statim agnoscunt, et ex eis deduci facillimam curvarum dimensionem comprehendunt.

DE ÆQUATIONUM LOCALIUM
TRANSMUTATIONE ET EMENDATIONE

AD MULTIMODAM

CURVILINEORUM INTEB SE VEL CUM RECTILINEIS COMPARATIONEM,

CUI ANNECTITUR

PROPORTIONIS GEOMETRICE
IN QUADRANDIS INFINITIS PARABOLIS ET HYPERBOLIS

USUS.



In unica paraboles quadratura proportionem geometricam usurpavit Archimedes (¹); in reliquis quantitatum heterogenearum comparationibus, arithmeticæ diuntaxat proportioni sese adstrinxit. An ideo quia proportionem geometricam minus τετραγωνοστοιχον est expertus? An vero quia peculiare ab illa proportione petitum artificium, ad quadrangulum primarium parabolen, ad ulteriores derivari vix potest? Nos certe hujusmodi proportionem quadrationum feracissimam et agnoscimus et experti sumus, et inventionem nostram, quæ eadem omnino methodo et parabolas et hyperbolas quadrat, recentioribus geometris haud illibenter impertimur.

Unico, quod notissimum est, proportionis geometricæ attributo tota hæc methodus innititur; theorema hoc est :

Datâ quicvis proportione geometricâ, cuius termini decrescant in infinitum, est ut differentia terminorum progressionem constituentium ad


(¹) ARCHIMÈDE, *Quadratura paraboles*, prop. 23 et 24.

minorem terminum. ita maximus progressionis terminus ad reliquos omnes in infinitum sumptos.

Hoc posito, proponantur primo hyperbolæ quadrandæ.

Hyperbolæ autem definitius infinitas diversæ speciei curvas, ut DSEF (fig. 142), quarum haec est proprietas ut, positis in quolibet

Fig. 142.



angulo dato RAC ipsarum asymptotis rectis AR, AC, in infinitum, si placet, non secus ac ipsa curva extendendis, et duetis uni asymptotō parallelis rectis quibuslibet GE, HI, ON, MP, RS etc., sit ut potestas quadam recte AH ad potestatem similem rectæ AG, ita potestas rectæ GE, vel similis vel diversa a precedente, ad potestatem ipsi homogeneam rectæ HI. Potestates autem intelligimus, non solum quadrata, cubos, quadratoquadrata etc., quarum exponentes sunt 2, 3, 4 etc., sed etiam latera simplicia, quorum exponens est unitas.

Aio itaque omnes in infinitum hujusmodi hyperbolas, unicà demptâ qua Apolloniana (1) est sive primaria, beneficio proportionis geometricæ, uniformi et perpetua methodo quadrari posse.

Exponatur, si placet, hyperbole ejus ea sit proprietas ut sit semper

ut quadratum rectæ HA ad quadratum rectæ AG,

ita recta GE ad rectam HI,

(1) Le nom de *hyperbole*, comme ceux d'*ellipse* et de *parabole*, n'a pas été adopté avant Apollonius.

1

ut quadratum OA ad quadratum AH, ita recta III ad rectam OX,

etc. Aio spatium infinitum ejus basis GE, et curva ES ex uno latere, ex alio verò asymptotos infinitas GOR, æquari spatio rectilineo dato.

Fingantur termini progressionis geometricæ in infinitum extendi, quorum primus sit AG, secundus AH, tertius AO, etc. in infinitum, et ad sese per approximationem tantum accedant quantum satis sit ut, juxta methodum Archimedeanam, parallelogrammum rectilineum sub GE in GH quadrilineo mixto GHHE aequetur, ut loquitur Diophantus (¹), aut fere aequetur; item, ut priora ex intervallis rectis proportionalium, GH, HO, OM et similia, sint fere inter se aequalia, ut commode per ἀπαγόργησις ἀδύνατον, per circumscriptiones et inscriptiones, Archimedea demonstrandi ratio institui possit : quod semel monuisse sufficiat, ne artificium quibuslibet geometris jam satis notum inculcare saepius et iterare cogamur.

His positis, quum sit

ut AG ad AH, ita AH ad AO, et ita AO ad AM,

erit pariter

ut AG ad AH, ita intervallum GH ad HO, et ita intervallum HO ad OM,

10

Parallelogramnum autem sub EG in GH erit
 ad parallelogramnum sub HI in HO
 ut parallelogramnum sub HI in HO
 ad parallelogramnum sub NO in OM;

quoniam enim ratio parallelogrammi sub GE in GH ad parallelogram-
mum sub HI in HO componatur ex ratione rectae GE ad rectam HI et ex
ratione rectae GH ad rectam HO, sit autem

at GH ad HO, ita AG ad AH,

ut premonimus, ergo ratio parallelogrammi sub EG in GH ad par-

⁽¹⁾ Voir plus haut, page 133, note 2.

leogrammum sub III in HO componitur ex ratione GE ad III et ex ratione AG ad AH. Sed

ut GE ad III, ita, ex constructione, HA quadratum ad quadratum GA,
sive, propter proportionales,

ita recta AO ad rectam GA :

ergo ratio parallelogrammi sub EG in GH ad parallelogrammum sub III in HO componitur ex ratione AO ad AG et AG ad AH. Sed ratio AO ad AH componitur ex illis duabus : ergo parallelogrammum sub GE in GH est ad parallelogrammum sub III in HO ut OA ad HA, sive ut HA ad AG.

Similiter probabitur parallelogrammum sub III in HO esse ad parallelogrammum sub ON in OM ut AO ad HA.

Sed tres rectae quae constituant rationes parallelogramorum, rectae nempe AO, HA, GA, sunt proportionales ex constructione : ergo parallelogramma in infinitum sumpta, sub GE in GH, sub III in HO, sub ON in OM, etc., erunt semper continue proportionalia in ratione rectae HA ad GA. Est igitur, ex theoremate hujus methodi constitutivo,

ut GH, differentia terminorum rationis,

ad minorem terminum GA,

ita primus parallelogramorum progressionis terminus,

hoc est parallelogrammum sub EG in GH,

ad reliqua in infinitum parallelogramma,

hoc est, ex adaequatione Archimedea, ad figuram sub III, asymptoto HR et curva IND in infinitum extendenda, contentam.

Sed ut HG ad GA, ita, sumptu communi latitudine recta GE, parallelogrammum sub GE in GH ad parallelogrammum sub GE in GA : est igitur

ut parallelogrammum sub GE in GH
ad figuram illam infinitam enjus basis III,
ita idem parallelogrammum sub GE in GH
ad parallelogrammum sub GE in GA.

Ergo parallelogrammum sub GE in GA, quod est spatium rectilineum datum, adæquatur figuræ prædictæ; eni si addas parallelogrammum sub GE in GH, quod propter minutissimos $\tau\epsilon\mu\chi\rho\iota\sigma\mu\delta\varsigma$ evanescit et abit in nihilum, superest verissimum et Archimedæ (licet prolixiore) demonstratione facillime firmandum: parallelogrammum AE, in hac hyperbolas specie, aquari figurae sub base GE, asymptoto GR et curva ED in infinitum producenda, contenta.

Nec operosum ad omnes omnino hujusmodi hyperbolas, unâ, ut diximus, demptâ, inventionem extendere. Sit enim ea *alterius*, si placet, *hyperbolas* proprietas,

ut sit GE ad HI ut cubus rectæ HA ad cubum rectæ GA;

et sic de reliquis.

Expositâ ex more infinitâ proportionalium, ut supra, serie, fient proportionalia parallelogramma EH, IO, MN, ut supra, in infinitum: in hoc verò casu, parallelogrammum primum erit ad secundum, secundum ad tertium, etc. ut recta AO ad GA; quod statim compositio proportionum manifestabit. Erit igitur

ut parallelogrammum EH ad figuram, ita recta OG ad GA

et, sumptâ communi latitudine GE,

ita parallelogrammum sub OG in GE ad parallelogrammum sub GE in GA:

est igitur

ut parallelogrammum sub OG in GE ad parallelogrammum sub GE in GA,
ita parallelogrammum sub GE in GH ad figuram,

et, vicissim,

ut parallelogrammum sub OG in GE ad parallelogrammum sub GE in GH,
ita parallelogrammum sub GE in GA ad figuram.

Ut autem

parallelogrammum sub OG in GE ad parallelogrammum sub HG in GE,
ita OG ad GH, sive α ad β , ex adæquatione :

intervalla enim basi proxima facta sunt, ex constructione, fere aequalia inter se. Ergo, in hac hyperbole, parallelogramnum EGA, quod est æquale spatio rectilineo dato, est duplum figuræ sub base GE, asymptoto GR, curva ESD in infinitum producenda, contentæ.

Similis in quibuslibet aliis casibus habebit locum demonstratio, nisi quod in primaria (sive Apolloniana et simplici) hyperbole deficit ea sola ratione methodus, quia in hac parallelogramma EH, IO, NM sunt semper inter se aequalia; atque ideo, quum termini progressionis constitutivi sint inter se æquales, nulla inter eos est differentia quæ totum in hoc negotio conficit mysterium.

Demonstrationem, qua probatur spatia in hyperbole communi parallelogrammis contenta esse semper inter se aequalia, non adjungimus, quum statim per se ipsa se prodat et ex hac unica proprietate, quæ asserit in ea specie esse

$$\text{ut } GE \text{ ad } HE, \quad \text{ita } HA \text{ ad } GA,$$

facillime derivetur.

Eadem ratione parabolæ omnes omnino quadrantur, nec est ulla quæ ab artificio nostra methodi, ut sit in hyperbolis, possit esse immunis.

Unicum in parabole, si libet, primariâ et Apollonianâ adjiciemus exemplum, enjus exemplo reliqua omnes, in quibuslibet in infinitum parabolis, demonstrationes expedientur.

Sit semiparabole primaria AGRC (*fig. 143*), enjus diameter CB, semi-basis AB; sumptis autem applicatis HE, ON, GM etc., sit semper

$$\begin{aligned} &\text{ut quadratum } AB \text{ ad quadratum } HE, \quad \text{ita recta } BC \text{ ad } CE, \\ &\text{et} \end{aligned}$$

$$\text{ut quadratum } HE \text{ ad quadratum } ON, \quad \text{ita recta } CE \text{ ad } CN,$$

et sic in infinitum ex proprietate specifica paraboles Apollonianæ.

Intelligantur, ex more methodi, rectæ BC, EC, NC, MC, HC, etc. in infinitum continue proportionales : erunt etiam, ut superius probatum est, proportionalia parallelogramma AE, IN, OM, GH, etc. in infinitum. Ut cognoscatur ratio parallelogrammi AE ad parallelogrammum IN, recurrendum ex methodo ad compositionem proportionum.

Componitur autem


ratio parallelogrammi AE ad parallelogrammum IN
ex ratione AB ad IE et ex ratione BE ad EN.

Quum autem sit

ut AB quadratum ad IE quadratum, ita BC ad CE,

si inter BC et CE sumatur media proportionalis CV, item inter EC et

Fig. 143.



NC media proportionalis YC, erunt continue proportionales rectae BC,
VC, EC, YC, NC et

ut BC ad EC, ita erit BC quadratum ad VC quadratum
sed

ut BC ad EC, ita quadratum AB ad quadratum EI:

ergo

ut AB quadratum ad EI quadratum,
ita erit BC quadratum ad VC quadratum.

et

ut AB ad IE, ita erit BC ad VC.

Ratio igitur parallelogrammi AE ad parallelogrammum IN compone-
tur

ex ratione BC ad VC, sive VC ad CE, sive EC ad YC,

et ex ratione BE ad EN, sive, ex superius demonstratis (¹), BC ad CE.

(1) Voir plus haut la démonstration pour les hyperboles.

ratio autem que componitur ex his duabus rationibus,

BC nempe ad CE , et CE ad CY

est eadem que ratio BC ad CY : igitur

parallelogramnum AE est ad parallelogramnum IX ut BC ad YC ,

ideoque, ex theoremate methodi constitutivo,

parallelogramnum AE erit ad figuram $IRCHIE$ ut recta BY ad rectam YC ,

ideoque

ut idem parallelogramnum AE ad totam figuram $ARCB$,

ita recta BY ad totam diametrum BC .

Ut autem BY ad totam diametrum BC , ita, sumptâ communâ latitudine AB ,

parallelogramnum sub AB in BY ad parallelogramnum sub AB in BC ,

sive parallelogramnum BD (ductâ AD , diametro parallelâ, occurrente tangentî CD in D): ergo

ut parallelogramnum AE ad totam figuram semiparabolicam $ARCB$,

ita parallelogramnum sub AB in BY ad parallelogramnum BD ,

et, vicissim,

ut parallelogramnum AE ad parallelogramnum sub AB in BY ,

ita figura ad parallelogramnum BD .

Et autem

parallelogramnum AE ad parallelogramnum sub AB in BY ,

ita, propter communem latitudinem,

recta BE ad BY ;

ergo

ut BE ad BY , ita figura ad parallelogramnum $\langle BD \rangle$.

et, convertendo,

ut BY ad BE , ita parallelogramnum BD ad figuram $ARCB$.

Est autem BY ad BE (propter adæqualitatem et sectiones minutissimas, quod rectas BV, VE, EY, intervalla proportionalium representantes, fere inter se supponit aequales) ut 3 ad 2: ergo

parallelogramnum BD ad figuram est ut 3 ad 2,

quæ ratio congruit τετραγωνισμῷ paraboles Archimedeo, licet ab eo geometrica proportio aliâ ratione fuerit usurpata; methodum autem variare et diversam ab Archimede viam sectari necessum habuimus, quia sterilem proportionis geometricæ ad quadrandas cæteras in infinitum parabolæ applicationem deprehensam iri, insistendo vestigiis tanti viri, non dubitamus.


Demonstratio autem et regulæ generales ex nostra methodo fere in omnibus omnino parabolæ statim patebunt: sit enim, ut nullus amplius supersit dubitandi locus, parabolæ ea de qua mentionem fecit *Dissertatio nostra de linearum curvarum cum lineis rectis comparatione* (¹), curva AIGC (fig. 144), cujus basis AB, diameter BC, et sit

ut cubus applicatæ AB ad cubum applicatæ AE,

ita quadratum rectæ BC ad quadratum rectæ EC,

et reliqua ponantur ut supra, series nempe proportionalium rectarum

Fig. 144.



BC, EC, NC, MC, etc., item series proportionalium parallelogrammorum AE, IN, OM, etc. in infinitum.

(¹) Voir plus haut, page 217, ligne 1.

Inter BC et EC sumantur due media proportionales VG, RG; item inter EC et NC sumantur etiam due media proportionales SG, TC.

Constat, ex constructione, quoniam

ratio BC ad CE sit eadem rationi EC ad NC,

fore quoque continue proportionales rectas BC, VG, RG, EC, SG, TC, NC. Est autem

ut AB cubus ad cubum IE, ita BC quadratum ad EC quadratum,
sive recta BC ad rectam NC;

quoniam autem sint, ut supra probavimus, septem continue proportionales, BC, VG, RG, EC, SG, TC, NC, ergo prima, tertia, quinta et septima erunt etiam continue proportionales, ideoque erit

BC ad RC = ut RC ad SG = et = ut SG ad NC :

ut igitur

prima BC ad quartam NC, ita cubus primae BC ad cubum secundae RC.

Sed

ut BC ad NC, ita probavimus esse cubum AB ad cubum IE :
ergo ut cubis AB ad cubum IE, ita cubis BC ad cubum RC,

ideoque

ut AB ad IE, ita BC ad RC.

Quoniam igitur ratio parallelogrammi AE ad parallelogramnum IN componatur

ex ratione AB ad IE = et = ex ratione BE ad EN, sive BC ad EC,
ergo eadem parallelogramorum ratio componetur

ex ratione BC ad RC = et = BC ad EC.

Ut autem

BC, prima proportionalium, ad EC quartam,
ita BC tertia ad TC sextam :

ergo parallelogrammi AE ad parallelogrammum IN ratio componitur

ex ratione BC ad RC et RC ad TC,

hoc est

parallelogrammum AE est ad parallelogrammum IN ut BC ad TC.

Parallelogrammum igitur AE, ex predemonstratis, est ad figuram
IGCE

ut recta BT ad TC,

ideoque

ut parallelogrammum AE ad totam figuram AICB,

ita recta BT ad rectam BC,

sive, sumpta communi latitudine AB,

ita parallelogrammum sub AB in BT ad parallelogrammum sub AB in BC:

et, vicissim et convertendo,

parallelogrammum BD est ad figuram AICB

ut parallelogrammum sub AB in BT ad parallelogrammum sub AB in BE,

sive, propter communem latitudinem AB,

ut recta BT ad rectam BE.

Recta autem BT continet quinque intervalla : TS, SE, ER, RV, VB,
quae inter se, propter nostram methodum logarithmicam, censerunt
aequalia; recta autem BE continet tria ex iis intervallis, nempe ER,
RV, VB : ergo


parallelogrammum BD est ad totam figuram in hoc casu ut 5 ad 3.

CANON vero *universalis* inde nullo negotio elicetur : *potest nempe forc*
semper parallelogrammum BD ad figuram AICB ut aggregatum expo
nentium potestatum applicatae et diametri ad exponentem potestatis appli
catae : ut in hoc exemplo videre est, in quo potestas applicata AB est
cubus, enjus exponens 3; potestas autem diametri est quadratum,
enjus exponens 2 : ergo debet esse, ut jam demonstravimus et per-

petuo constabit, ut summa 3 et 2, hoc est 5, ad 3 exponentem applicata.

In *hyperbolis* autem canon non minori facilitate invenietur universalis : erit enim semper in quaeunque hyperbole, si reurras ad primam figuram (fig. 142), parallelogrammum BG ad figuram in infinitum protensam RGED ut differentia exponentium potestatum applicatae et diametri ad exponentem potestatis applicatae.

Fig. 143.



Sit enim, exempli gratia,

ut cubus HA ad cubum GA, ita quadratum GE ad quadratum HI.

Differentia exponentium cubi et quadrati (haec est 3 et 2) erit 1; exponentis autem potestatis applicatae, hoc est quadrati, est 2 : ergo, in hoc casu, parallelogrammum erit ad figuram ut 1 ad 2.

Quod attinet ad centra gravitatis et tangentes tam hyperbolarum quam parabolarum, inventio dudum, ex nostra *Methodo de maximis et minimis* derivata, geometris recentioribus innotuit, hoc est ante viginti, plus minus, annos (¹); quod celebriores totius Galliae mathematici non gravabuntur fortasse exteris indicare, ne hac de re in posterum dubitent.

Ex supradicuis mirum quantum opus tetragonisticum consequatur accessionem : infinitæ enim exinde figuræ, curvis contentæ de quibus

(¹) Voir plus haut, page 171, note 4.

nihil adhuc nec veteribus nec novis geometris in mentem venit, facilimam sortiuntur quadraturam; quod in quasdam regulas breviter contrahemus.

Sit curva cuius proprietas det aequationem sequentem :

$$Bq. = 4q. \quad \text{aequale} \quad Eq.$$

(apparet autem statim hanc curvam esse circulum); certum est potestatem ignotam, $Eq.$, posse reduci, per applicationem seu parabolismum, ad latus.

Possimus enim supponere

$$Eq. \quad \text{aequari} \quad B \text{ in } U,$$

quoniam sit liberum quantitatem ignotam U , in notam B ductam, aquare quadrato E etiam ignota.

Hoc posito,

$$Bq. = 4q. \quad \text{aequabitur} \quad B \text{ in } U;$$

homogenium autem B in U ex tot quantitatibus homogeneis componi potest quot sint in parte aequationis correlativæ; iisdemque signis hujusmodi homogena debent notari. Supponatur igitur

$$B \text{ in } U \quad \text{aequari} \quad B \text{ in } I + B \text{ in } E;$$

ex more enim Vietæo, vocales semper pro quantitatibus ignotis sumimus; ergo

$$Bq. = 4q. \quad \text{aequatur} \quad B \text{ in } I + B \text{ in } E.$$

Aequentur singula membra partis unius singulis membris partis alterius : sit nempe

$$Bq. \quad \text{aequale} \quad B \text{ in } I;$$

ergo dabitur

$$I \quad \text{aequalis} \quad B.$$

Aequetur deinde

$$= 4q., \quad = B \text{ in } E,$$

hoc est

$$4q., \quad B \text{ in } E;$$

erit extreum punctum rectae Y ad parabolam primariam. Omnia igitur in hoc casu ad quadratum reduci possunt, ideoque, si omnia E quadrata ad rectam lineam datam applies, fiet solidum rectilineum datum et cognitum (¹).

Proponatur deinde curva cuius haec sit aequatio :

$$4c. + B \text{ in } 4q. \quad \text{æqualis} \quad Ee.$$

$Ee.$ applicetur ad planum datum et sit, verbi gratia, æqualis $Bq.$ in U . Quia autem recta U ex pluribus quantitatibus ignotis componi potest, sit

$$4c. + B \text{ in } 4q. \quad \text{æqualis} \quad Bq. \text{ in } I + Bq. \text{ in } Y.$$

Aequetur singula inter se membra, hoc est

$$4c. \quad \text{æquetur} \quad Bq. \text{ in } I;$$

orientur inde parabole sub cubo et latere.

Aequetur deinde

$$B \text{ in } 4q. \quad \text{secundo membro} \quad Bq. \text{ in } Y;$$

orientur inde parabole sub quadrato et latere, hoc est primaria.

Quadrantur autem singulæ ex his parabolis; ergo aggregatum E eorum ad rectam datam applicatorum producit planoplanum quantitatibus ejusdem gradus rectilineis commode aequandum.

Si sint plura in aequationibus membra, imo et sub plerisque utriusque quantitatis ignotae gradibus involuta, ad eamdem ut plurimum methodum, reductionum legitimarum ope, poterunt aptari.

Ex his patet, si in priori aequatione, in qua

$$Bq. = 4q. \quad \text{æquavimus} \quad Eq..$$

(¹) C'est-à-dire que, si l'on a $c^2 = b^2 - a^2$,

et que b , par exemple, soit la *recta linea data*, $\int_0^b c^2 du$ est une quantité (du troisième degré) que l'on sait déterminer. C'est dans le même sens qu'il faut interpréter les expressions analogues qui suivent.

loco ipsius $Eq.$, ponamus B in U , posse nos aggregatum omnium U , ad rectam datam applicatarum, considerare tanquam planum et quadrare : omnes enim U nihil aliud sunt quam omnia $Equadrata$ divisa per B rectam datam.

Item, in secunda aequatione, omnes U nihil aliud sunt quam omnes $Ecubi$ divisi per B quadratum datum.

Igitur, tam in prima quam in secunda figura, omnes U faciunt figuram aequalem spatio rectilineo dato.

Hoc autem opus fit per syuaresim et expeditur, ut patet, per parabolas; sed non minus quadrationum ferax est opus per diaresim, quod per hyperbolas, aut solas aut parabolis mixtas, commode pariter expeditur.

Proponatur, si placet, curva ab aequatione sequenti oriunda :

$$\frac{Bcc. + Bqc. \text{ in } t + 1cc.}{1qq.} \text{ aequalis } Eq.$$

Ex jam suppositis $Eq.$ potest fingi auale B in U , sive, ut tria line et inde membra sint in utraque parte aequationis,

$$B \text{ in } U \text{ potest aequari } B \text{ in } O + B \text{ in } I + B \text{ in } F.$$

Quo peracto,

$$\frac{Bcc. + Bqc. \text{ in } t + 1cc.}{1qq.} \text{ aequabitur } B \text{ in } O + B \text{ in } I + B \text{ in } F.$$

et, aequando singula membra singulis,

$$\frac{Bcc.}{1qq.} \text{ aequabitur } B \text{ in } O;$$

et, omnibus in $Aqq.$ ductis,

$$Bcc. \text{ aequabitur } 1qq. \text{ in } B \text{ in } O;$$

et, omnibus abs B divisis,

$$Bqc. \text{ aequabitur } 1qq. \text{ in } O,$$

quae est aequatio ad unam ex hyperbolis, ut patet : aequationes enim

hyperbolarum constitutivæ continent, ex una parte, quantitatem datam: ex alia vero, id quod fit sub potestatis duarum quantitatum ignotarum.

Secundum membrum æquationis dat

$$\frac{Bqc, \text{ in } A}{Bqq,} \quad \text{sive} \quad \frac{Bqc,}{Ac,} \quad \text{æqualis} \quad B \text{ in } I,$$

et, omnibus in $Ac,$ ductis et abs B divisis, fit

$$Bqq, \quad \text{æquale} \quad Ac, \text{ in } I,$$

quæ est æquatio alterius hyperboles a priore diversæ.

Denique tertium membrum est

$$\frac{Aqc,}{Bqq,}, \quad \text{hoc est} \quad Aqc, \quad \text{æquale} \quad B \text{ in } I,$$

quæ est æquatio ad parabolæ.

Patet itaque in precedente æquatione omnes U ad rectam datam applicatas æquari spatio rectilineo dato: summa enim duarum hyperbolarum quadrationi obnoxiarum et unius parabole dat spatium æquale rectilineo vel quadrato dato.

Nihil autem vetat quominus singula membra numeratoris separatim denominatori applicemus, ut jam factum est: eodem enim res recidit quo si integrum numeratorem ex tribus membris compositum eidem denominatori semel applicemus. Ita enim singula æquationis membra singulis homogenei correlati possunt commode comparari.

Proponatur etiam

$$\frac{Bqc, \text{ in } U - Bcc,}{Ac,} \quad \text{æquari} \quad Ec,$$

Fingatur $Ec,$ æquari $Bq,$ in $U,$ sive, propter duo membra homogenei correlati,

$$Bq, \text{ in } U - Bq, \text{ in } I,$$

Fiet

$$\frac{Bqc, \text{ in } U}{Ac,} \quad \text{sive} \quad \frac{Bqc,}{Bq,} \quad \text{æqualis} \quad Bq, \text{ in } I,$$

et, omnibus in $Aq.$ ductis et abs $Bq.$ divisis, fiet

$$Bcc. \quad \text{aequalis} \quad tq. \text{ in } I,$$

quæ est æquatio ad unam ex hyperbolis quadrandis.

Ponatur deinde secundum homogenei membrum

$$\frac{Bcc.}{Ic.} \quad \text{aequari} \quad Bq. \text{ in } E,$$

Igitur, omnibus in $Ac.$ ductis et abs $Bq.$ divisis, fiet

$$Bqq. \quad \text{aequate} \quad Ic. \text{ in } E,$$


quæ est æquatio unius ex hyperbolis quadrationi obnoxii constitutiva.

Datur igitur, recurrendo ad primam aequationem, in rectilineis summa omnium *E cuborum* in hac specie ad certam rectam datam applicatorum.

Sed et ulterius progredi et opus tetragonisticum promovere nihil vetat (⁴).

Sit in quarta figura (fig. 145) curva qualibet ABDN, cujus basis HN,

Fig. 145.



diameter HA, applicatae ad diametrum CB, FD, et applicatae ad basim BG, DE; et decrescent semper applicatae a base ad verticem, ut hic HN est major FD et FD major est CB et sic semper.

(⁴) Ce qui suit correspond à l'enseignement de l'intégration par parties et de l'intégration par changement de variable.

Figura composita ex quadratis HN, FD, CB ad rectam AH applicatis (hoc est solidum sub CB quadrato in CA et sub FD quadrato in FC et sub NH quadrato in HF) aequalis est semper figuræ sub rectangulis BG in GH, DE in EH, bis sumptis et ad basim HN applicatis (hoc est solido sub BG in GH bis in GH et sub DE in EH bis in EG) etc. utrimque in infinitum.

In reliquis autem in infinitum potestatibus, eadem facilitate fit reductio homogeneorum ad diametrum ad homogenea ad basim. Quæ observatio curvarum infinitarum hactenus ignotarum detegit quadrationem.

Omnes enim cubi HN, FD, CB, ad rectam AH similiter applicati, aequales sunt aggregato productorum ex BG in GH quadratum et ex DE in EH quadratum, ad rectam HN, similiter ut supra, applicatorum et ter sumptorum : hoc est planoplanum sub CB cubo in CA et sub DF cubo in FC et sub HN cubo in HF aequaliter summae planoplanorum ex BG in GH quadratum in HG et ex DE in EH quadratum in EG, ter sumptae.

Aggregatum vero quadratoquadratorum HN, FD, CB ad rectam AH applicatorum aequaliter quadruplo summae planoplanorum sub BG in GH cubum et sub DE in EH cubum, ad rectam HN, similiter ut supra, applicatorum.

Inde emanant infinitæ, ut statim patebit, quadrature.

Esto enim, si placet, curva illa ABDN ejus naturæ ut, data base HN et diametro HA, diameter data AH vocetur in terminis analyticis *B*, ipsa vero HN, basis data, vocetur *D*, quælibet applicata FD vocetur *E* et quælibet HF vocetur *A*; et sit, verbi gratia, aequatio curvae constitutiva

$$Bq. - 4q. = \text{aquate } Eq.,$$

quod in circulo ita se habet.

Quoniam ergo, ex predicto theoremate universalis, omnia *E* quadrata ad rectam *B* applicata sint aequalia omnibus productis ex HG in GB \leq bis sumptis et \geq ad basim HN sive ad *D* applicatis; sint autem

omnia E quadrata, ad B applicata, aequalia [spatio] (¹) rectilineo dato, ut superius probatum est: ergo omnia producta ex HG in GB, bis sumpta et ad basim D applicata, continent [spatium] rectilineum datum. Ergo, sumendo dimidium, omnia producta ex HG in GB ad basim D applicata erunt aequalia [spatio] rectilineo dato.

Ut autem facillima et nullis asymmetriis involuta fiat translatio prioris curvæ ad novam, ita constanti artificio, quæ est nostra methodus, operari debemus.

Sit quodlibet ex productis ad basim applicandis, HE in ED. Quum igitur FD sive HE, ipsi parallela, vocetur in analysi E , et FH sive DE, ipsi parallela, vocetur A , ergo productum sub HE in ED vocabitur E in A . Ponatur illud productum E in A , quod sub duabus ignotis et indefinitis rectis comprehenditur, æquari B in U , sive producto ex B data in U ignotam, et intelligatur EP, in directum ipsi DE posita, æquari U .

Ergo

$$\frac{B \text{ in } U}{E} \quad \text{æquabitur} \quad 1.$$

Quum autem $Bq. - Aq.$ æquetur, ex proprietate specifica prioris curvæ, ipsi $Eq.$, ergo subrogando, in locum A , ipsius novum valorem

$$\frac{B \text{ in } U}{E},$$

fiet

$$Bq. \text{ in } Eq. - Bq. \text{ in } Uq. \quad \text{æquale} \quad Eqq.,$$

sive, per antithesim,

$$Bq. \text{ in } Eq. - Eqq. \quad \text{æquale} \quad Bq. \text{ in } Uq.,$$

quæ est æquatio novæ HOPN curvæ ex priore oriundæ constitutiva, in qua, quum omnia producta ex B in U dentur, ut jam probatum est, si omnia ad B applicentur, dabitur summa omnium U ad basim applicatarum, hoc est, dabitur planum HOPN \triangleleft in \triangleright rectilineis, ideoque ipsius quadratura.

(1) Il faudrait *solido*. Le mot *spatio* a pu être écrit par inadvertance ou ajouté à tort sur l'original. De même pour les répétitions *spatium* et *spatio* qui suivent.

Sit secundi exempli gratia, æquatio prioris curvæ constitutiva

$$B \text{ in } tq. + tc. \quad \text{æquale} \quad Ec.$$

Summa omnium E cuborum ad diametrum B applicatorum dabitur, ideoque summa omnium productorum ex quadratis HE in ED ad basim applicatorum. Productum autem ex HE quadrato in ED sit, in terminis analyticis, $Eq.$ in A , quod fingatur æquari $Bq.$ in U , et recta EP , ut supra, æquatur U . Ergo

$$\frac{Bq. \text{ in } U}{Eq.} \quad \text{æquabitur} \quad A.$$

Si igitur, in locum A , subrogemus jam agnatum illius valorem

$$\frac{Bq. \text{ in } U}{Eq.},$$

et omnia juxta Analyseos præcepta exsequamur, fiet

$$Bqc. \text{ in } Uq. \text{ in } Eq. - Ecc. \quad \text{æquale} \quad Bcc. \text{ in } Uc.,$$


quæ est æquatio novæ HOPN curvæ ex priore oriundæ constitutiva, in qua, quinum omnia producta $Bq.$ in U ad basim D applicata dentur, omnibus per $Bq.$ datum divisis, dabitur summa omnium U ad basim D applicatorum, ideoque quadratura figuræ HOPN.

Et est generalis, ad omnes omnino casus extendenda in infinitum, methodus. Notandum porro et accurate advertendum in translationibus curvarum, quarum applicatæ ad diametrum versus basim decrescent, aliam omnino viam analystis ineundam, a præcedenti diversam.

Sit enim in quinta figura (fig. 146) prior curva IVCBTY Λ , ejus diameter AI , applicatæ MV , NC , OB , PT , QY , et ejus curvæ ea sit natura ut applicatiæ versus basim semper decreseant, donec ad basim perveniant, ita ut MV sit minor quam NC ; rursus autem ita curva versus A , per tramitem $CBY\Lambda$, inflectatur, ut CN sit major quam BO , BO major quam PT , PT major quam QY , etc.; ita ut omnium applicatorum maxima sit CN .

Si in hoc casu queramus translationem quadratorum MV , NC ad

basim, ea non comparabimus productis sub IR in RV, ut supra, quia jam, ex theoremate generali, suppositum est omnia quadrata MV, NC aequari productis sub VG in GN, quum CN, maxima applicatarum, possit et debeat considerari ut basis respectu curvæ ejus vertex I.



Quadrata igitur MV, NC, in curva quarum applicatae decrescent versus basim, comparabuntur in hoc casu productis \angle ex \angle GV in GN, hoc est, ut ad terminos analyticos aequatio in hae figura perveniat, si MI vel RV vocetur A, et ipsa MV sive RI vocetur E, ipsaque CD sive GR (quæ ductæ, per terminum maximæ applicatarum, ipsi diametro parallele, est æqualis ideoque facile ex nostris methodis invenienda) rectæ datae Z æqualis supponatur, fit

$$\text{productum ex } GV \text{ in } GN = \text{æquale} = \text{producto ex } Z \text{ in } E = A \text{ in } E,$$

ideoque omnia quadrata MV, NC, usque ad maximum applicatam, comparabuntur productis

$$Z \text{ in } E = A \text{ in } E$$

ad basim ID applicandis.

Reliqua vero quadrata CN, BO, PT comparabuntur productis ex YF in FN, quæ in terminis analyticis æquivalebunt

$$A \text{ in } E = Z \text{ in } E.$$

Quibus ita stabilitis, facillime ex priore curva nova versus basim derivabitur, idemque in aliis omnino applicatarum potestatibus erit observandum.

Ut autem pateat novas ex nostra hac methodo emergere quadraturas,

de quibus nondum recentiorum quisquam est aliquid subodoratus, proponatur præcedens curva, cujus æquatio

$$\frac{Bq. \text{ in } t - Bcc.}{Ec.} \text{ æqualis } Ec.$$

Dantur omnes E cubi in rectilineis, ut jam probatum est. Quibus ad basim translatis, fieri, ex superiori methodo,


$$\frac{Bq. \text{ in } U'}{Eq.} \text{ æquale } t,$$

et, omnibus secundum artem novo ipsius A valori accommodatis, evadet tandem nova æquatio quæ dabit curvam ex parte basis: enjus æquatio dabit

$$Ec. + Uc. \text{ æqualis } B \text{ in } E \text{ in } U,$$

quæ est curva Schotenii (¹), cuius constructionem tradit in Sectione 25 *Miscellanearum*, pag. 493. Figura itaque curvæ AKOGDLA (fig. 147) quæ apud illum autorem delineatur, ex superioribus præceptis quadrationem suam commode nanciseetur.

Fig. 147.



Notandum autem ex curvis, in quibus aggregatum potestatum applicatarum datur, formari non solum curvas ad basim quadrationi obnoxias, sed etiam alias curvas ad diametrum facile quadrandas.

(¹) FRANCISI A SCHOOTEN *Exercitationum Mathematicarum libri quinque* (Leyde, Jean Elzevir, 1657). La fig. 147 est reproduite d'après Schooten, qui donne sur cette courbe, d'après J. Hudde, une construction de la plus grande largeur KL. Il est singulier que ni Schooten ni Fermat n'aient fait mention de Descartes comme ayant proposé le premier cette courbe, à laquelle Roberval donna le nom de *galand* (nœud de ruban) et qui est ordinairement désignée maintenant sous celui de *folium de Descartes*.

Si enim in quarta figura (*fig. 145*) supponatur æquatio curvae constitutiva, ut superius diximus,

$$Bq. - 4q. \quad \text{æquale} \quad Eq.,$$

non solum ex ea derivabitur nova curva ad basim, cujus æquatio est

$$Bq. \text{ in } Eq. - Eqq. \quad \text{æquale} \quad Bq. \text{ in } Uq.,$$

sed etiam nova curva ad diametrum, æquando potestatem applicatae, quæ est $Eq.$, producto B in U .

Dabuntur enim omnia producta B in U ad diametrum applicata et, omnibus per B divisis, dabuntur omnes U diametro applicatae, ideoque quadratura curvae novæ ex priore versus diametrum oriundæ, cujus æquatio erit

$$Bq. - 4q. \quad \text{æquale} \quad B \text{ in } U;$$

unde statim apparet novam illam curvam versus diametrum esse parabolam.

Hujusmodi autem transmutationum beneficio, non solum ex prioribus curvis oriuntur novæ, sed itur, nullo negotio, a parabolis ad hyperbolas et ab hyperbolis ad parolas, ut experientia constabit.

Sicut autem a curvis, in quibus dantur potestates applicatarum, fit, præcedentis ope analyseos, translatio ad curvas, in quibus latera applicatarum in rectilineis dantur, ita ex curvis in quibus dantur latera applicatarum, devenitur facile ad curvas, in quibus potestates applicatarum dantur.

Cujus rei exemplum esto curva, cujus æquatio

$$Bq. \text{ in } Eq. - Eqq. \quad \text{æquale} \quad Bq. \text{ in } Uq.$$

In hac enim æquatione, ut jam probatum est, dantur omnes U . Ponatur

$$U \quad \text{æqualis esse} \quad \frac{4 \text{ in } E}{B},$$

et, subrogando in locum ipsius U , novum ipsi assignatum valorem, $\frac{4 \text{ in } E}{B}$, fiet

$$Bq. \text{ in } Eq. - Eqq. \quad \text{æquale} \quad 4q. \text{ in } Eq.$$

et, omnibus abs $Eq.$, divisis, remanebit

$$\begin{aligned} & Bq. - Eq. \quad \text{æquale} \quad 1q. \\ \text{sive} \quad & Bq. - 1q. \quad \text{æquale} \quad Eq. \end{aligned}$$

Dabuntur igitur in hæc nova curva, quam apparet esse circulum, omnia *E quadrata*.

Quod si, ex prima curva in qua dantur latera applicatarum, queraatur nova in qua dentur cubi applicatarum, eadem methodo utendum, modo potestates ignotarum conditionarias usurpemus.

Proponatur enim curva quam superius ex alia deduximus, et sit illius æquatio

$$Bqe, \text{ in } Uq, \text{ in } Eq. \quad Eccc. \quad \text{æqualis} \quad Bcc, \text{ in } Uc.$$

Probatum est in illa dari aggregatum omnium U , hoc est, latera applicatarum. Ut itaque ex eæ nova curva derivetur, in qua omnes cubi applicatarum dentur, ponatur

$$U \quad \text{æquari} \quad \frac{Eq. \text{ in } 1}{Bq.},$$

et in locum U substituatur novus iste quem ipsi assignavimus valor, fiet tandem, operando secundum præcepta artis, æquatio

$$\text{inter } B \text{ in } 1q. - 1c. \quad \text{et} \quad Ecc.$$

que dabit curvam in qua omnes $Ecc.$, cubos applicatarum repræsentantes, dabuntur.

Ex hac autem methodo non solum dantur et inveniuntur quadratio-nes infinitæ, nondum geometris cognitæ, sed multæ etiam pariter infinitæ deteguntur curvæ, quarum quadraturæ, supponendo simpliciores quadraturas, ut circuli, ut hyperboles, ut aliarum, expediuntur.

Exempli gratia, in æquatione circuli, in qua

$$Bq. - 1q. \quad \text{æquatur} \quad Eq.,$$

dantur quidem in rectilineis omnes applicatarum potestates, quarum exponentes signantur numero pari, ut omnia quadrata, omnia quadra-toquadrata, omnes cubocubi, etc.; sed potestates applicatarum, qua-

rum exponentes signantur numero impari, ut omnes E *cubi*, omnes E *quadratocubi*, dantur tantum in rectilineis, supponendo ipsam circuli quadraturam. Quod non est operosum demonstrare et in praxin redigere, tanquam corollarium methodi praecedentis.

Plerumque autem usuvenit ut iterandæ vel bis vel etiam sæpius sint operationes ad inquirendam curvæ propositæ dimensionem.

Proponatur, exempli gratia, curva ejus aequatio sequens speciem determinet :

$$Bc. \quad \text{æqualis} \quad Aq. \text{ in } E + Bq. \text{ in } E.$$

Si dantur omnes E , ergo dantur omnia sub recta data (B videlicet) in E rectangula. Rectangulum B in E , invertendo superiore, de qua egimus in principio Dissertationis, methodum, aequetur quadrato, Oq . Ergo

$$\frac{Oq.}{B} \quad \text{æquabitur} \quad E$$

et, substituendo, in locum E , novum hunc ipsi assignatum valorem, fiet

$$Bqq. \quad \text{æquate} \quad Aq. \text{ in } Oq. + Bq. \text{ in } Oq.$$

Et hæc sit prima operatio, quæ est inversa ejus quam initio hujus Dissertationis premissus, et quæ novam curvam exprimit, in qua inquirendum restat ad dentur omnia Oq . Recurrendum igitur ad secundam methodum, ejus beneficio ex quadratis applicatarum latera novæ curvæ inquirimus.

Ponatur $\frac{B \text{ in } U}{O}$, ex superiore quam secundo loco exhibuimus methodo, aequari A et, substituendo, in locum A , ipsi jam assignatum ex nostra methodo valorem, fiet

$$Bqq. - Bq. \text{ in } Oq. \quad \text{æquale} \quad Bq. \text{ in } Uq.$$

et, omnibus per Bq . divisis, evadet tandem

$$Bq. - Oq. \quad \text{æquale} \quad Uq.,$$

quæ aequatio dat circulum, et in ea omnes U dantur, supponendo quadraturam circuli.

Recurrendo igitur ad priorem curvam, in qua


$$Bc. \quad \text{ponitur æquari} \quad Uq. \text{ in } E + Bq. \text{ in } E,$$

patet spatium ab ea curva oriundum per quadraturam circuli posse quadrari, idque per duas curvas a priore diversas analysis nostra breviter et facile expedivit.

Hæc vero omnia et ad inventionem rectarum curvis æqualium et ad pleraque alia non satis hactenus indagata problemata inservire statim experiendo ζητεος analysta deprehendet.

Sit in sexta figura (fig. 148) parabole primaria ADB, cujus axis CB,

Fig. 148.



applicata CD æqualis axi CB et recto lateri BV, fiantque BP, PL, LG singulæ æquales axi CB et ipsi in directum. Sumatur in curva quodvis punctum, ut F, et, datis infinitis BX, PS, LO ipsi CD parallelis, ducatur FXSOK parallela axi, occurrens rectis $\angle BX$, PS, LO in punctis $\angle X$, S et O; et fiat ut summa rectarum FX, XS sive

$$\text{ut tota FS ad SO, ita SO ad OK;}$$

et, sumptis similiter punctis D, E, fiat

$$\text{ut DR ad RN, ita RN ad NI,}$$

et

$$\text{ut EQ ad QM, ita QM ad MH;}$$

et intelligatur curva infinita per puncta G, H, I, K etc. ineedens, cujus asymptotos erit recta infinita LO.

Curva hæc GHIK est ea cujus species a superiori æquatione determinatur, in qua

$$Bc. \quad \text{æquatur} \quad Uq. \text{ in } E + Bq. \text{ in } E.$$

Aio itaque, ex jam tradita operationum analytica iteratione, spatium KIHGLMNO, in infinitum versus puncta K, O extendendum, aequale esse circulo, cuius diameter est axis BC, < bis sumpto >.

Hanc vero questionem, ab erudito geometra nobis propositam, ita statim expedivimus : eadem methodo spatium a Diolea comprehensum quadravimus, vel ad circuli quadraturam reduximus (¹).

Sed elegans imprimis operationum iteratio evadit, quum ab altioribus applicatarum potestatisbus ad depressores, vel contra a depresso-ribus ad altiores, analysis ipsa transcurrit : cuius methodo præsertim debeatur inquisitio summe applicatarum in quacumque curvâ propo- sitâ, et multa alia problemata tetragonistica.

Proponatur, verbi gratia, curva cuius æquatio

$$Bq. - tq. = \text{æquale } Eq.,$$

quam statim apparet esse circulum. Quæritur summa cuborum appli- catarum, hoc est, summa *E cuborum*.

Si dantur omnes *E cubi*, ergo, per præcedentes secundum potesta- tis conditionem methodos, ex ea curva potest alia ad basim derivari, in qua dabitur summa applicatarum. Ponatur igitur ex methodo

$$\frac{Bq. \text{ in } O}{Eq.} = \text{æquari } 1 :$$

ergo, substituendo, in locum 1, jani assignatum ipsi valorem, fiet ex methodo

$$Bq. \text{ in } Eqq. = Ecc., \quad \text{æquate } Bqq. \text{ in } Oq.,$$

quæ est æquatio curvæ, in qua omnes *O* dantur ex suppositione quam fecimus, in prima curva dari omnes *E cubos*.

Quum igitur in hac nova curva omnes *O* dentur, ex ea derivetur ter- tia, in qua quærantur quadrata applicatarum, non vero cubi, ut in priore curva jam suppositum est. Fingatur igitur ex nostra, quæ in

(¹) Voir le fragment qui suit le présent Traité. Quant à la question qui précède, on ignore quel géomètre l'a proposée à Fermat.

quadratis, ut jam supra diximus, usurpatur, methodo,

$$\frac{E \text{ in } U}{B} = \text{æquari } O;$$

ergo

$$Bq. \text{ in } Eqq. = Eee. \quad \text{æquabitur} \quad Bq. \text{ in } Eq. \text{ in } Uq.$$

et, omnibus abs $Eq.$ divisis, fieri

$$Bq. \text{ in } Eq. = Eqq. \quad \text{æquale} \quad Bq. \text{ in } Uq.;$$

et in hac curva omnia E quadrata dantur.

Si igitur ex hac curva quæramus aliam in qua omnes applicatae dentur, ponatur, si placet,

$$Eq. \quad \text{æquale} \quad B \text{ in } E;$$

ergo, in ultima hæc æquatione,

$$B \text{ in } E = Eq. \quad \text{æquabitur} \quad Uq.$$

et, quum in superiore dentur omnia E quadrata, dabuntur in ista omnia rectangula B in E , ideoque omnes E .

Quum ergo omnes E dentur in hac ultima curva, que est circulus, ut patet (igitur è tantum conditione dantur, si supponas dari circuli quadraturam), regrediendo igitur ab hac ultimâ, in qua desinit nostra analysis, curvâ ad priorem, patet omnes applicatarum ad circulum cubos dari, supponendo circuli quadraturam.

Idem de quadratocubis, de quadratoquadratocubis et cæteris in infinitum gradus imparis potestatibus demonstrare est in promptu; sed multiplicatur numerus curvarum, prout altior est, de qua inquirimus, potestas.

Nec est difficilis ab analysi ad synthesin et ad verum quadrandæ figure calculum regressus.

Sæpius autem contingit et miraculi instar est per plurimas numero curvas incedendum et exspatiandum esse analystæ, ut ad simplicem æquationis localis propositione dimensionem perveniantur.

Proponatur, exempli causa (¹),

$$\frac{B^7 \text{ in } t - B^8}{t^8} = \text{aequari } Eq.$$

Quum supponatur dari quadratura figuræ ex hac aequatione oriundæ, dabuntur omnes A , ergo omnia $B \text{ in } A$, quæ si æques quadrato ignoto, $Oq.$, dabuntur omnia $Oq.$, et

$$t = \text{aequabitur } \frac{Oq.}{B},$$

ideoque fiet æquatio

$$\text{inter } \frac{B^{12} \text{ in } Oq. - B^{13}}{O^{12}} \text{ et } Eq.$$

Ex hac nova curva, aliâ methodo de qua toties egimus, deducetur tertia in qua, quia dantur omnia O quadrata, ponatur

$$\frac{B \text{ in } U}{O} = \text{aequari } E:$$

ergo fiet æquatio

$$\text{inter } \frac{B^{10} \text{ in } Oq. - B^{12}}{O^{10}} \text{ et } Uq.,$$

unde deducetur *tertia* curva (²), in qua dabuntur omnes O , ideoque omnes U .

Si dantur omnes U , ergo ex prima methodo dantur omnia sub $B \text{ in } U$ rectangula. Sit

$$B \text{ in } U = \text{æquale } Uq.,$$

(¹) Pour ce qui suit, jusqu'à la fin du Traité, on a reproduit la notation exponentielle telle qu'elle se trouve dans les *Varia*, où d'ailleurs elle n'apparaît pas plus tôt. Il est cependant douteux que Fermat, après avoir affecté jusque-là de conserver la notation de Viète, fût abandonnée sans faire une remarque analogue à celle qu'il a insérée dans un Traité de la même époque (*voir* plus haut, p. 127, lignes 4 à 6 en remontant) pour une occasion où l'emploi des exposants s'imposait davantage à lui; il est surtout douteux qu'il ait appliqué ici la nouvelle notation aussi systématiquement que l'indiquerait les *Varia*. En outre, dans cette fin du Traité, on peut soupçonner d'autres remaniements du texte. *Voir* la note qui suit.

(²) Les *Varia*, au lieu de *tertia*, portent *quarta*; tous les noms de nombre qui suivent, et qui sont inscrits en *italiques* dans le texte, sont de même augmentés d'une unité. On peut admettre une inadvertance de Fermat; mais il est également possible que son texte ait été corrigé à tort et même défiguré par l'addition de gloses dont l'auteur aura voulu numérotier successivement les différentes courbes dont il est question.

ideoque

$$\frac{I q.}{B} \text{ aequabitur } U,$$

et fieri aequatio

$$\text{inter } \frac{B^{12} \ln Oq. + B^3}{O^{10}} \text{ et } E^3,$$

unde orietur *quarta* curva, in qua dabuntur omnia *E quadrata*.

Ex illâ, solitâ methodo, deducatur alia curva et fiat

$$\frac{B \ln I}{Y} \text{ aequalis } O.$$

Omnibus secundum præcepta Analyseos peractis, fieri

$$B^3 \ln E^3 + I q. - B^3 \ln E^6 \text{ aequale } I^{10},$$

unde orietur *quinta* curva, in qua dabuntur omnes *E*, ideoque omnes *I*.

Ex ea, contrariâ quam jam saepius inculeavimus methodo, queratur alia curva in qua dentur quadrata applicatarum, et sit

$$\frac{I \ln I}{B} \text{ aequalis } E$$

(nihil enim vetat defectu vocalium ad priores supra usurpatas recur-
rere); fieri

$$B q. \ln E^3 + I^6 \text{ aequale } B q. \ln E,$$

unde orietur curva *sexta* in qua omnia *I quadrata* dabuntur.

Reducantur ad latera, notâ et saepius iteratâ superius methodo, et fiat

$$I q. \text{ aequale } B \ln E;$$

ergo omnia *B in E* dabuntur et inde ducetur *septima* curva, in qua

$$B q. \ln E^3 + I^6 \text{ aequabitur } B^3 \ln E q.,$$

in eaque dabuntur omnes *E*, ideoque omnes *A*.

Ex ea ducatur alia curva, in qua dentur quadrata applicatarum, et ex methodo ponatur

$$\frac{I \ln O}{B} \text{ aequari } E;$$

ergo

$$Bq. \text{ in } B = B^6 \quad \text{æquabitur} \quad Bq. \text{ in } Iq. \text{ in } Oq.$$

et, omnibus abs $Aq.$ divisis, fiet aequatio

$$\text{inter} \quad Bq. \text{ in } Iq. = B^3 \quad \text{et} \quad Bq. \text{ in } Oq.,$$

in qua omnia A quadrata dabuntur et erit octava curva ab ea aequatione determinata.

Quum igitur in ea omnia A quadrata dentur, deducatur ex eâ alia tandem curva, in qua dentur latera, et sit

$$Iq. \quad \text{æquale} \quad B \text{ in } U;$$

fiet

$$B \text{ in } U - Iq. \quad \text{æquale} \quad Oq.,$$

quæ ultima æqualitas dabit nonam curvam, in qua omnes U dabuntur.

At hæc ultima curva est circulus, ut patet, et in ea omnes U non dantur, nisi supposita circuli quadratura : ergo recurrendo ad primam curvæ propositæ constitutionem, dabitur illius quadratura, supponendo ipsam ultimæ istius curvæ sive circuli quadraturam. Beneficio igitur novem curvarum inter se diversarum ad notitiam prioris pervenimus.

< DE CISSOIDÆ FRAGMENTUM > ⁽¹⁾.

Esto eissois EAPS (*fig. 149*) in semicirculo LVABE, ejus centrum H, diameter LE, perpendicularis ad diametrum radius HA, asymptotos infinita cissoidis recta LR ad diametrum perpendicularis.

Aio spatium contentum sub EL, cissoidæ infinita EAPS et asymptoto


(1) Fragment publié par M. Ch. Henry (*Pierre de Carcavy etc.*, p. 38-40), d'après le manuscrit de la Bibliothèque de Leyde, fonds Huygens, n° 30. Il suit la lettre de Careavi à Huygens du 1^{er} janvier 1662, et porte comme titre : *De M. de Carcavy, qu'il avoit de M. de Fermat*, avec la remarque de Huygens : « *J'ay démontré cette Proposition 4 ans auparavant.* » La copie ne paraît pas très fidèle.

infinita LR, esse triplum semicirculi LAE, ideoque, si altera semicirculi parte eadem fiat constructio, ambo spatia culminantia in puncto E esse tripla totius circuli.

Demonstratio non est operosa, immo satis elegans.

Sumantur duo puncta I et G in diametro, utrumque æqualiter a centro distantia, ita ut rectæ HI, HG sint æquales, ideoque rectæ LI, GE. A punctis I et G excentur perpendiculares occurrentes cissoidi

Fig. 149.



in punctis P, Y et circulo in punctis V et B. Jungantur radii HV, HB et a punctis V et B ducantur tangentes VM, BD, occurrentes diametro in punctis M et D. Sumatur minima quævis, ultra punctum I, recta IK et, ultra punctum G, recta GF ipsi IK æqualis, et a punctis K et F excentur perpendiculares ad diametrum rectæ KN, FC occurrentes tangentibus in punctis N et C, a quibus demittantur perpendiculares NO, CQ in rectas VI, BG.

His ita constitutis, patet spatium cissoidale æquari omnibus rectangulis sub PI < in > IK et sub YG < in > GF, uteumque ubilibet sumptis, bases ipsis KL, GF æquales habentibus et altitudines an-

gulis rectis ad cissoidem similiter applicatas. Est autem, ex natura cissoidis,

ut VI ad HE, ita IE ad IP;

sed IE est aequalis rectis HH et HE sive HV: ergo est

ut IV ad summam rectarum HI, HV, ita IE ad IP.

Sed, propter similitudinem triangulorum HVI, VMI, VNO, est

ut IV ad summam rectarum HI, HV,

ita recta NO ad summam rectarum NV, VO:

ergo

ut NO sive KE est ad NV plus VO, ita est recta HE ad rectam IP.

Rectangulum igitur sub IP < in > IK aequalur rectangulo sub HE in NV plus rectangulo sub IE in VO.

Ex alia autem parte, est, ex natura cissoidis,

ut BG ad GE, ita GE ad GY;

sed GE est aequalis recte HE sive HB minus HG: ergo est

ut BG ad BH minus HG, ita GE ad GY.

Ut autem BG ad BH minus HG, ita, propter similitudinem triangulorum, ex jam demonstratis,

recta QC sive GF est ad BC minus BQ,

ideoque rectangulum sub YG in GF aequabitur rectangulo sub GE in BC minus rectangulo sub GE in BQ.

Ex constructione autem, quum rectae HI, HG sint aequales, item rectae KE, GF, patet reliquas aequari, nempe VN ipsi BC, VO ipsi BQ: unde patet duo rectangula correlativa, sub PI in IK et sub YG in GF sive in eamdem IK, aequalia esse rectangulis sub IE in NV, plus GE in BC sive LI in NV, plus HE in VO, minus GE in BQ sive in VO. Rectangula autem duo sub HE in NV et sub LI in NV aequalant unico rectangulo sub diametro LE in NV; rectangulum vero HE in VO minus GE in VO

æquatur rectangulo sub IG in VO sive rectangulo sub HI sive VX in VO
bis : ergo summa rectangulorum sub PI in HK et sub GY in eamdem HK
æquatur rectangulo sub diametro EL in VN et rectangulo sub VX in
VO bis.

Rectangula autem omnia sub diametro et portionibus tangentium VN
in quadrante circuli LVA ductarum repræsentant rectangulum sub
diametro in quadrantem LVA, hoc est duplum semicirculi LAE; rec-
tangula autem omnia sub VX in VO bis sive, ducta OZQ parallelâ
diametro, rectangula omnia sub VX in XZ bis repræsentant totum
semicirculum LAE.

Ergo spatium eissoideale, quod æquatur duobus illis rectangulorum
seriesbus, æquatur triplo semicirculi, ut patet.

OBSERVATIONS SUR DIOPHANTE.

OBSERVATIONES DOMINI PETRI DE FERMAT.



I (p. 54).

(**Ad definitionem VI Cl. Gasparis Bacheti Porismatum Libr. III.**)

A duobus quibuscunque numeris formari dicitur triangulum rectangulum, quum ex aggregato et ex intervallo quadratorum ab ipsis et ex duplo plani sub ipsis numeris contenti constant latera trianguli.

A tribus numeris in proportione arithmeticā possumus formare triangulum, si secundum hanc definitionem sextam formemus illud a medio et differentia. Nam solidum sub tribus ductum in differentiam faciet aream dicti trianguli, atque ideo, si differentia sit unitas, solidum sub tribus erit area trianguli.

II (p. 61).

(**Ad quæstion. VIII Diophanti Alexandrini Arithmeticorum Libr. II.**)

Propositorum quadratum dividere in duos quadratos.

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duas ejusdem nominis fas est dividere : enjus rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

III (p. 65).

(**Ad quæstion. X Libr. II.**)

Datum numerum, qui ex duobus componitur quadratis, in alios duos quadratos partiri.

Num verò numerum ex duobus cubis compositum dividere poterimus in alios duos cubos? Hæc quæstio difficilis sane nec Bacheto aut Viete

cognita, fortasse nec ipsi Diophanto: ejus tamen solutionem dedimus infra in notatis (¹) ad quæstionem secundam Libri IV.

IV (p. 107).

(Ad quæstion. X Libr. III.)

Dato aliquo numero, invenire tres alios, ut compositus ex binis quibuslibet adsumpto dato numero faciat quadratum, sed et summa trium dato numero adjecto faciat quadratum.

Quomodo inveniendi sint quatuor numeri ut compositus ex binis quibuslibet adsumpto dato numero conficiat quadratum, invenimus ad propositionem 30 Libri V.

V (p. 108).

(Ad quæstion. XI Libr. III.)

Dato aliquo numero, invenire tres alios, ut compositus ex duobus quibuslibet dempto dato numero faciat quadratum, sed et trium summa detracto dato numero faciat quadratum.

Quæ notavimus ad 31^{am} Libri V, docebunt quomodo inveniendi sint quatuor numeri, quorum bini quilibet sumpti dempto dato numero conficiant quadratum.

VI (p. 108).

(Ad quæstion. XVII Libr. III.)

Invenire tres numeros ut productus ex binorum multiplicatione, adsumptâ eorumdem summâ, quadratum faciat.

Exstat hujus quæstionis Diophanti problema (²) in Libro V quæstione 5. Num verò problema sequens ipse Diophantus sciens prætermisit, an potius in aliquo tredecim librorum constructum erat, nescimus:

(¹) Voir ci-après l'observation IX.

(²) *Dioph.*, p. 216 : « Invenire tres quadratos, ut quem bini faciunt planum, sive adsercat amborum summam, sive reliquum, faciat quadratum. »

Invenire tres quadratos ut productus ex binorum multiplicatione, adsumpti eorumdem summam, quadratum faciat.

Hujus tamen quæstionis infinitas solutiones dare possumus. En verbi gratia, sequentem solutionem : satisfaciunt nempe problemati tres quadrati sequentes

$$\frac{3 \cdot 504 \cdot 384}{203 \cdot 401}, \quad \frac{3 \cdot 109 \cdot 241}{203 \cdot 401}, \quad 4,$$

Primus quadratus. Secundus quadratus. Tertius quadratus.

Imo et ulterius progredi et Diophanteam quæstionem promovere nihil vetat. Sequens enim problema generaliter et infinitis modis construximus :

Invenire quatuor numeros sub quibus binis quod sit planum, adscitum amborum summam, faciat quadratum.

Inveniantur, per 5^{am} propositionem Libri V, tres quadrati ut quem bini faciunt planum adsciscens amborum summam faciat quadratum, et sumto illi numeri quadrati

$$\frac{25}{9}, \quad \frac{64}{9}, \quad \frac{196}{9}.$$

Sunt ergo tres isti quadrati tres primi nostræ quæstionis. Ponatur quartus $+N$; fient tria producta unâ cum summis æqualia

$$\frac{34}{9}N + \frac{25}{9}, \quad \frac{73}{9}N + \frac{64}{9}, \quad \frac{205}{9}N + \frac{196}{9}.$$

Primum, Secundum, Tertium.

Hæc igitur tria æquanda quadrato, et oritur triplicata æqualitas, cuius explicationem dedimus ad quæstionem 24 Libri VI.

VII (p. 107-108).

Ad commentarium (in quæstion. XXII Libr. III), præcipue ad locum illum :
Adverte tertio etc. (1).

Numerus primus, qui superat unitate quaternarii multiplicem, semel

(1) Ce renvoi, indiqué par Samuel Fermat, n'est pas exact; l'observation de Fermat porte surtout sur la fin du commentaire de Bachet, à partir de « Cæterum animadversione

tantum est hypotenusa trianguli rectanguli, ejus quadratus bis, cubus ter, quadratoquadratus quater, etc., in infinitum.

Idem numerus primus et ipsius quadratus componuntur semel ex duobus quadratis; ejus cubus et quadratoquadratus, bis; quadrato-cubus et cubocubus ter; etc., in infinitum.

Si numerus primus ex duobus quadratis compositus ducatur in alium primum etiam ex duobus compositum quadratis, productum componetur bis ex duobus quadratis; si ducatur in quadratum ejusdem primi, productum componetur ter ex duobus quadratis; si ducatur in cubum ejusdem primi, productum componetur quater ex duobus quadratis; et sic in infinitum.

Hinc facile est determinare *quoties numerus datus sit hypotenusa trianguli rectanguli.*

Sumantur omnes primi, quaternarii multiplicem unitate superantes, qui datum numerum metinuntur: verbi gratia, 5, 13, 17.

Quod si potestates dictorum primorum metiantur datum numerum,

quoque dignum est, etc. (p. 127, l. 7) ». En fait, le problème de Diophante consiste à trouver quatre nombres tels que la somme de leurs carrés, augmentée ou diminuée de chacun de ces nombres, fasse toujours un carré. Dans son commentaire, Bachet remarque :

1^e Comment Diophante ramène ce problème à celui de trouver quatre triangles rectangles en nombres ayant une même hypoténuse;

2^e Comment ce nouveau problème se résout en nombres entiers par le choix de deux triangles rectangles non semblables, et en multipliant les côtés de chacun d'eux par l'hypoténuse de l'autre.

C'est-à-dire que si l'on a

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad \text{et} \quad a_1^2 + b_1^2 = c_1^2,$$

on aura

$$(1) \quad \overline{cc_1} = \overline{ac_1} + \overline{bc_1} - \overline{a_1c} + \overline{b_1c}.$$

3^e Si d'ailleurs les hypoténuses sont, chacune respectivement, somme de deux carrés, leur produit peut être décomposé en deux carrés de deux manières différentes.

Si l'on a

$$c = z^2 + \beta^2 \quad \text{et} \quad c_1 = z_1^2 + \beta_1^2,$$

on aura

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \overline{cc_1} = (z^2 + \beta^2)(z_1^2 + \beta_1^2) = (zz_1 - \beta\beta_1)^2 + (z\beta_1 - z_1\beta)^2 \\ \qquad \qquad \qquad = (zz_1 - \beta\beta_1)^2 + (z\beta_1 + z_1\beta)^2. \end{array} \right.$$

Bachet ajoute que, toutefois, les deux carrés composant chaque hypoténuse doivent être inégaux, et qu'il ne doit pas y avoir de proportion entre les quatre.

3^e Comme maintenant, si un nombre est décomposé en deux carrés (soit p^2 et q^2), on en

disponantur una cum reliquis loco laterum : verbi gratia, metiantur datum numerum

5 per cubum, 13 per quadratum, et 17 per latus simpliciter.

Sumantur exponentes omnium divisorum : nempe numeri 5 exponentis est 3 propter cubum; numeri 13 exponentis est 2 propter quadratum et numeri 17 unitas tantum.

Ordinentur igitur, ut volueris, dieti omnes exponentes : ut, si velis,
3. 2. 1.

Ducatur primus in secundum bis et producto adjiciendo summam primi et secundi, fit 17. Ducatur jam 17 in tertium bis et producto adjiciendo summam 17 et tertii, fit 52. Datus igitur numerus erit hypotenusa 52 triangulorum rectangulorum; nec est dissimilis in quotemque divisoribus et ipsorum potestatibus methodus.

Reliqui numeri primi qui quaternarii multiplicem unitate non sup-

déduit qu'il est l'hypoténuse d'un triangle rectangle en nombres, car

$$(p^2 + q^2)^2 = (p^2 - q^2)^2 + (2pq)^2.$$

on aura ainsi le moyen de construire deux nouveaux triangles rectangles ayant cet pour hypoténuse, et le problème sera résolu, sous la réserve que les opérations ne seront pas illusoires, comme cela arriverait si, dans la double décomposition (2), on tombait sur une somme de deux carrés égaux: on doit en conséquence exclure le cas où $\frac{z_1}{\beta_1} = \frac{z - \beta}{z + \beta}$.

5° Bachet indique les corrections qu'il a apportées au texte grec.

6° Il montre comment le procédé de Diophante peut être généralisé, en prenant deux nombres sommes de deux plans semblables; le produit de ces nombres peut en effet, s'il n'y a pas proportion entre les composants, être divisé en deux carrés de quatre manières différentes.

Enfin, il soulève la question que Fermat a complètement résolue dans son observation, à savoir de trouver un nombre décomposable en deux carrés de tant de manières que l'on voudra. Si, dit-il, on multiplie un nombre qui est 1 fois seulement somme de deux carrés par un nombre jouissant de la même propriété, le produit sera somme de deux carrés 2 fois seulement. Un tel nombre, multiplié par un autre décomposable 1 seule fois, donnera un produit décomposable 3 ou 4 fois seulement (3 fois si le multiplicateur a un facteur commun avec le multiplicande, 4 fois dans le cas contraire). Un nombre décomposable 3 fois seulement, multiplié par un qui ne l'est que 1 fois seulement, donnera (en excluant le cas de facteurs communs) un produit décomposable 6 fois seulement.

On peut continuer ainsi indéfiniment : Un nombre décomposable 4 fois et un qui l'est 1 fois, ou bien deux décomposables 2 fois seulement donneront un produit 8 fois décomposable. Un nombre 6 fois décomposable par un 2 fois décomposable donnera un produit 24 fois décomposable. Bachet donne des exemples sans démonstration.

cant, nihil aut addunt quæstioni aut detrahunt neque ipsorum potestates.

Invenire numerum qui quoties quis velit sit hypotenusa.

Quæratur numerus qui sit septies hypotensa.

Numerus 7 datus dupletur : fit 14. Adjice unitatem : fit 15. Sume omnes primos qui mensurant 15 : sunt hi 3 et 5. Ab unoquoque demptâ unitate, sume reliqui dimidium : fiunt 1 et 2. Quærantur tot primi diversi quot hic sunt numeri, nempe duo, et secundum exponentes 1 et 2 inter se multiplicentur, nempe unus in quadratum alterius; in hoc casu satisfiet quæstioni, modo primi quos sumis superent quaternarium (¹) unitate.

Ex his constat facile posse inveniri numerum minimum qui quoties quis velit sit hypotenusa.

Invenire numerum qui quoties quis velit componatur ex duobus quadratis.

Sit datus numerus 10. Ejus duplum 20, cujus omnes partes primæ sumantur : 2, 2, 5. Ab unaquaque tolle unitatem : fiunt 1, 1, 4. Suman-
tur igitur tres numeri primi, qui nempe unitate superent quaternarium (¹) : verbi gratia, 5, 13, 17; et quadratoquadratus unius, propter exponentem 4, ducatur in reliquos duos, fiet numerus quæsusitus.

Ex his facile potest inveniri minimus numerus qui quoties quis velit componatur ex duobus quadratis (²).

Ut autem dignoscatur *quoties datus numerus ex duobus quadratis componitur*:

Sit datus numerus 325. Numeri primi qui eum componunt, nempe quaternarium (¹) unitate superantes, sunt : 5, 13, hie semel, ille per quadratum. Exponentes disponantur : 2, 1. Productum multiplicatione jungatur summe : fit 5, cui adjunctâ unitate, fit 6, cujus dimidium 3. quoties igitur numerus datus componitur ex duobus quadratis.

(¹) Lisez « quaternarium multiplicem ».

(²) Dans l'édition de Samuel Fermat, le texte de cet alinéa se trouve après celui des trois suivants.

Si essent tres exponentes, ut 2. 2. 1, ita procedendum : Productum sub prioribus adjunetum summæ facit 8. Dueatur 8 in tertium et jungatur productum summæ : fit 17, cui junge unitatem : fit 18, enjus dimidium dat 9. Toties iste secundus numerus componetur ex duobus quadratis.

Si ultimus numerus bifariam dividendus esset impar, tunc, dempta unitate, reliqui dimidium sumi debet.

Sed proponatur, si placet, sequens questio : *Invenire numerum in integris qui adsumpto dato numero conficiat quadratum et sit hypotenusa quotlibet triangulorum rectangularium.*

Hæc quæstio ardua est. Proponatur, verbi gratia, inveniendus numerus qui sit bis hypotenusa et adsumpto binario conficiat quadratum.

Erit quæsitus numerus 2023, et sunt alii infiniti idem præstantes, ut 3362, etc.

VIII (p. 133).

(*Ad commentarium in quæstion. II Libr. IV.*)

QUESTIO DIOPHANTII : Invenire duos numeros, ut illorum intervallum datum faciat numerum et eborum quoque ab ipsis ortorum sit quod præscribitur intervallum.

QUESTIO PRIMA BACHETI : Datis duobus cubis, invenire duos alios, quorum summa æqualis sit datorum intervallo. Oportet autem duplum minoris cubi non superare maiorem.

Canon : Utrumque datorum eborum ducito ter in latus alterius, productos divide per summam eborum, a majore quotiente aufer minus latus, et minorem quotientem aufer a majore latere; relinquentur eborum quasitorum latera.

Determinationem operationis iteratione facillime tollimus et generaliter tum hanc quæstionem, tum sequentes quæstiones construimus, quod nee Bachetus nec ipse Vieta (¹) expedire potuit.

Sint dati cubi 64 et 125, inveniendi alii duo quorum summa æqualis sit datorum intervallo.

(¹) Viète avait déjà traité comme Bachet les trois questions sur lesquelles portent cette observation de Fermat et la suivante. Voir ZETETIC. IV, 18, 19, 20 (pages 74-75 de l'édition de Schooten).

Ex questione tertia, folio sequenti (¹), querantur duo alii cubi quorum differentia æquet differentiam datorum. Illos Bachetus invenit et sunt

$$\frac{15 \cdot 25 \cdot 992}{250 \cdot 047} \text{ et } \frac{125}{250 \cdot 047}.$$

Isti duo cubi ex constructione habent intervallum æquale intervallo datorum; sed isti duo cubi, inventi per questionis tertiae operationem, possunt jam transferri ad questionem primam, quin duplum minoris non superet majorem. Datis itaque his duobus cubis querantur alii duo quorum summa æquetur intervallo datorum; id quidem licet per determinationem hujus questionis prima. At intervallum datorum horum cuborum est per questionem tertiam æquale intervallo cuborum prius sumptorum 64 et 125; igitur construere nihil vetat duos cubos quorum summa æqualis sit intervallum datorum 64 et 125, quod sane miraretur ipse Bachetus.

Imo, si tres istæ questiones eant in circulum et iterentur in infinitum, dabuntur duo cubi in infinitum idem præstantes; ex inventis enim ultimo duobus cubis quorum summa æquet differentiam datorum, per questionis secundæ operationem quæremus duos alios quorum differentia æquet summam ultimorum, hoc est intervallum priorum, et ex hac differentia rursum quæremus summam et sic in infinitum.

IX (p. 135).

(Ad eumdem commentarium.)

QUESTIO SECUNDA BACHETI : Datis duobus cubis, invenire duos alios, quorum differentia æquet summam datorum.

Canon : Utrumque datorum cuborum ducito ter in latus alterius, productos divide per intervallum cuborum, et minori quotienti adde maius latus, atque a majore quotiente aufer minus latus; summa et residuum exhibebunt quæsitorum latera cuborum.

QUESTIO TERTIA BACHETI : Datis duobus cubis, invenire alios duos, quorum differentia æquet datorum differentiam. Oportet autem duplum minoris exceedere majorem.

Canon : Productum ex utroque cubo ter in latus alterius divide per summam cuborum:

¹⁾ Voir l'observation suivante.

a majore quotiente aufer minus latus, a minore quotiente aufer majus latus, relinquentur latera quæsitorum cuborum.

Hujus quæstionis determinationem non esse legitimam, simili quâ usi in prima quæstione sumus operatione, aperiemus.

Imo ex supradictis quæstionem, quam Bachetus ignoravit, feliciter construemus :

Datum numerum ex duobus cubis compositum in duos alios cubos dividere.

idque infinitis modis per operationum continuataum, ut supra monimus, iterationem.

Sint duo cubi quibus alii duo æquales inveniendi 8 et 1. Primum ex quæstione secunda quaerantur duo cubi quorum differentia æquet summan datorum, eruntque

$$\frac{8000}{343} \text{ et } \frac{4913}{343},$$

Quia duplum minoris excedit majorem, res deducitur ad tertiam quæstionem, quæ demum reductetur ad primam, et constabit propositiō.

Si velis secundam solutionem, rursus quæstio redibit ad secundam etc.

Ut autem pateat quæstionis tertiae determinationem non esse legitimam, datis duobus cubis 8 et 1, inveniendi alii duo quorum differentia æquet differentiam datorum.

Sane Bachetus impossibilem hanc quæstionem pronuntiaret; cubi tamen duo per nostram methodum inventi sunt sequentes quorum nempe differentia æquatur 7, differentiæ 8 et 1. Cubi autem illi duo sunt

$$\frac{2024}{6128} \frac{284625}{487} \text{ et } \frac{1981}{6128} \frac{385216}{487},$$

latera ipsorum

$$\frac{1265}{183} \text{ et } \frac{1256}{183},$$

X (p. 146).

(Ad commentarium in quæstion. XI Libr. IV.)

QUESTIO DIOPHANTII : Invenire duos cubos suis æquales lateribus.

QUESTIO BACHETI : Invenire duos cubos quorum summa ad summam laterum sit in data ratione, dummodo denominator rationis sit quadratus vel triens quadrati.

Eadem addenda huius determinationi quæ in notis sequenti (¹) addidimus, et miror Bachetum non quod methodum generalem, quæ sane est difficilis, non viderit, sed quod saltem non admonuerit lectorem hanc quæ ab ipso traditur non esse generalem.

XI (p. 148).

(Ad quæstion. XII Libr. IV.)

Invenire duos cubos quorum intervallum æquale sit intervallo laterum ipsorum.

Utrum verò invenire licet *duos quadratoquadratos quorum intervallum æquale sit intervallo laterum ipsorum*, de hoc inquiratur et tentetur artificium nostræ methodi, quod hanc dubie succedit.

Quærantur enim duo quadratoquadrati ita ut differentia laterum sit 1, et differentia quadratoquadratorum sit cubus. Erunt latera, per primam operationem,

$$-\frac{9}{22} \quad \text{et} \quad -\frac{13}{22}.$$

Sed, quia primus numerus notatur signo —, iteretur operatio juxta

(¹) Voir Observation XII. Soit à résoudre

$$\frac{x^3 + y^3}{x + y} = a;$$

le procédé de Bachet revient à éliminer y en posant $x + y = z$. On a alors

$$3x^2 - 3xz + z^2 = a,$$

équation qui se traite facilement par les méthodes de Diophante, si a est carré ou triple d'un carré.

$$\begin{array}{ll} \text{nostram methodum et ponatur primum latus} & 1N - \frac{3}{22}; \\ & \text{secundum erit} \\ & 1N + \frac{13}{22}, \end{array}$$

et incidetur in novam operationem quae in veris numeris questioni satisfaciet.

XII (p. 148).

(Ad commentarium in eamdem questionem.)

QUESTIO BACHETI: Invenire duos cubos, quorum intervallo ad intervallum laterum dataum habeat rationalem, dummo lo denominator rationis sit quadratus vel triens quadrati.

Determinatio est illegitima, quia non generalis. Addendum igitur « vel multiplex per numeros primos qui superant unitate ternarii multiplicies aut ab ipsis compositos », ut 7, 13, 19, 37, etc., vel 21, 91, etc. Demonstratio et constructio ex nostra methodo petendae.

XIII (p. 154).

(Ad question. XVII Libr. IV.)

Invenire tres numeros aequales quadrato, ita ut quadratus eujuslibet ipsorum ad sequeente numero faciat quadratum.

Elegantius fortasse ita solvetur haec questione.

Ponatur primus numerus $1N$,

$$\begin{array}{ll} \text{secundus} & 2N + 1, \text{ ut cum quadrato primi conficiat} \\ & \text{quadratum;} \end{array}$$

ponatur tertius quilibet unitatum et numerorum numerus, eà conditione ut additus quadrato secundi conficiat quadratum; verbi gratia, sit

$$4N + 3.$$

Ita igitur duabus propositi partibus fit satis; superest ut summa trium, sed et quadratus tertii unà cum primo, conficiat quadratum.

$$\begin{array}{ll} \text{Summa trium est} & 4 + 7N; \\ \text{summa verò quadrati tertii et primi est} & 9 + 25N + 16Q, \end{array}$$

oriturque duplicata aequalitas, cuius solutio in promptu si unitates quadratas ad eundem numerum quadratum in utrovis numero quadrato adaequando revocet.

Eademque via facillime extendetur questio ad quatuor numeros et infinitos; cayendum enim solummodo erit ut summa unitatum, que in singulis numeris ponuntur, conficiat quadratum: quod quidem facilissimum est.

XIV (p. 156).

(Ad quæstion. XVIII Libr. IV.)

Invenire tres numeros aequales quadrato, ut eujusvis ipsorum quadratus, dempto qui cum ordine sequitur, faciat quadratum.

Eodem quo in superiori quæstione usi sumus ratiocinio, hanc quoque solvemus et ad quotlibet numeros extendemus.

XV (p. 159).

(Ad quæstion. XX Libr. IV.)

Invenire tres numeros indefinite, ut quem bini producunt mutua multiplicatione, adscitâ unitate, faciat quadratum.

Proponatur invenire tres numeros ut quem bini producunt mutua multiplicatione, adscitâ unitate, faciat quadratum, et præterea unusquisque trium, adscitâ unitate, faciat quadratum.

Hujus quæstionis solutionem subjungemus et jam confecta est ⁽¹⁾. Ita fiat solutio indefinite præsentis quæstionis ⁽²⁾ ut unitates primi et tertii numeri, additâ unitate, conficiant quadratos: verbi gratia, sint

⁽¹⁾ Diophante (V, 3) a donné une solution de ce problème dans le cas général où le nombre à ajouter (ici l'unité) est quelconque.

⁽²⁾ La solution $\frac{205}{579}$ de Diophante peut être représentée par les trois nombres

$$m^2N - 2m, \quad N, \quad (m+1)^2N + 2(m+1).$$

tres numeri indefinite

$$\text{primus. } \frac{169}{5184}N + \frac{13}{36},$$

$$\text{secundus. } 1N,$$

$$\text{tertius. } \frac{7225}{5184}N + \frac{85}{36}.$$

Patet solutionem hanc indefinitam satisfacere conditionibus hujus quæstionis vicesimæ; superest ut singuli ex illis numeris, adscitâ unitate, conficiant quadratos et orietur triplicata æqualitas, cuius solutio erit in promptu ex nostra methodo, quum numerus unitatum in quolibet ex istis numeris unitate auctis sit quadratus.

XVI (p. 161).

(Ad quæstion. XXI Libr. IV.)

Invenire quatuor numeros, ut qui sit ex binorum mutua multiplicatione, adscitâ unitate, faciat quadratum (¹).

Inveniantur tres numeri quilibet ut qui sit binorum mutuâ multiplicatione, adscitâ unitate, faciat quadratum: verbi gratia, sint illi numeri 3, 1, 8.

Queratur jam quartus eâ conditione ut qui sit sub tribus inventis signillatim in quartum, adscitâ unitate, sit quadratus. Ponatur inventus esse $1N$; ergo

$$3N+1, \quad \text{item } 1N+1, \quad \text{item } 8N+1$$

æquantur quadrato et oritur triplicata æqualitas cuius solutio inventioni nostræ debetur. Vide quæ adnotavimus ad quæstionem 24 Libri VI.

(¹) Fermat donne de ce problème une solution différente de celle de Diophante.

XVII (p. 165).

(Ad quæstion. XXIII Libr. IV.)

Invenire tres numeros, ut solidos sub ipsis contentus adscito quolibet ipsorum faciat quadratum.

Non solum absque lemmate Diophanti (¹), sed etiam absque duplicata æqualitate (²), solvetur quæstio.

Ponatur solidum sub tribus primis numerorum sit secundus unitas, tertius.

Ha namque duobus partibus propositionis satisfit,

Pro tertio, dividatur solidum sub tribus, 1Q - 2N, per rectangu-

Soient x_1, x_2, x_3 les trois nombres cherchés. La solution de Diophante revient à poser

$$x_1 = 1, \quad x_1 x_2 x_3 = x^2 + 2x, \quad x_1 x_2 x_3 + x_2 = (x+m)^2;$$

100

$$x_2 = 2(m-1)x + m^2 \quad \text{et} \quad x_3 = \frac{x^2 + 2x}{2(m-1)x + m^2}.$$

Il reste ainsi à satisfaire à une dernière condition, à savoir que $x_1x_2x_3 \cdots x_3$ soit carré. Le lemme employé par Diophante consiste de fait à déterminer m en sorte que x_3 soit linéaire en x_3 , c'est-à-dire à satisfaire à la relation

$$\Omega(n+1) = \frac{1}{n} n^2;$$

11

$$m=2 \quad \text{et} \quad x_3 = \frac{1}{2}x, \quad \text{avec} \quad x_2 = 2x + 4,$$

11.11.2011

$$x_1 x_2 x_3 + x_3 = x^2 - \frac{5}{2} x,$$

expression qu'il est facile de rendre carrée. Il est aisément de voir que la solution de Fermat est au fond la même; car on la retrouve, si l'on change x en $N - 2$.

(2) L'emploi de la *double équation* était indiqué par Bachet, d'après la marche suivie par Diophante lui-même dans le problème suivant, qui ne diffère de celui-ci que parce que chacun des nombres cherchés doit être non pas ajouté, mais retranché du produit des trois, pour former les expressions à égaler à des carrés. Ici Bachet posait de fait

$$x_1 = x, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = x + 1,$$

et il ramenait le problème à la *double équation*

$$x^2 - x + 1 \equiv z^2, \quad x^2 - 1 \equiv y^2.$$

lum sub primo et secundo, quod est $2N$; orietur ex hac divisione tertius, $\frac{1}{2}N - 1$, quo addito ad solidum sub tribus fit

$$1Q = \frac{3}{2}N - 1, \quad \text{quod æquari debet quadrato.}$$

Oportet autem valorem numeri majorem esse binario, propter positiones jam factas; æquetur igitur quadrato cuius latus $1N - 1$ aliquo unitatum numero binario majori. Omnia constabunt.

XVIII (p. 180).

(Ad commentarium in quæstion. XXXI Libr. IV)

Quæstio : Invenire quatuor numeros quadratos, quorum summa, cum summâ laterum coniuncta, numerum imperatum faciat (¹).

Imo propositionem pulcherrimam et maxime generalem nos primi deteximus : nempe omnem numerum vel esse triangulum vel ex duobus aut tribus triangulis compositum ; esse quadratum vel ex duobus aut tribus aut quatuor quadratis compositum ; esse pentagonum vel ex duobus, tribus, quatuor aut quinque pentagonis compositum ; et sic deinceps in infinitum, in hexagonis, heptagonis et polygonis quibuslibet, enuntiandâ videlicet pro numero angulorum generali et mirabili propositione.

Ejus autem demonstrationem, quæ ex multis variis et abstrusissimis numerorum mysteriis derivatur, hic apponere non licet : opus enim ei librum integrum huic operi destinare decrevimus et Arithmeticen hac in parte ultra veteres et notos terminos mirum in modum promovere.

(¹) Ce problème, comme le remarque Bachet, se ramène facilement à décomposer un nombre donné en quatre carrés, question que Diophante n'a soumise à aucune règle, mais qu'il semble considérer comme toujours possible. Bachet affirme qu'en effet tout nombre entier doit être ou carré ou somme de 2, 3, ou 4 carrés entiers; il n'en a pas la démonstration, mais il s'en réfère à l'induction, donne le Tableau de la composition pour tous les nombres de 1 à 120, et ajoute qu'il a poussé l'expérienee jusqu'à 325.

XIX (p. 188).

(Ad quæstion. XXXV Libr. IV.)

Datum numerum dividere in tres numeros, ut qui sit primo in secundum dueto, sive addito tertio, sive detracto, quadratum faciat. Esto datus 6.

Ita facilius fiet operatio: Datus numerus 6 nteumque dividatur, verbi gratia in 5 et 1. Productus demptâ unitate, hoc est 4, per 6, datum numerum, dividatur: eveniet $\frac{2}{3}$. Quem si tum a 5, tum ab 1 abstuleris, duo residua $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3}$ erunt due priores partes numeri dividendi; tertia igitur erit $\frac{1}{3}$ (¹).

XX (p. 203).

(Ad commentarium in quæstion. XLIV Libr. IV.)

QUESTIO — Invenire tres numeros, ut compositus ex tribus multiplicatis in primum faciat triangulum, in secundum faciat quadratum, in tertium faciat cubum.

BACHETUS. — ... Adverte postremo, in fingendo latere ultimi quadrati, talen adhibendam esse cautionem, ut valor Numeri reperiatur in integris numeris, quum numerus triangulus non posset esse nisi integer. Id autem semper succedet operando modo a Diophanto tradito, si quadrati latius singatur a tot Numeris qui sint latibus quadratorum in numero quadrato aequando contentorum — 1. Caeterum vix aliter id fieri posse, satis experiendo deprehendes (²).

Experientiam non satis exactam fecit Bachetus. Suntiaatur quilibet

(¹) La solution de Fermat, fondée sur une identité facile à reconnaître, est essentiellement différente de celle de Diophante.

(²) La solution de Diophante, avec les généralisations de Bachet, peut se représenter comme suit.

Soient x_1 , x_2 , x_3 les trois nombres cherchés. Posons

$$x_1 + x_2 + x_3 = x^2$$

et

$$x_1 = \frac{x(x+1)}{2x^2}, \quad x_2 = \frac{\beta^2}{x^2}, \quad x_3 = \frac{\gamma^2}{x^2},$$

il vient

$$x^3 = \frac{x(x+1)}{2} + \beta^2 + \gamma^2.$$

Posons maintenant

$$\beta = x^2 - z^2,$$

cubus, verbi gratia, ejus latus multiplie ternarii superaddat unitatem. Erunt, verbi gratia,

$$\begin{aligned} & 7Q = 344 \quad \text{aequanda triangulo :} \\ \text{ergo} \quad & 16Q = 3750 \quad \text{aequabuntur quadrato,} \end{aligned}$$

ejus latus finges, si libet,
 $\sqrt[3]{N} = 3.$

Etc.; nihil enim vetat quominus generali methodo, loco etiam ipsius 3, reliquos in infinitum impares usurpemus, variando cubos.

XXI (p. 309).

(Ad commentarium in quæstion. XLV Libr. IV.)

QUESTIO DIOPHANTII. — Invenire tres numeros, ut intervallum majoris et mediū ad intervallum mediū et minoris datam habeat rationem, sed et bini sumpti quadratum confiant.

BACHETUS. — ...Quemadmodum ergo in hac questione Diophantus docet modum quo duo numeri simul aequantur quadrato, quum uterque compouitur ex Numeris et unitatibus, et numeri Numerorum sunt inæquales, nec habent rationem quadrati ad quadratum, numeri autem unitatum sunt inæquales et quadrati: sic aio modum dari posse resolvendi duplicitam aequalitatem, quum uterque propositorum numerorum quadrato aequandorum compouitur ex Numeris et unitatibus, et numeri Numerorum sunt inæquales, nec habent

on a

$$\frac{z(z+1)}{2} = 9z^2x^2 - z^4 - \gamma^3,$$

d'où l'on posera

$$(2z+1)^2 = 16z^2x^2 - 8z^4 - 8\gamma^3 + 1 = (4zx - 3)^2$$

et

$$x = \frac{8z^4 + 8\gamma^3 + 3^2 - 1}{8z^2}.$$

Mais il faut que z soit entier et, par conséquent, que $\frac{8z^4 + 8\gamma^3 + (3+1)^2}{16z^2}$ le soit.

Si l'on prend $z = 1$, comme l'a fait Diophante, et comme Bachet l'a cru nécessaire, on peut prendre tout à fait arbitrairement les entiers z et γ .

Fermat prend $z = 1$, comme l'avait fait Diophante; il fait d'ailleurs, dans l'exemple qu'il choisit,

$$\gamma = 7, \quad \delta = 3$$

cationem quadrati ad quadratum, sed et numeri unitatum inaequales sunt, sive quadrati sint, sive non. Id autem præstabimus in duplice casu.

Primus casus est, quum numerorum quadrato æquandorum intervallum tale est ut, eo per aliquem unitatum numerum multiplicato vel diviso, et producto vel quotiente a minore propositorum numerorum detracto, supersit unitatum numerus solus quadratus...

Secundus casus est, quum numerorum quadrato æquandorum intervallum tale est ut, eo per aliquem unitatum numerum multiplicato vel diviso, et producto vel quotiente a minore propositorum numerorum detracto, deficiat unitatum numerus solus, qui ad multiplicatorem vel divisorem rationem habeat quadrati ad quadratum ...

Sed proponatur, si placet, hæc duplicata æqualitas, nempe

$$2N + 5 \quad \text{et} \quad 6N + 3 \quad \text{æquandi quadrato.}$$

$$\text{Quadratus æquandus } 2N + 5 \quad \text{erit} \quad 49,$$

et

$$\text{quadratus æquandus } 6N + 3 \quad \text{erit} \quad 36,$$

et invenientur alii in infinitum quæstioni satisfacientes. Nec difficile est regulam generalem ad hujusmodi quæstionum solutionem propo-nere, ut vix limitatio ista Bacheti sit tanto viro digna, quum ad infinitos casus extendi quod in duobus tantum adinvenit, facillime possit, imo et ad casus omnes possibles.

XXII (p. 45).

(Ad quæstion. III Libr. V.)

Dato numero apponere tres numeros, ut quilibet ipsorum et qui a binis producitur quibusvis, datum adsumens numerum, faciat quadratum.

Ex hac propositione facile deducetur sequens questio :

Invenire quatuor numeros ea conditione ut quod sub binis producatur, ascito dato numero, faciat quadratum.

Inveniantur tres quæstioni satisfacientes ita ut singuli dato numero ancti conficiant quadratos juxta hanc propositionem. Ponatur quartus inveniendus esse $4N + 1$. Orietur triplicata æqualitas ejus solutio-

nostræ methodi beneficio erit in promptu. Vide adnotata ad 24^{am} quæstionem Libri VI.

Solvetur itaque quæstio, quam proposuit Bachetus (¹) ad quæstionem 12 Libri III, per hanc methodum quæ, quum multo sit generalior, hoc præterea amplius habet quam methodus Bacheti, quod tres priores numeri aucti dato numero conficiant quadratos in nostra solutione.

An vero ita solvi possit quæstio *ut etiam quartus auctus dato numero conficiat quadratum*, hoc sane hactenus ignoramus : inquiratur itaque ulterius (²).

XXIII (p. 220).

(Ad quæstion. VIII Libr. V.)

Invenire tria triangula rectangula quorum areae sint æquales.

Num vero inveniri possunt quatuor aut etiam plura in infinitum triangula æqualis areae, nihil videtur obstare quominus quæstio sit possibilis : inquiratur itaque ulterius.

Nos hoc problema construximus, imo et data quælibet trianguli

(¹) Page 110. — Soient x_1, x_2, x_3, x_4 les quatre nombres cherchés, et a le nombre donné.

La solution de Bachet revient à poser

$$x_1 = \frac{u^2 - a}{v - u}, \quad x_2 = \frac{v^2 - a}{v - u}, \quad x_3 = 2(x_1 + x_2) - (v - u),$$

ce qui satisfait aux conditions pour trois nombres. Si, pour le quatrième, on pose

$$x_4 = v - u,$$

on n'aura évidemment qu'à satisfaire en outre à la condition bien facile que

$$x_3 x_4 + a \quad \text{ou} \quad (v + u)^2 - 3a$$

soit un carré indéterminé.

Bachet l'a résolue, en fait, de deux façons différentes : 1^o par rapport à $v - u$, en se donnant a ; 2^o par rapport à a , en se donnant $v - u$, qu'il suppose inutilement devoir être un carré.

(²) Dans l'Observation XVI, Fermat a donné une solution pour le cas où le nombre à ajouter est l'unité.

area infinita triangula ejusdem areae exhibemus : verbi gratia, data area 6 trianguli 3, 4, 5., en alind triangulum ejusdem areae

$$\frac{7}{10}, \quad \frac{120}{7}, \quad \frac{1201}{70}.$$

aut, si placet eadem denominatio,

$$\frac{49}{70}, \quad \frac{1200}{70}, \quad \frac{1201}{70}.$$

Perpetua et constans methodus haec est : Exponatur quodlibet triangulum, cuius hypotenusa Z , basis B , perpendiculum D . Ab eo sic formatur aliud triangulum dissimile ejusdem areae : nempe formetur abs Z quadrato et B in D bis, et planopiana lateribus similia applicentur Z in B quadratum bis — Z in D quadratum bis. Hoc novum triangulum habebit aream aequalēm areae precedentis.

Ad hoc secundo eādem methodo formetur tertium, a tertio quartum, a quarto quintum, et fient triangula in infinitum dissimilia ejusdem areae.

Et ne dubites plura tribus dari posse, inventis tribus Diophanti

$$40, 42, 58., \quad 24, 70, 74., \quad \text{et} \quad 15, 112, 113.,$$

quartum adjungimus dissimile ejusdem tamen areae :

$$\frac{112}{1189} \frac{881}{1189} \text{ hypotenusa,}$$

$$\frac{112}{1189} \frac{880}{1189} \text{ basis,}$$

$$\frac{1681}{1189} \text{ perpendiculum,}$$

et, omnibus in eundem denominatorem ductis, fient quatuor triangula in integris aequalis areae quae sequuntur :

Primum	47 560.	49 938.	68 962.
Secundum	98 536.	83 230.	87 986.
Tertium	17 835.	133 168.	134 357.
Quartum	1 681.	1 412 880.	1 412 881.

eàdemque methodo invenientur triangula ejusdem areae in infinitum et quæstio sequens ultra Diophanteos limites progredietur.

En etiam aliâ methodo (¹) triangulum ejus area facit sextuplum quadrati, sicut 3, 4, 5.; nempe

$$\frac{2}{3} \cdot 896 \cdot 804, \quad \frac{7}{2} \cdot 216 \cdot 803, \quad \frac{7}{2} \cdot 776 \cdot 485.$$

(¹) J. DE BILLA (*Doctrinæ analyticæ inventum novum*, I, 38, p. (1)) : « Diophantus L. V. q. 8 tradit artem inveniendi triâ triangula rectangula quæ sint aequalia quoad aream. Qui vero plura ab ipso expetet, nunquam obtinebit: præterea nunquam tradidit Diophantus methodum inveniendi triangulum dato triangulo aequale quoad aream. Fermatius utrumque inox atque eàdem operatione præstabit. »

« Sit verbi gratia inveniendum triangulum ejus area sit 6, qualis est area trianguli rectanguli 3, 4, 5. »

« Esto unum latus enjuspianum trianguli rectanguli 3, et alind latus sit $1N + 4$. Horum quadrata simul sumpta exhibent

$$25 + 1Q + 8N$$

pro quadrato hypotenuse: quare iste numerus aequatur quadrato. »

« Deinde area istius trianguli, $\frac{3}{2}N = 6$, debet esse sextupla alicuius quadrati (quia possunt latur area esse 6): ergo ejus areae sextans quadratus est, ac proinde ille ductus in 36 efficit quadratum. Efficit autem

$$9N + 36:$$

igitur hic numerus aequalandus est quadrato.

« En igitur duos terminos duplicate aequalitatis :

$$9N + 36 \quad \text{et} \quad 25 + 1Q + 8N.$$

In his autem unitatum numerus quadratus est: ergo valor radieis facile reperietur, eritque

$$\sqrt{\frac{60}{21} \cdot \frac{530}{650} \cdot \frac{400}{409}},$$

ac proinde

$$1N + 4 \quad \text{erit} \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{896}{105} \cdot \frac{804}{601}.$$

Aliud autem latus circa rectum est 3. Igitur horum quadrata simul sumpta faciunt quadratum ejus latus

$$\sqrt{\frac{776}{405} \cdot \frac{485}{601}}$$

erit hypotenusa. Ergo habes triangulum rectangulum

$$\sqrt{\frac{776}{405} \cdot \frac{485}{601}}, \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{896}{105} \cdot \frac{804}{601}, \quad 3$$

enjus area est sextupla enjuspian quadrati, nempe

$$\frac{724}{3} \cdot \frac{201}{105} \cdot \frac{601}{601};$$

XXIV (p. 221).

(Ad quæstion. IX Libr. V.)

Invenire tres numeros ut uniuscujusque quadratus, summā trium sive additā sive detractā, faciat quadratum.

Ex supradictis patet posse nos construere generaliter problema :

Invenire quotcumque numeros ut uniuscujusque quadratus, summā omnium sive additā sive detractā, quadratum faciat (¹).

Hanc quæstionem forte Bachetus ignoravit : Diophantum quippe promovisset, ut supra 31^a questione Libri IV et aliis in locis, si quæstionis hujus solutionem detexisset.

XXV (p. 224).

(Ad commentariorum in quæstion. XII Libr. V.)

QUESTIO DIOPHANTI. — Unitatem dividere in duas partes, et utriusque segmento datum numerum adjicere et facere quadratum. Oportet autem datum neque imparem esse * neque

hujus vero quadrati latus est

$$\frac{851}{1551}.$$

Per quod si dividas singula latera trianguli mox reperti, habebis triangulum quæsumum

$$\frac{12\ 061\ 328\ 235}{2\ 047\ 166\ 451}, \quad \frac{4\ 492\ 943\ 004}{2\ 047\ 166\ 451}, \quad \frac{4\ 653}{851},$$

cujus area est 6. *

Adverte nos invenisse hoc triangulum per illud quod datum fuit 3, 4, 5, ac per invenitum inveniri posse tertium: per tertium invenietur quartum, et sic in infinitum. *

(1) La question V. 9 de Diophante se résout en effet par une application immédiate de la solution du problème précédent.

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ les hypoténuses de n triangles rectangles ayant une même aire A, comme

$$\alpha_p^2 \pm 4A \text{ est carré,}$$

les nombres

$$\frac{\alpha_p \sum_{i=1}^n \alpha_i}{4A}$$

satisfiront à la question posée par Fermat.

duplum ejus N. unitas majorem habere quadrantem quam est numerus, quo ipsum metitur primus numerus * (1).

BACHETUS.... Reliqua verò verba « *neque duplum ejus, etc.* » adeo vitiata sunt ut nullam commode recipere possint explicacionem. Non dubito quidem Diophantum respxisse ad aliquam numerorum non vulgarem proprietatem, qua definitur quis numerus par diligendus sit, ut duplum ejus unitate auctum sit quadratus numerus vel compositus ex duobus quadratis. Sed quid sibi velit in tanta verborum caligine divinare non possum: id oneris relinquam illi qui in codicem aliquem emendationem inciderit.... Sane quod ait Xilander, verba illa corrupta videri velle, debere eum qui datur esse duplum numeri primi, id utique futile est et nulli fundamento nixum, quodque ipsa statim experientia refelli potest: nam, si datus sit 10, is est duplus numeri primi 5 et tamen questioni sedvende minime reperitur idoneus, nam oportet dividere in duos quadratos numerum 21. Quod quidem impossibile est, ut reor, quum is neque quadratus sit, neque snapte natura compositus ex duobus quadratis.

Numerus 21 non potest dividi in duos quadratos in fractis. Hoc autem facillime demonstrare possumus, et generalius omnis numerus cuius triens non habet tridentem non potest dividi in duos quadratos neque in integris neque in fractis.

XXVI (p. 25).

(Ad idem commentarium.)

BACHETIS. — Aliquando mihi venit in mentem Diophantum voluisse duplum dati numeri paris unitate auctum esse numerum primum, quandoquidem omnes fere hujusmodi numeri componuntur ex duobus quadratis, quales sunt 5, 13, 17, 29, 41, aliisque primi numeri qui sublata unitate relinquunt numerum pariter parem. Verumtamen neque haec explicatio sustineri potest. Nam primum hac ratione per hujusmodi conditionem excluderentur omnes numeri, quorum duplum unitate auctum est quadratus numerus.... Deinde excluderentur etiam multi numeri, quorum duplum unitate auctum componitur ex duobus quadratis, quales sunt 22, 58, 62 et alii innumerabiles. Nam dupli horum unitate aucti sunt 45, 117.

(1) Le texte grec correspondant à ce passage incompréhensible de la version latine est le suivant dans l'édition de Bachet (leçon du manuscrit fonds grec n° 2379 de la Bibliothèque Nationale) :

$\mu\nu\tau\varepsilon\delta\eta\delta\pi\lambda\sigma\tau\omega\eta\mu\bar{\nu}\bar{\tau}$, $\mu\bar{\varepsilon}\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\chi}\bar{\eta}\bar{\eta}\mu\bar{\varepsilon}\bar{\rho}\bar{\sigma}\bar{\delta}$, $\bar{\eta}\mu\bar{\varepsilon}\bar{\rho}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\chi}\bar{\alpha}\bar{\varepsilon}\bar{\pi}\bar{\sigma}\bar{\delta}\bar{\tau}\bar{\omega}\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}$,
et, d'après Bachet, dans un *Vaticanus graecus* (probablement le n° 304) :

$\mu\nu\tau\varepsilon\delta\eta\delta\pi\lambda\sigma\tau\omega\eta\mu\bar{\nu}\bar{\tau}\bar{\mu}\bar{\rho}\bar{\mu}\bar{\delta}\bar{\eta}$, $\mu\bar{\varepsilon}\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\chi}\bar{\eta}\bar{\eta}\mu\bar{\varepsilon}\bar{\rho}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\chi}\bar{\alpha}\bar{\varepsilon}\bar{\pi}\bar{\sigma}\bar{\delta}\bar{\tau}\bar{\omega}\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}$,
 $\bar{\eta}\mu\bar{\varepsilon}\bar{\rho}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\chi}\bar{\alpha}\bar{\varepsilon}\bar{\pi}\bar{\sigma}\bar{\delta}\bar{\tau}\bar{\omega}\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}$.

Ces deux leçons reviennent à la même, et tous les manuscrits connus de Diophante sont corrompus de la même façon.

15, quorum nullus est primus numerus, quinque quilibet multos habeat metentes: unusquisque tamen e duobus quadratis conflatur, primus scilicet ex quadratis 36 et 9, secundus ex quadratis 81 et 36, tertius ex quadratis 100 et 25.

Vera limitatio haec est, generalis nempe et omnes numeros inutiles excludens :

Oportet datum numerum non esse imparem, neque duplum ejus unitate auctum, per maximum quadratum ex quo mensuratur divisum, dividi a quovis numero primo unitate minori quam multiplex quaternarii.

XXVII (p. 232).

(Ad commentarium in quæstion. XIV Libr. V.)

QUESTIONE DIOPHANTINI. — Unitatem dividere in tres numeros et unilibet addere datum eundem numerum et ita quilibet quadratum facere. Oportet autem datum neque binarium esse neque aliquem eorum qui fit addito binario ad octonarii multiplicem.

BACHETIS Ingeniosa est et autore digna hujusmodi limitatio. Caeterum quamvis, ut ostensum est, haec conditio sit necessaria, non est tamen sufficiens, nam non solum numeri omnes hac limitatione comprehensi solvendæ quæstioni sunt inutiles, sed præterea numerus 9 et omnes alii qui sunt addito 9 ad 3x vel ad aliquem ejus multiplicem, quales sunt 41, 73, 105, etc.; nam horum triplum additum unitate neque quadratus est neque numerus e duobus vel tribus quadratis compositus....

Caeterum an haec duas limitationes simul sufficientes sint, ita ut per utramque simul excludantur omnes omnino numeri quorum triplum unitate auctum non est quadratus nec e duobus vel tribus quadratis compositus, non ausim temere affirmare. Evidem vix adducor ut aliter sentiam, quum in omnibus numeris ab unitate usque ad 325 id sius expertus.

Limitatio ipsa Bacheti est insufficiens, imo nec ipsius experientia satis fuit accurata, nam 37 numerus cadit in limitationem, non autem in regulam.

Vera limitatio sic concipi debet :

Exponantur duæ progressiones quadruplæ altera ab unitate, altera ab octonario, et una alteri superponatur sic :

$$\begin{array}{cccccccc} 1, & 4, & 16, & 64, & 256, & 1024, & 4096, & \text{etc.}, \\ 8, & 32, & 128, & 512, & 2048, & 8192, & 32768, & \text{etc.} \end{array}$$

et considerando primo terminum primum secundæ qui est 8, oportet

datum numerum non esse duplum unitatis, quia ipsi superponantur unitas, neque superare duplo unitatis multiplicem 8.

Deinde, considerando secundum terminum secundae progressionis, qui est 32, sumatur duplum numeri superpositi qui est 4 : fit 8, cui si addas omnes in eadem progressionе superiori proxime antecedentes (in hoc exemplo invenietur sola unitas), fit 9.

Sumptis igitur duobus numeris 32 et 9, oportet datum numerum neque esse 9 neque superare dicto numero 9 multiplicem 32.

Consideretur mox tertius progressionis secundae terminus, qui est 128 : sumatur duplum numeri superpositi, qui est 16 : fit 32, cui si addas omnes in eadem progressionе superiori proxime antecedentes, qui jam sunt 1 et 4, fit 37. Sumptis igitur duobus numeris 128 et 37, oportet datum numerum neque esse 37, neque superare dicto 37 multiplicem 128.

Considerato deinde quarto progressionis secundae termino, fient ex methodo numeri 512 et 149. Oportebit itaque numerum neque esse 149, neque superare dicto 149 multiplicem 512.

Et est uniformis et perpetua in infinitum methodus, quam neque Diophantus generaliter indicavit, nec Bachetus ipse detexit, enjus vel ipsa experientia fallit, ut jam præmonuimus, non solum in numero 37 qui est intra limites experientiae de qua fidem facit, sed etiam in numero 149 et aliis.

XXVIII (p. 241).

(Ad quæstion. XIX Libr. V.)

Invenire tres numeros, ut cubus summae eorum, quovis ipsorum detracto, faciat eum. Ponatur rursus trium summa $\tau\ N.$, et ipsi $\frac{7}{8} C.$, $\frac{26}{27} C.$, $\frac{63}{64} C.$. Superest ut tres coniuncti aequaliter $\tau\ N.$, fit ergo $\frac{4877}{1728} C$ aequale $\tau\ N.$, et omnia per numerum dividantur, fit $\frac{4877}{1728} Q$ aequale 1, est autem 1 quadratus. Oportebat ergo et numerum quadratorum esse quadratum : unde autem is natus est ? Quod a ternario subducti sunt tres cubi,

Εὑρεσίν τρεῖς ἀριθμούς, ὅπως ἡ ἑπτὸς συγκειμένου ἐκ τῶν τριῶν κύβος λείψεις ἔκαστον ποτὲ κύβον. τετράγωνα πάλιν οἱ τρεῖς ζεῦχοι, καὶ κύβον δὲ μὲν κύβον ζεῦχος, δὲ κύβον ζεῦχος, δὲ κύβον ζεῦχος. λοιπόν ἔστι τοὺς τρεῖς τεσσάρας ζεῦχοι, γίνεται κύβοιν διπλάσια, οἷον ζεῦχοι πάντα παρὰ ἀριθμόν, καὶ γίνεται δυναμοστὸν διπλάσιον. οἷον μὲν ζεῦχος, καὶ ἔστιν γε μονάς τετράγωνος. δεύτερος ζεῦχος καὶ τὰς δυνάμεις εἶναι τετράγωνον. πόθεν

quorum quilibet minor est unitate. Eo itaque res reddit, ut inveniantur tres cubi, quorum quilibet sit minor unitate, summa autem ipsorum a ternario sublata, faciat quadratum. Et quia volumus cuborum quemque minorem esse unitate, si statuamus tres numeros simul unitate minores, multo minores singuli erunt unitate. Sic autem quadratum qui relinquetur oportebit majorem esse binario. Statuatur quadratus qui relinquitur $2^{\frac{1}{2}}$. Oportet igitur $\frac{1}{2}$ dividere in tres cubos et horum multiplicia secundum aliquos cubos divisa. Esto secundum 16. Oportet igitur ut dividamus 162 in tres cubos. At 162 componitur ex cubo 125 et intervallo duorum cuborum, 64 et 27. Habemus autem in porismatis, omnium duorum cuborum intervallum componi ex duobus cubis. Recurramus ad propositionum initio et sumamus unumquemque cuborum inventorium, et quilibet ab unitate subtracto, residua statuamus pro quasitis numeris et sit somma 1N. Ita fieri ut eis summe, quovis ipsorum detracto, cibum faciat. Restat ut tres simul aequaliter 1N. sit autem trium summa $2^{\frac{1}{2}}\text{C}$. Hoc ergo aequaliter 1N. unde fieri 1N. $\frac{2}{3}$. Ad positiones,

ἐστι τὸ πλῆθος τῶν δύο ἐκ τοῦ ἀπὸ τριάδος ἡραρχεῖσθαι τρεῖς κύβους, ὃν ἔκκεντος ἀλκηστῶν ἔστι μονάδος μᾶς. καὶ ἀπογετεῖ εἰς τὸ εὐρεῖν τρεῖς κύβους, ὅπως ἔκκεντος αὐτῶν ἐλίσσονται οἱ μονάδες. τὸ δὲ σύνθεμα κύτων ἡραρχεῖν ἀπὸ τριάδος ποιῆτε τετράγωνον. καὶ ἐπεὶ ζητοῦμεν ἔκκεντον κύτων κύβουν ἐλίσσοντα εἶναι μονάδος μᾶς, ἐὰν ἔρχεται κατασκευήσθωμεν τοὺς τρεῖς ἡραρχεῖσθαι ἐλίσσοντας μονάδος οἱ πολλῷ ἔκκεντος κύτων ἐλίσσοντας μονάδος οἱ. ὅπερες δὲ φέρεται ἡ καταλειπόμενος τετράγωνος μεταξὺ εἴναι δυῦδος, τετράγωνος καταλειπόμενος τετράγωνος μονάδες οἱ. δεῖ δὲ τὸν τὰς ηραρχεῖν εἰς τρεῖς κύβους, καὶ κατὰ τούτων ποιήσαπλάσια κατὰ τινῶν κύβων δικαρεθέντων. ἔστοι δὲ κατὰ τὸν οὗτον. διφείλομεν οὖν τὸν βαθὺ διελεῖν εἰς τρεῖς κύβους. σύγκειται δὲ οἱ βαθεῖτε κύβου τοῦ ὅκει καὶ δύο κύβων ὑπερογκής τοῦτο οὐδὲ καὶ τοῦ οὗτον. γέγονεν δὲ ἐν τοῖς πορίσμασιν * ὅτι πάντων δύο κύβουν οἱ ὑπερογκή οὐτέ τετράγωνον εἰς τὸ ἕξ ἡραρχεῖσθαι, καὶ τὰς σούμενες ἔκκεντον κύβουν εὐρεθέντων. τοὺς δὲ τρεῖς ἡραρχεῖσθαι οἱ. καὶ συμβίσεται τὸν ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν τριῶν κύβουν λείψαντα ἔκκεντον, ποιεῖν κύβουν. λοιπόν ἔστι τοὺς τρεῖς ισώσας οἱ οἱ. γίνονται δὲ οἱ τρεῖς οἱ μονάδες οἱ. ταῦτα θέουσι οἱ. διεν γίνεται οἱ οἱ μονάδες οἱ. επὶ τὰς ὑποστάσεις.

Solutionis modum Diophantus non exprimit aut græca corrupta sunt. Bachetus (¹) casu adjutum Diophantum arbitratur, quod tamen non admittimus, quum Diophanteam methodum non difficilem inventu existimemus.

Inveniendus quadratus binario major, ternario minor, qui a ternario subtractus relinquat numerum in tres cubos dividendum.

(¹) Il est aisément de voir que la solution particulière donnée par Diophante ne peut être obtenue avec les positions de Fermat, et l'on a dès lors le droit de répéter avec Bachet : « Quomodo rem easū factū videtur ut sumpserit autor $2^{\frac{1}{2}}$, quo de 3 sublato relinquatur $\frac{3}{2}$ ex tribus cubis compositus. »

Ponatur quæsti quadrati latus esse quælibet numerorum numerum
— unitate : verbi gratia

$$1N - 1;$$

ipsius quadratus a ternario subtractus relinquit

$$2 - 1Q + 2N,$$

eui inveniendi tres cubi æquales qui sic effingendi ut æqualitas tandem consistat inter duas tantum species proximas.

Id quidem innumeris modis construi potest : Sit unius ex cubis latus

$$1 - \frac{1}{3}N;$$

alterius (ut numerus numerorum in ambobus cubis conficiat $2N$) sit

$$1 + \frac{1}{3}N;$$

tertii latus in numeris dumtaxat fingendum, qui etiam, ne valor $1N$ quæsitos terminos evadat, debent notari signo defectūs, nec est operosum eum numerum numerorum sumere cuius valor æquationem ad præstitutos redigat terminos.

Hoc peracto, patet primum ex cubis esse minorem unitate, ut quærebamus; quum igitur secundus sit major et tertius signo defectūs notetur, patet differentiam secundi et tertii æquandam esse duobus cubis, quam ob rationem ad secundam operationem et Diophantus et nos devolvimur.

« Habemus autem » inquit « in porismatibus omnium duorum cuborum intervallum componi ex duobus cubis. »

Hæret iterum Bachetus (¹) et, destitutus porismatibus Diophanteis, hanc quæstionem secundam determinatione indigere contendit : duorum quippe cuborum intervallum è tantum conditione in duos cubos dividere docet, dummodo major datorum cuborum exceedat duplum minoris. Nam quomodo omnium duorum cuborum intervallum dividatur in duos cubos ignotum sibi ingenue profitetur. Nos supra ad

(¹) Voir Observation VIII.

questionem Libri IV secundam et hanc et reliquas hujus materiae quæstiones generaliter construendi modum feliciter deteximus.

XXIX (p. 169).

(Ad quæstion XXIV Libr. V.)

Invenire tres quadratos, ut solidus sub ipsis contentus, quovis ipsorum adsecurat quadratum faciat. Ponatur solidus ille 1Q, et querantur tres quadrati quorum quilibet ad securam unitatem faciat quadratum. Hoc autem peti potest a quovis triangulo rectangulo. Expono tria triangula rectangula, et accipiens quadratum unius laterum circa rectum, divido eum per quadratum alterius laterum circa rectum, et invenio quadratos, unum $\frac{9}{16}$ Q, alterum $\frac{25}{144}$ Q, tertium $\frac{64}{225}$ Q, et quilibet ipsorum cum 1Q facit quadratum. Restat ut solidus sub tribus contentus aequaliter 1Q. Est autem solidus ille $\frac{54499}{518400}$ CC, hoc aequaliter 1Q, et omnia ad eundem denominatorem reducendo, et dividendo per 1Q, fiunt $\frac{13499}{518400}$ QQ aequalia 1, et latus lateri aequalatur, fitque $\frac{120}{720}$ Q aequaliter 1. Est autem unitas quadratus. Quod si etiam $\frac{120}{720}$ Q quadratus esset, soluta fuissest questio. Non est autem. Eo igitur redactus sum, ut inveniam tria triangula rectangula, ut solidus sub perpendiculari ductus in solidum sub basibus faciat quadratum * cuius latus sit numerus multiplicatione ortus laterum circa rectum unius triangulorum. Et si omnia divisorimus per productum ex lateribus circa rectum invenienti rectanguli, orietur qui sit ex producto laterum circa rectum secundi in productum laterum circa rectum alterius triangulorum. Et si unum ipsorum statuamus 3, 4, 5, eo deventum est ut inveniantur duo triangula rectangula ut productus ex lateribus circa rectum producti ex lateribus circa

rectum sit 12N. Proinde et area areae 12. Si autem 12 et 3. Hoe autem facile est et est simile huic 9, 40, 41. Alterum * 5, 12, 13. (* legendum est 8, 15, 17). Habentes ergo tria triangula rectangula, revertamur ad initio propositum. Et statuamus trium quasi-torum quadratorum, alterum 9, alterum 25, tertium 81, et si solidum ex his aequumns iQ, fiet i N rationalis. Ad positiones. *

την ἀριθμὸν τοῦ οὐδὲν. οὐτε καὶ ἔμενον ἐμέτρους εἰ. εἰ δὲ τῷ καὶ τῷ ποῦτο δὲ ἑκάτον καὶ ἕστιν ὅμοιον τῷ σῷ (ἢ Βατίκ.) μ. μ. τὸ δὲ ἐπεργον τοῦ τῷ. ἔχοντες οὖν τὰ τοῖς τετραγωνικοῖς διαιρούμενα ἐργάζεσθαι εἰς τὸ εἴς τούτο. τίσσομεν τῶν ζητουμένων τριῶν τετραγωνῶν, δην μὲν θ., δην δὲ καὶ, δην δὲ πών. καὶ εἴναι τὸν εἰς τῶν δ. Σταθεόν ισάσωμεν δύο. γενηταὶ δὲ διηγέρεις. ἐπὶ τὰς ὑποστάσεις. *

Methodum Diophanti, quam non perceptit Bachetus (¹), ita restituo et explicio.

Quoniam primum triangulum est : 3, 4, 5, et rectangulum sub lateribus : 12, *cō decentum est*, inquit Diophantus, *ut inveniantur duo triangula ut productus ex lateribus circa rectum producti ex lateribus circa rectum sit duodecuplus*; et ratio est quia tunc productus ex lateribus unius in productum ex lateribus alterius producet numerum qui erit planus similis 12, atque ideo eorum mutuā multiplicatione fiet quadratus, quod vult propositio.

Sequitur Diophantus : *Proinde et area areae 12* (²), quod per se clarum est. Deinde : *Si autem 12, et 3, quia, dividendo 12 per quadratum 4, fit 3, et semper in multiplicatione oritur quadratum; nam quadratum, divisum per quadratum, facit quadratum.*

Reliqua Diophanti non præstant propositum, sed ita restituemus.

(¹) Il s'agit de trouver trois triangles rectangles en nombres (a_1, b_1, c_1) , (a_2, b_2, c_2) , (a_3, b_3, c_3) tels que l'on ait, a_1 , a_2 , a_3 étant les hypoténuses, $\frac{b_1 b_2 b_3}{c_1 c_2 c_3}$ dans un rapport carré.

Prenant arbitrairement le triangle (a_1, b_1, c_1) , soit (5, 4, 3) dans l'exemple choisi, Bachet forme les triangles suivants, respectivement des nombres a_1 , b_1 et a_1 , c_1 , c'est-à-dire il pose de fait :

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1^2 + b_1^2, & b_2 &= a_1^2 - b_1^2 = c_1^2, & c_2 &= 2a_1 b_1, \\ a_3 &= a_1^2 + c_1^2, & b_3 &= a_1^2 - c_1^2 = b_1^2, & c_3 &= 2a_1 c_1. \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{b_1 b_2 b_3}{c_1 c_2 c_3} = \left(\frac{b_1}{2a_1} \right)^2.$$

Les deux triangles ainsi construits sont (15, 9, 40) et (35, 16, 30). Au lieu du second, il prend le semblable (17, 8, 15), le rapport restant le même.

(²) Entendez *duodecupla*, et à la ligne suivante : *Si autem duodecupla, et tripla.*

In hoc casu (⁴), fingatur triangulum abs 7 et 2, alterum vero abs 5 et 2; et primum triangulorum erit triplum ad secundum, et duo proposito satisfacient. *Regula autem generalis inveniendi duo triangula rectangula in ratione data haec est :*

Sit data ratio R ad S, majoris ad minus. Majus triangulum formabitur abs

$$R \text{ bis} + S \quad \text{et} \quad R - S;$$

minus vero abs

$$R \frac{1}{2} S \text{ bis} \quad \text{et} \quad R - S.$$

Aliter.

$$\begin{array}{lll} \text{Formetur primum triangulum abs } R \text{ bis} - S & \text{et} & R + S, \\ \text{secundum} & \text{abs } S \text{ bis} - R & \text{et} \quad R + S. \end{array}$$

Aliter.

$$\begin{array}{lll} \text{Formetur primum triangulum abs } R \text{ sexies} & \text{et} & R \text{ bis} - S, \\ \text{secundum} & \text{abs } R \text{ quater} + S & \text{et} \quad R \text{ quater} - S \text{ bis}. \end{array}$$

Aliter.

$$\begin{array}{lll} \text{Formetur primum triangulum abs } R + S \text{ quater} & \text{et} & R \text{ bis} - S \text{ quater}, \\ \text{secundum} & \text{abs } S \text{ sexies} & \text{et} \quad R - S \text{ bis}. \end{array}$$

Ex jam dictis deduci potest *methodus inveniendi tria triangula rectangula in proportione trium datorum numerorum, modò duo dati numeri reliqui sint quadruplices*.

Sint, verbi gratia, dati tres numeri R, S, T, et sint ipsi R, T simul quadruplices S. Formabuntur sic tria triangula :

$$\begin{array}{lll} \text{primum} & \text{abs } R + S \text{ quater} & \text{et} \quad R \text{ bis} - S \text{ quater}, \\ \text{secundum} & \text{abs } S \text{ sexies} & \text{et} \quad R - S \text{ bis}, \\ \text{tertium} & \text{abs } S \text{ quater} + T & \text{et} \quad S \text{ quater} - T \text{ bis}. \end{array}$$

Suppsimus autem R esse majorem T.

⁴) Les triangles de Diophante ou de Bachet s'obtiennent par la seconde solution de Fermat, c'est-à-dire avec les couples génératrices 5, 4 et 4, 1. Diophante avait probablement traité, dans un problème perdu, la construction de deux triangles rectangles dont l'aile soit dans un rapport donné.

Hinc etiam elicetur modus inveniendi tria triangula rectangula numero, quorum areæ constituant triangulum rectangulum.

Eo enim deducetur quæstio ut inveniatur triangulum cujus basis et hypotenusa sint quadruplices perpendiculi. Hoe autem est facile et erit triangulum simile huic :

17, 15, 8.

Tria vero triangula sic formabuntur :

primum	abs	49	et	2,
secundum	abs	47	et	2,
tertium	abs	48	et	1.

Hinc etiam elicetur modus inveniendi tria triangula quorum areæ sint in ratione trium quadratorum datorum, quorum duo sint quadruplici reliqui, ac proinde poterunt eadem viâ inveniri tria triangula ejusdem areæ (¹); imo et infinitis modis possumus construere duo triangula rectangula in data ratione, dueendo unum ex terminis aut utrumque in quadrata data, etc.

XXX (p. 51).

(Ad quæstion. XXV Libr. V.)

Invenire tres quadratos, ut solidus sub ipsis contentus, quolibet ipsorum detracto, faciat quadratum. Ponatur solidus sub ipsis contentus 1Q, et rursus quadrati qui queruntur, sumantur ex triangulis rectangularibus, unus a $\frac{16}{25}$, alter a $\frac{25}{16}$, tertius a $\frac{64}{89}$; statuo eos in quadratis, et manet 1Q, quilibet ipsorum detracto, faciens quadratum. Superest ut solidus sub tribus contentus aequaletur 1Q : est autem solidus ille $\frac{25600}{1221025}$ CC; hoc ergo aequalatur 1Q, et omnia per 1Q dividantur, fiunt $\frac{25600}{1221025}$ QQ aequalia 1. Est autem unitas quadratus, latus habens quadratum. Ergo oportebat etiam $\frac{25600}{1221025}$ QQ esse

Εύστιν τρεῖς τετραγωνοίς, ὅπως ἡ ἐκ τούτων στερεός λεῖψης ἔκστον κύτων ποιῇ τετράγωνον. τετράγωνος δὲ κύτων στερεός δὲ οὐ. καὶ πάλιν οἱ ζητούμενοι τετράγωνοι ἀπὸ τῶν ὀρθογωνίων τοιχών, ἵνα μὲν ίσαι, τοῦ δὲ ἑτέρου κείνῳ, τοῦ δὲ ξεποντι. τέσσον κύτωνς ἐν δυνάμει, καὶ μέντοι ἡ δὲ καὶ λεῖψης ἔκστον κύτων ποιούση τετράγωνον. λοιπόν ἐστι τὸν ἐκ τῶν τριῶν στερεῶν ἴστεραι δυνάμει οὐ. καὶ ἐστιν ἡ ἐκ τῶν τριῶν στερεός κυβοκύδιον β. ξ/. ἐν μορφῷ ρχβ. χκε. τεύτα ίσα δυνάμει οὐ. καὶ πάντα παρέχει δύναμιν μίκην γίνεται δὲ δι' β. ξ/, ἐν μορφῷ ρχβ. χκε, ίση μὲν οὐ. καὶ ἐστιν ἡ μονὴς τετράγωνος πλευρὴν ἔχουσα

(¹) Voir Observation XXIII.

quadratum latus habentem quadratum. Rursum itaque res eo est reducta ut inveniantur tria triangula rectangula, ut solidus sub perpendiculis ductus in solidum sub hypotenuse faciat quadratum, qui latus habeat quadratum. * Et si omnia dividamus per productum ex hypotenusa in perpendiculum unius rectangulorum, oportet oriatur qui sit ex producto hypotenusa in perpendiculum, aliquius rectanguli, in productum ex hypotenusa in perpendiculum alterius, esto unum rectangulorum 3. 4. 5. Eo itaque deventum est, ut inveniantur duo triangula rectangula, ut numerus hypotenusa et perpendiculi numeri hypotenusa et perpendiculi sit 10. Si autem 10 est 5, et est facile, quippe magis est 5. 12. 13. minus 3. 4. 5. Ab his ergo querenda sunt alia duo, ut numerus hypotenusa et perpendiculi sit 6, est autem majoris hypotenusa $6\frac{1}{2}$, perpendiculum 60. Minoris autem hypotenusa $2\frac{1}{2}$, qui vero in uno rectangulorum 12, et accipientes minima similitudin. Recurrimus ad propositum initio, et ponimus solidum sub tribus contentum 1Q. ipsorum autem quadratorum alterum 16Q. alterum 576Q. tertium $\frac{1}{28561}Q$. Superest ut solidus sub tribus aequetur 1Q. et omnis in 1Q. latusque lateri aequetur, et invenietur 1N.65. Ad positiones. *

•

τετραγωνον. δειγμεὶς ἄρα καὶ δύ δύ β. ξ̄, ἐν μορίῳ ρχβ. ἔκει, εἰναι τετράγωνον πλευρὴν ἔχοντα τετράγωνον. καὶ πάλιν ἀπέγεται εἰς τὸ εὐρεῖν τρία τρίγωνα ὀρθογώνια, ὅπως ἡ ἐκ τῶν καθετῶν στερεός πολλαπλασιασθεῖς ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν ὑποτεινουσῶν στερεόν, ποιήσῃ τετράγωνον πλευρὴν ἔχοντα τετραγωνον, καὶ ἐν πάντα παραβαλωμένην παρὰ τὸν τῆς ὑποτεινούσης καὶ καθέτου ἐνὸς τῶν ὀρθογώνιον, δειγμεὶς τοῦ ὑποτεινουσῶν καὶ καθέτου τοῦ ὑποτεινούσης, καὶ καθέτου πολλαπλασιασθεῖντα κατὰ τὸν ὑποτεινούσης καὶ καθέτου ὀρθογώνιου τινὸς, ἔσται τὸ ἐν τῶν ὀρθογώνιον γ. δ. ε. ἀπέγεται οὖν εἰς τὸ εὐρεῖν δύο τρίγωνα ὀρθογώνια ὅπως ἡ ὑποτεινούσης καὶ καθέτου τοῦ ὑποτεινούσης, καὶ καθέτου γ. ξ̄. εὶ δὲ ξ̄ καὶ ξ̄ καὶ ἔστι φύδιον, καὶ ἔστι τὸ μὲν μετίζον γ. β. ξ̄, τὸ δὲ ἐλαττόν γ. δ. ε. ζητητέον οὖν ἀπὸ τούτων ἔτερη δύο, ὅπως ἡ ὑποτεινούσης καὶ καθέτου γ. μ. ξ̄. ἔστι δὲ τοῦ μὲν μετίζονος ὑποτεινουσαν μ. ξ̄. γ. δ. γ. δὲ καθέτος ξ̄. τοῦ δὲ ἐλαττονος δὲ μὲν ἐν τῷ ὑποτεινούσῃ μ. β. ξ̄ δὲ ἐν τῷ ξ̄ τῶν ὀρθογώνιων γ. β. καὶ λαβόντες τὰ ἐλάττα τῶν ὅμοιων ἀντιτέλομεν εἰς τὸ ξ̄ ζητᾶς, καὶ τάσσομεν τὸν ἐκ τῶν τριῶν στερεόν δὲ ξ̄. καὶ τὸν δὲ τὸν τετραγωνον, οὐ μὲν δὲ ξ̄, δὲ δὲ δὲ ξ̄, δὲ δὲ δὲ ξ̄ ἐν μορίῳ β. ζητᾶς. λοιπόν ἔστι τὸν ἐκ τῶν τριῶν στερεόν ισάσται δὲ ξ̄. καὶ πάντα παρὰ δύναμιν καὶ γ. πλευρὴν τῷ πλευρῷ. καὶ εὑρίσκεται δὲ ξ̄ ξ̄. ἐπὶ τὰς ὑποστάσεις. *

Ad elucidationem et explicationem quæstionis 25 juxta methodum Diophanti, quam Bachetus similiter prætermisit (¹), querenda sunt duo triangula rectangula ut productus sub hypotenusa et perpendiculo unius

(1) Bachet se propose de trouver trois triangles rectangles (a_1, b_1, c_1) , (a_2, b_2, c_2) , (a_3, b_3, c_3) tels que le rapport $\frac{a_1 a_2 a_3}{c_1 c_2 c_3}$ soit carré. A cet effet, il prend arbitrairement le

ad productum sub hypotenusa et perpendiculo alterius habeat rationem datam.

Quæ sane quæstio diu nos torsit et vere difficillimam quilibet tentando experietur, sed tandem patuit generalis ad ipsius solutionem methodus.

premier triangle, en sorte toutefois que $2c_1 < b_1$; il forme le second en posant

$$a_2 = \frac{4c_1^2 + b_1^2}{b_1}, \quad b_2 = \frac{4c_1^2 - b_1^2}{b_1}, \quad c_2 = 4c_1,$$

et le troisième en prenant

$$a_3 = a_1 a_2, \quad b_3 = b_1 c_2 - b_2 c_1, \quad c_3 = c_1 c_2 - b_1 b_2.$$

On a alors, d'une part,

$$a_1 a_2 a_3 = (a_1 a_2)^2;$$

de l'autre,

$$c_1 c_2 c_3 = (b_1 c_1)^2.$$

Fermat a bien reconnu que Diophante, se donnant arbitrairement, par exemple, le troisième triangle (5, 3, 4), cherche les deux autres en sorte que $\frac{a_1 a_2}{c_1 c_2}$ soit dans un rapport donné, à savoir 5. Mais il n'a pas deviné le procédé de l'auteur grec, qui a été restitué par Otto Schulz (*Diophantus von Alexandria arithmetische Aufgaben nebst dessen Schrift über die Polygon-Zahlen, aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet*, Berlin, 1822, p. 546-551) d'après le texte donné par Bachet.

Diophante prend d'abord deux triangles auxiliaires (x_1, β_1, γ_1) , (x_2, β_2, γ_2) , tels que $\beta_1 \gamma_1$ soit à $\beta_2 \gamma_2$ dans le rapport donné. Ces deux triangles, obtenus comme dans le problème précédent V, 24, sont d'ailleurs (13, 12, 5) et (5, 4, 3).

D'autre part, ayant un triangle (x, β, γ) , Diophante sait construire un triangle (a, b, c) tel que $ac = \frac{\beta^2}{x}$. Il prend à cet effet

$$a = \frac{1}{2}x, \quad b = \frac{\beta^2 - \gamma^2}{2x}, \quad c = \frac{\beta\gamma}{x}.$$

Du triangle (13, 12, 5) il déduit de cette façon le triangle $(6\frac{1}{2}, \frac{119}{26}, \frac{60}{13})$, et du triangle (5, 4, 3), le triangle $(3\frac{1}{2}, \frac{7}{10}, \frac{12}{5})$. Les deux triangles ainsi formés satisfont évidemment à la condition imposée.

Pourachever le problème primitif, Diophante prend pour les trois carrés cherchés

$$\left(\frac{c_1}{a_1}x\right)^2, \quad \left(\frac{c_2}{a_2}x\right)^2, \quad \left(\frac{c_3}{a_3}x\right)^2.$$

c'est-à-dire

$$\frac{14400}{28561}x^2, \quad \frac{576}{625}x^2, \quad \frac{16}{25}x^2$$

et, égalant leur produit à x^2 , il tire pour x la valeur $\frac{65}{18}$.

Querantur duo triangula ut rectangulum sub hypotenusa unius et perpendiculo rectanguli sub hypotenusa alterius et perpendiculo sit duplum.

Fingatur unum ex triangulis ab A et B, alterum ab A et D. Rectangulum sub hypotenusa prioris et perpendiculo erit

$$B \text{ in } Ac \text{ cubo bis} + B \text{ cubo in } A \text{ bis};$$

rectangulum vero sub hypotenusa posterioris et perpendiculo erit

$$D \text{ in } Ac \text{ bis} + D \text{ c. in } A \text{ bis}.$$

Quum igitur $B \text{ in } Ac \text{, bis} + B \text{ c. in } A \text{ bis}$ sit duplum rectanguli $D \text{ in } Ac \text{, bis} + D \text{ c. in } A \text{ bis}$, ergo

$B \text{ in } Ac \text{,} + B \text{ c. in } A \text{ — aequabitur } D \text{ in } Ac \text{, bis} + D \text{ c. in } A \text{ bis},$
et, omnibus abs A divisis, fiet

$$B \text{ in } Aq \text{,} + B \text{ c. — aequale } D \text{ in } Aq \text{, bis} + D \text{ c. bis},$$

et, per antithesin,

$$D \text{ c. bis} — B \text{ c. — aequabitur } B \text{ in } Aq \text{,} — D \text{ in } Aq \text{, bis}.$$

Si igitur $D \text{ c. bis} — B \text{ c.}$, divisum per $B — D \text{ bis}$, aequetur quadrato, soluta erit questio.

Querendi igitur duo numeri, loco ipsorum B et D, ea conditione ut duplum cubi unius, minus alio, divisum vel multiplicatum (eodem enim res recidit) per duplum posterioris minus primo, faciat quadratum (¹).

Ponatur unus esse $4N + 1$, alter 1 .

Cubus duplus prioris minus cubo a posteriore facit

$$1 + 6N + 6Q + 2C.$$

Duplus autem posterioris minus priore facit

$$1 — 1N.$$

(1) On voit qu'au lieu de déterminer B et D en sorte que $\frac{2D^3 - B^3}{B - 2D}$ soit carré, Fermat va les chercher, par erreur, en sorte que $\frac{2D^3 - B^3}{2B - D}$ soit carré. Plus loin, après avoir reconnu la faute de calcul qu'il a commise, il laisse subsister sa solution comme s'appliquant en tout cas à un problème digne d'intérêt.

Ergo, si ducas $i - iN$ in $\overline{i + 6N + 6Q + 2C}$, fiet quadratus. Productum illud æquatur

$$i + 5N - 4C - 2QQ, \quad \text{quod aequaliter quadrato ab } \frac{5}{2}N - i - \frac{25}{8}Q,$$

et omnia statim constabunt.

Propositio autem ad omnes rationes extendetur si, loco unius ex quærendis numeris, ponatur iN plus excessu majoris rationis termini supra minorem et, loco alterius, ille ipse excessus, ut jam a nobis in ratione dupla est factum. Hac quippe ratione semper unitatum numerus evadet quadratus et æquatio erit proclivis; hoc peracto invenientur duo numeri qui ipsos B et D repræsentabunt, et ad primam quæstionem fiet redditus.

Retractanti quæ hucusque ad 25^{am} quæstionem scripsimus, visum erat statim omnia delere quia abductio ad problema quod perfecimus non convenit quæstiōi nostræ: quia tamen quæstionem aliam, ad quam male præsens problema adduxeramus, recte construximus, non tam operam perdidimus quam male collocavimus, et ideo maneat scriptura marginalis intacta.

Quæstionem ipsam Diophanteam novo iterum examini subjicientes et methodum nostram sedulo consulentes, *tandem generaliter solvimus*: exemplum tantum subjiciemus, confisi numeros ipsos satis indicaturos non sorti, sed arti solutionem deberi.

In propositione Diophanti quærenda duo triangula rectangula eà conditione ut productum sub hypotenusa unius et perpendiculo ad productum sub hypotenusa et perpendiculo alterius habeat rationem quam 5 ad 1.

En duo illa triangula,

primum, cuius hypotenusa	48 543 669 109,
basis	36 083 779 309,
perpendiculum	32 472 275 580,
secundum, cuius hypotenusa	42 636 752 938,
basis	41 990 695 480,
perpendiculum	7 394 200 638.

XXXI (p. 55).

(Ad quæstion. XXX Libr. V.)

Dato numero tres adinvenire quadratos quorum binî sumpti, adscitoque dato numero, facient quadratum.

Hujus questionis beneficio, sequentis quæstionis solutionem dabitur quæ alioquin difficillima sane videretur :

Dato numero, quatuor invenire numeros quorum binî sumpti adscitoque dato numero, facient quadratum.

Sit datus numerus 15 et primùm, per hanc quæstionem, reperiantur tres quadrati quorum binî sumpti adscitoque dato numero facient quadratum; et sint illi tres quadrati (¹)

$$9, \quad \frac{1}{100}, \quad \frac{529}{225}.$$

Ponatur primus	quatuor numerorum quesitorum	1Q = 15,
secundus		6N + 9
(quia 9 est minus ex quadratis, 6N autem est duplum lateris in N),		
tertius eadem ratione ponatur		$\frac{1}{3}N + \frac{1}{100}$,
quartus denique		$\frac{16}{15}N + \frac{529}{225}$.

Ita quippe institutis positionibus, tribus propositi partibus satisfit; quilibet enim numerorum unâ eum primo, adscito 15, facit quadratum.

Superest ut secundus et tertius addito 15, item quartus et secundus addito 15, denique secundus et quartus, eodem addito 15, facient quadratum; et oritur triplicata æqualitas ejus solntio in promptu, quæ ex constructione, ejus artificiis ab hac quæstione desumpsimus, in

(¹) Ces nombres sont ceux de Diophante. Les racines de ces carrés peuvent se représenter en général par

$$z, \quad \frac{r(z^2 + \alpha)}{4pz}, \quad \frac{pz}{r}, \quad \frac{r(z^2 + \alpha)}{4qz} - \frac{qz}{r},$$

en supposant $p^2 + q^2 = r^2$. Diophante a pris en fait, pour $\alpha = 15$, $z = 3$, $p = 4$, $q = 3$, $r = 5$.

quolibet termino æquando reperiantur unitates tantum quadratae et numeri. Recurrentum igitur ad ea quæ diximus ad quæstionem 24 Libri VI.

XXXII (p. 257).

(Ad quæstion. XXXI. Libr. V.)

Dato numero tres adinvenire quadratos, quorum bini sumpti detracto dato numero faciant quadratum.

Quo artificio in superiore quæstione usi sumus, ut quatuor numeros inveniremus quorum bini sumpti adseito dato numero conficerent quadratum, simili in hac quæstione uti possumus, ut *inveniantur quatuor numeri quorum bini sumpti detracto dato numero conficiant quadratum.*

Ponendus enim : primus $+Q+$ numero dato; secundus quadratus primus ex inventis in hac questione unà cum duplo ab ipsius latere in N; et reliqua patent.

XXXIII (p. 258).

(Ad quæstion. XXXII. Libr. V.)

Invenire tres quadratos, ut compositus ex ipsorum quadratis faciat quadratum.

Cur autem non querat *duo quadratoquadratos quorum summa sit quadratus?* Sane hæc quæstio est impossibilis, ut nostra demonstrandi methodus potest haud dubie expedire.

XXXIV (p. 287).

(Ad commentarium in quæstion. III. Libr. VI.)

QUESTIONE DIOPHANTI. — Invenire triangulum rectangulum, ut areae ejus numerus, adsument datum numerum, faciat quadratum. Esto datus 5.

BACHETUS..... Quoniam vero hinc fortè venit in mentem Franciseo Vietæ (1) quæstionem

(1) VIÉTE, *Zeteticum* V, 9 (édition Schooten, p. 79) :

Invenire numero triangulum rectangulum, cuius area adjuncta dato planu ex duobus quadratis composito, conficiat quadratum.

Sit datum planu Z, planum compositum ex B quadrato et D quadrato. Eflingatur trian-

applicari posse solis numeris qui e duobus quadratis componuntur, quia Diophantus in sua hypothesi sumpserat 5, e duobus quadratis compositum; quamvis ex ipso ductu analyseos Diophanteæ satis constet ad quilibet numerum extendi problema, ne quis tamen supersit dubitandi loens, placet id etiam experientia comprobare....

Error Vietæ inde haud dubie oritur. Supposuit vir clarissimus differentiam duorum quadratoquadratorum, ut $1QQ - 1$, aequari areæ, cui adjiciendo quintuplum quadrati, fiat quadratus.

Si 5, numerus datus, dividatur in duos quadratos, poterit inveniri quintuplum quadrati a quo, dempta unitate, supersit quadratus. Ponatur igitur latus quadrati quintuplicandi esse $1N + 1$, aut alius quivis numerorum numerus + 1. Quintuplum quadrati illius erit

$$5Q + 10N + 5,$$

cui, si adjicias aream, $1QQ - 1$, fiet

$$1QQ + 5Q + 10N + 4,$$

quæ summa debet aequari quadrato. Hoe autem non est operosum, quum numerus unitatum, ex hypothesi adjecta problemati, sit quadratus.

Non vidit Vieta questionem perinde resolvi posse si, loco $1QQ - 1$, sumpsisset pro area $1 - 1QQ$: eo enim deducenda statim quæstio ut datus numerus, 5 vel 6 vel alius quilibet, in quadratum ductus, adjecta unitate, conficiat quadratum; quod generaliter est facillimum, quum unitas sit quadratus.

zulum rectangulum abs quadrato aggregati laterum B, D, et quadrato differentiae eorumdem. Hypotenusa igitur similis erit B quad. quad. $2 + B$ quad. in D quad. $12 + D$ quad. quad. 2. Basis B in D in Z planum 8. Perpendiculum $\overline{B} + \overline{D}$ quadrato in $\overline{B} - \overline{D}$ quadratum 2. Adplacentur omnia ad $\overline{B} + \overline{D}$ in $\overline{B} - \overline{D}$ quad. 2, fiet area similis $\frac{Z \text{ planum in } B \text{ in } D. 2}{B - D \text{ quad.}}$. Adde Z planum: quoniam $B - D$ quad. + B in D 2 aequalatur B quadrato + D quadrato, id est aequalatur Z planum, summa erit $\frac{Z \text{ planoplano}}{B - D \text{ quad.}} + 2$ quadratum a radice $\frac{Z \text{ plani}}{B - D}$.

Sit Z planum 5, D1, B2. Triangulum rectangulum erit hujusmodi : $\frac{82}{6}, \frac{86}{6}, \frac{18}{6}$. Area $\frac{720}{36}$, id est 20. Adde 5. Summa fit 25, cujus radix est 5.

Nos peculiari methodo (¹) questionem hanc et duas proximas (²) resolvimus, cujus beneficio, dum quærimus triangulum cujus area, unā cum 5, verbi gratia, conficiat quadratum, triangulum in minimis (³) exhibemus

$$\frac{9}{3}, \quad \frac{49}{3}, \quad \frac{41}{3},$$

cujus area 20, addito 5, facit quadratum 25. Sed de ratione et usu nostrae hujus methodi non est hujus loci plura addere; non sufficeret sane marginis exiguitas, multa enim habemus hic referenda.

XXXV (p. 289).

(Ad quæstion. VI Libr. VI.)

Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ, adsumens unum laterum circa rectum, faciat datum numerum.

(¹) La méthode de Diophante peut se représenter comme suit : soient a le nombre donné, et

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)y, \quad \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)y, \quad 2y$$

le triangle cherché, on devra rendre carré $\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)y^2 + a$. En égalant cette expression à $\left(x + \frac{2m^2a}{x}\right)^2y^2$, on arrive à tirer rationnellement, en fonction d'arbitraires m et n ,

$$x = \frac{a(4a^2m^4 + 1) - n^2}{4amn} \quad \text{et} \quad y = \frac{ax}{2max + n}.$$

(²) DIOPHANTE, VI, 4 : Invenire triangulum rectangulum ut areæ numerus multatus dato numero faciat quadratum.

DIOPHANTE, VI, 5 : Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ deductus a dato numero faciat quadratum.

La méthode de Diophante, pour ces deux problèmes, est analogue à celle qu'il a suivie pour VI, 3.

(³) De fait, ces nombres reviennent à ceux de Viète. Comparez au reste JACQUES DE BILLY (*Doctrine analytice inventum novum*, I, 37, p. 10) :

« Vieta, L. V Zetet, 9, infeliciter solvit questionem tertiam libri sexti Diophanti; quum enim iste proponat invenire triangulum rectangulum ejus area assumens datum numerum faciat quadratum, coaretavit Vieta questionem ad datum numerum ex duobus quadratis compositum. At Fermatius innumeris modis solvit problema de dato quoecumque numero : si enim detur 3, numeri sequentes exhibent triangulum quesitum :

$$\frac{141}{416} \frac{889}{160}, \quad \frac{1397}{416} \frac{825}{160}, \quad \frac{34}{40},$$

Hec propositio et sequentes aliter fieri possunt (¹):

Fingatur triangulum, in hae propositione, abs dato numero et unitate, et plana lateribus similia applicentur ad summam unitatis et numeri dati, orietur quæsusit triangulus.

XXXVI (p. 299).

(Ad quæstion. VII Libr. VI.)

Invenire triangulum rectangulum, ut numerus areæ, multatus uno laterum circa rectum, faciat datum numerum.

Fingatur triangulum abs dato numero et unitate, et plana lateribus similia applicentur ad differentiam dati numeri et unitatis (²).

Hæc quæstio (³), per viam qua hujusmodi duplicatas æqualitates infinitis modis resolvimus, infinitas recipit solutiones; modum autem quo utimur tetigimus et explicavimus infra ad quæstionem 24.

Imo et solutiones illæ infinitæ aptantur quatuor sequentibus questionibus (⁴), quod nec Diophantus nec Bachetus animadvertisit. Cur

(¹) Soit a le nombre donné; la solution de Diophante revient à prendre, pour le triangle,

$$\frac{a^2+1}{a-1}, \quad a-1, \quad \frac{2a}{a-1}.$$

L'aire, plus le dernier côté, est identiquement a .

La solution de Fermat est précisément la même; seulement il la pose directement, au lieu de suivre les longs détours de Diophante, qui masquent la construction effective du triangle.

(²) Cette solution est encore, de fait, la même que celle de Diophante, comme pour le problème précédent.

(³) Il faut entendre ici à la fois les problèmes VI, 6 et 7 de Diophante.

(⁴) VI, 8 : *Invenire triangulum rectangulum ut areæ, adsumens utrumque laterum circa rectum, faciat datum numerum.*

VI, 9 : *Invenire triangulum rectangulum, ut numerus areæ, multatus summa laterum circa rectum, faciat datum numerum.*

VI, 10 : *Invenire triangulum rectangulum ut areæ numerus, adsumens summam hypotenusa et alterius laterum circa rectum, faciat datum numerum.*

VI, 11 : *Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ, multatus summa hypotenusa et alterius laterum circa rectum, faciat datum numerum.*

Pour tous ces problèmes, comme pour les deux précédents, Diophante arrive à une double équation, dont son procédé ne tire qu'une solution unique.

autem neque Diophantus neque Bachetus sequentem quæstionem addiderunt?

Invenire triangulum rectangulum ut unum ex lateribus areæ multatum faciat datum numerum.

Certe hanc videntur ignorasse, quia non statim se prodit in resolutione duplicatae aequalitatis; verum ex nostra methodo facile potest inveniri.

Similiter in sequentibus quæstionibus tertius hie casus suppleri potest (¹).

XXXVII (p. 292).

(Ad quæstiones VIII et IX Libri VI.)

Addi potest ex nostra methodo sequens quæstio :

Invenire triangulum rectangulum ut summa laterum multata areæ conficiat datum numerum.

XXXVIII (p. 294).

(Ad quæstiones X et XI Libri VI.)

Addi potest ex nostra methodo sequens quæstio :

Invenire triangulum rectangulum ut summa hypotenusa et alterius lateris circa rectum, multata areæ, faciat datum numerum.

Imo et sequens addi potest Bacheti commentariis (²) :

Invenire triangulum <rectangulum> ut hypotenusa detracta areæ faciat datum numerum.

(¹) Voir les Observations XXXVII, XXXVIII, XL, XLI.

(²) Dans son commentaire sur VI. 11, Bachet avait traité la question :

Invenire triangulum rectangulum ut area, detracta hypotenusa, faciat datum numerum.

XXXIX (p. 298).

(Ad quæstion. XIII Libr. VI.)

Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ, adsumens alterutrum laterum circa rectum, faciat quadratum.

Unius tantum speciei triangula Diophantus exhibet propositum adimplentia; sed ex nostra methodo suppetunt infinita diversæ speciei triangula que ex Diophanteo per ordinem derivantur.

Sit igitur inventum triangulum 3.4.5, cuius haec est proprietas « ut qui sit mutuo ductu laterum circa rectum, adscito solido sub majore laterum circa rectum, intervallo eorumdem, et areæ contento, faciat quadratum (¹) ». Ab eo deducendum aliud ejusdem proprietatis.

Sit majus ex lateribus circa rectum trianguli quæsiti 4; minus vero $3 + 1N$. Rectangulum sub lateribus circa rectum, adscito solido sub majore laterum circa rectum, intervallo eorumdem, et areæ contento, facit

$$36 - 12N - 8Q, \quad \text{quæ ideo debent æquari quadrato.}$$

Quoniam autem latera, 4 et $3 + 1N$, sint latera circa rectum trianguli rectanguli, debent etiam eorum quadrata juncta æquari quadrato; quadrata illa juncta faciunt

$$25 - 6N + 1Q, \quad \text{quæ ideo etiam æquanda quadrato.}$$

(¹) Cette condition est empruntée au texte latin du problème. Le procédé de Diophante revient en effet à prendre comme triangle cherché : $a\alpha$, $b\beta$, $c\gamma$; puis à poser (supposant $b > c$) $\alpha = \frac{b}{x^2 - \frac{bc}{z}}$. Il arrive ainsi à avoir à rendre carré

$$bcx^2 - b(b-c)\frac{bc}{z} = \beta^2.$$

Or, si le triangle (a, b, c) est tel que

$$bc - b(b-c)\frac{bc}{z} = p^2,$$

Diophante sait construire une infinité de valeurs de $x = \frac{q^2 - 2pq - bc}{q^2 - bc}$, donc de z . Mais tous les triangles ainsi obtenus sont semblables; Fermat cherche donc à déterminer un autre triangle (a, b, c) que celui trouvé par Diophante (5, 4, 3).

Et oritur duplicata æqualitas, nam

$$36 - 12N - 8Q \quad \text{et etiam} \quad 25 + 6N + 1Q$$

debent aquari quadrato. Ejus æqualitatis duplicatae solutio est in promptu.

XL (p. 301).

(Ad quæstion. XIV Libr. VI.)

Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ, multatus alterutro laterum circa rectum, faciat quadratum.

Ex nostra methodo solvetur sequens quæstio, alioquin difficillima :

Invenire triangulum rectangulum ut alterutrum laterum circa rectum, multatum areæ, faciat quadratum.

XLI (p. 307).

(Ad quæstiones XV et XVII Libri VI.)

15. Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ, tam hypotenusa quam altero laterum circa rectum detracto, faciat quadratum.

17. Invenire triangulum rectangulum ut numerus areæ, tam hypotenusa quam alterius laterum circa rectum numero adscito, faciat quadratum.

Tentetur beneficio nostræ methodi sequens quæstio, alioquin difficillima :

Invenire triangulum rectangulum ut tam hypotenusa quam unum ex lateribus, detracta areæ, faciant quadratum.

XLII (p. 320).

(Ad quæstion. XIX Libr. VI.)

Invenire triangulum rectangulum ut areæ numerus cum hypotenusa numero faciat quadratum, at circumferentia numeris sit enbus....

...Oportet itaque invenire quadratum aliquem, qui, binario adjecto, cubum faciat . . est igitur quadrati latus 5, cubi vero 3; ipse quadratus 25, cubus 27....

An autem alias in integris quadratus, præter ipsum 25, inveniatur

qui adsumpto binario cubum faciat, id sane difficilis primo obtutu videtur disquisitionis. Certissimā tamen demonstratione probare possum nullum alium quadratum, praeter 25, in integris adjecto binario facere cubum. In fractis ex methodo Bacheti (¹) suppetunt infiniti, sed doctrinam de numeris integris, quae sane pulcherrima et subtilissima est, nec Bachetus, nec alius quivis ejus scripta ad me pervenerint, hactenus calluit.

XLIII (p. 329).

(Ad commentarium in quæstion. XXIV Libr. VI.)

QUESTIO DIOPHANTI. — Invenire triangulum rectangulum ut numerus circumferentiae sit cubus, et adscito areae numero, faciat quadratum.

BACHETUS.... Quoniam verò in his libris Diophantus diversimode utitur duplicata aequalitate, non abs re me facturum arbitror, si omnes quos usurpat modos sigillatim recensem et unum in locum quæ sparsim a nobis adnotata sunt, collecta conjiciam, ut sic tota duplicata aequalitatis doctrina dissentium animis firmissimis inhæreat. Nec solas Diophanti hypotheses afferemus, sed et alias plerunque exhibebimus, quibus varia hujusmodi aequationum symptomata declarentur, novamque insuper quam exegitavimus aequationis rationem, quamque ad quadragesimam quintam quarti explicavimus, aliis adjicieamus.

Ubi non sufficiunt duplicatae aequalitates vel διπλοισότητες, recurrendum ad τριπλοισότητες seu triplicatas aequalitates, quæ est nostra inventio, ad plurima problemata pulcherrima præviam facem präfrens.

$$\text{Equentur videfiet quadrato} \begin{cases} 4N - 4, \\ 2N + 4, \\ 5N - 4, \end{cases}$$

oritur triplicata aequalitas ejus solutio per medium duplicatio aequalitatis est in promptu.

(1) D'après cette méthode (p. 321), si l'on a une solution x_1, y_1 de l'équation indéterminée

$$x^2 + \alpha = y^3$$

et que l'on pose

$$z = x_1 + \varepsilon, \quad \beta = y_1 + \frac{2x_1}{3y_1^2}\varepsilon,$$

on peut tirer ε rationnel

$$\varepsilon = \frac{36x_1^2 - 9\beta^2}{8x_1^3},$$

Si ponatur, loco τN , numerus unà cum 4 quadratum conficiens, verbi gratia, $\tau Q + \tau N$, fiet

$$\begin{array}{ll} \text{primus numerorum aequandorum quadrato } \tau Q = \tau N + 4; \\ \text{secundus igitur erit} & \tau Q = 8N - 4, \\ \text{tertius} & 5Q = 20N - 4. \end{array}$$

Primus autem, ex constructione, est quadratus : ergo debent aequari quadrato

$$2Q + 8N + 4 \quad \text{et} \quad 5Q + 20N - 4,$$

et oritur duplicata aequalitas quae unicam certe exhibebit solutionem (¹), sed eà exhibità prodibit rursus nova, et a secundà tertia deducetur, et in infinitum.

Quod opus ita procedet ut, invento valore τN , rursus ponatur τN esse $\tau N +$ numero qui primum ipsi τN inventus est aequalis. Hac enim viâ infinitæ prioribus solutionibus solutiones accedent et postrema semper derivabitur a proxime antecedenti.

Hujus inventionis beneficio infinita triangula ejusdem areae possumus exhibere (²), quod ipsum videtur latuisse Diophantum, ut patet ex quæstione octaya Libri V, in qua tria tantum triangula aequalis areae investigat ut sequentem quæstionem in tribus numeris construal, quæ ad infinitos, ex iis quæ nos primi deteximus, recipit extensionem.

(¹) D'après les procédés de Diophante, cette solution s'obtient comme suit : Soit la double équation

$$ax^2 + bx + c^2 = u^2, \quad a'x^2 + b'x + c^2 = v^2,$$

on en conclut

$$(a - a')x^2 + (b - b')x = u^2 - v^2.$$

Ou satisfera à cette relation en posant

$$2c \frac{a - a'}{b - b'} x + 2c = u + v, \quad \frac{b - b'}{2c} x = u - v.$$

De ces deux équations on tirera la valeur de u ou de v , et, en substituant dans une des deux premières, on obtiendra pour x une valeur rationnelle déterminée.

(²) Voir Observation XXIII. Fermat renvoie d'ailleurs à la présente Observation XLIII dans les suivantes : VI, XVI, XXII, XXXI.

XLIV (p. 333).

(Ad idem commentarium.)

Hinc de duplicatis æqualitatibus tractatu*m* multa possemus adjungere quæ nec veteres nec novi detexerunt. Sufficit nunc, ut methodi nostræ dignitatem et usum asseramus, ut quæstionem sequentem, quæ sane difficillima est, resolvamus.

Invenire triangulum rectangulum numero, cujus hypotenusa sit quadratus, et pariter summa laterum circa rectum (¹).

Triangulum quæsitus representant tres numeri sequentes :

$$4687298610289, \quad 4565486027761, \quad 1061652293520.$$

Formatur autem a duobus numeris sequentibus :

$$2150905, \quad 246792.$$

Aliâ autem methodo sequentis quæstionis solutionem deteximus :

Invenire triangulum rectangulum numero ea conditione ut quadratum

(¹) BILLY (*Doctrinae analyticæ inventum novum*, I, 23, p. 7) : Quæratur, verbi gratia, triangulum rectangulum cuius tam hypotenusa quam summa laterum circa rectum sit numerus quadratus. Formetur triangulum ab obviis numeris $(N+1)$ et (N) ; ergo tria latera erunt : $2Q+1 = 2N$, $1+N$, $2N+2Q$. Igitur hypotenusa, $2Q+1+2N$, et summa laterorum circa rectum, $2Q+1+4N$, aequaliter quadrato, et sit, per methodum communem, valor radicis $= \frac{12}{7}$, unde duo numeri, a quibus formatum est triangulum, erunt $= \frac{5}{7}$ et $= \frac{12}{7}$, seu in integris, accipiendo solos numeratores, $= 5$, $= 12$. Triangulum autem inde formatum est : 169, 119, 120. Unde infero ad solutionem problematis inveniendum esse aliquid triangulum rectangulum enijs hypotenusa sit quadratus, et differentia laterum circa rectum sit quadratus, atque haec conclusio elicetur vi analyseos praecedentis; istud autem triangulum est 169, 119, 120, quod formatur vel ab $= 5$ et $= 12$, vel $a = 5$ et $b = 12$. Quare itero operationem et formo triangulum quæsitus ab $(N+5)$ et (12) , et pervenio tandem ad æquilitatem duplicatam quæ non dabit amplius numeros fictos, sed veros, beneficio trianguli illius primitivi, ut distinctius videbitur infra num. 45...

(Ibid., IV, p. 13). *Invenire duos numeros quorum summa faciat quadratum et quorum quadrata summa poneta faciat quadratoquadratum.*

Istud problema idem plane est cum superiori quo quaerebatur triangulum rectangulum cuius hypotenusa et summa laterum sit quadratus, aliasque fuit prepositum plerisque doctissimi Mathematici a Fermatio nostro sine solutione. Utter igitur triangulo primitivo supra invento (num. 23) 169, 119, 120, quod formatur ab 5 et 12, et forma triangulum ab $(N+5)$ et (12) . Latera erunt : $(Q+169+10N)$, $(Q+119+10N)$, $2(N+120)$. Igitur

a differentia laterum circa rectum minus duplo quadrati a minore latere conficiat quadratum.

Unum ex triangulis quæ huic quæstioni aptantur est id quod sequitur :

$$1525, \quad 1517, \quad 156;$$

formatur a numeris 39 et 2.

Ino confidenter adjungimus duo triangula rectangula quæ jam exposuimus ad solutionem duarum propositarum quæstionum esse minima omnium in integris quæstione adimplentium.

Methodus nostra hæc est : Quæratur quæstio proposita secundum methodum vulgareum. Si non succedat solutio post absolutam operationem, quia nempe valor numeri notâ defectus insignitur et ideo minor esse nihilo intelligitur, non tamen despondendum animum confidenter promuntiamus (quæ oscitantia, ut loquitur Vieta ⁽¹⁾), fuit et

hypotenusa, $1Q + 169 + 10N$, et summa laterum circa rectum, $1 + 1Q + 34N$, æquantur quadrato; due summan istam laterum in 169; ergo productus, $169Q + 5746N + 169$, cum hypotenusa, $1Q + 169 + 10N$, æquantur quadratis. Ergo (per ea quæ dicta sunt num. 22) valor radicis est $\frac{2048075}{20366}$, et, juxta positiones, duo numeri a quibus nascetur triangulum quæsumum, $1687298610289, \quad 1565486027761, \quad 1061652293520$. Nam et hypotenusa est quadratus et summa laterum, et quadrata laterum æquantur quadrato hypotenuse; proindeque duo latera circa rectum sunt duo numeri quæsiti, tum quia illorum summa quadratus est, tum quia horum quadrata simul juncta faciunt quadrato-quadratum....

(*Ibid.*, 22, p. 7) : Iterum sit solvenda æqualitas duplicate : $169Q + 5746N + 169$, et $1Q + 10N + 169$. Tripliciter ista æqualitas solvi potest : Primo accipiendo differentiam terminorum illorum, quæ est $168Q + 5736N$, et eligendo duos produceentes in quorum uno sit 26, duplum videlicet lateris quadrati 169; atque hæc est methodus communis. Secundo, solvi potest revocando diversos quadratorum numeros ad eundem, quod fieret dueendo singulas particulas numeri posterioris in 169, ut explicatum est num. 4. Tertio, solvetur eadem æqualitas eligendo produceentes $15N$ et $12N + \frac{2868}{7}$; ita enim summa radicum erit $26N$, duplum lateris quadrati $169Q$; atque hæc est methodus Fermatianæ quæ dat pro valore radicis $\frac{2048075}{20366}$.

La première méthode indiquée par Jacques de Billy donnerait la valeur $\frac{769485031}{3240051610}$; la seconde est illusoire, car elle donne pour valeur zéro.

(¹) VIETE (*In artem analyticen Isagoge*, cap. I, éd. Schooten, p. 1, l. 23-25) : Forma autem Zetes in incundi ex arte propriâ est, non jam in numeris suam Logicam exerceente, quæ fuit oscitantia veterum Analystarum.

ipsius et veterum analystarum), sed iterum quæstionem tentemus et pro valore radicis ponamus (N — numero quem sub signo defectus aequari radici incognitæ in prima operatione invenimus, prodibit nova hanc dubie æquatio quæ per veros numeros solutionem quæstionis repræsentabit.

Et hac via superiores duas quæstiones alioquin difficillimas resolvimus; demonstravimus pariter et construximus numerum ex duobus cubis compositum in duos alios enbos dividi posse (¹), sed hoc per iteratam ter aliquando operationem : sœpns enim contingit ut veritas quæsita ad multiplices operationum iterationes solerter et industriū necessario adigit analystam, ut facillime experiendo deprehendes.

APPENDIX (²).

Proposuit feliciter satis plerosque duplicatæ æqualitatis et modos et casus subtilis ille et doctissimus analysta Bachetus ad quæstionem 24^{am} Libri VI Diophanti, sed integrum sane non demessuit segetem : quas enim quæstiones unicà tantum, aut ad summum dupliciti solutione circumscrifit, ad infinitas porrigeret et promovere nihil vetat, imo proclivi id exsequi operatione est in promptu.

Proponatur sextus modus quem ipse satis prolixè explicat pag. 439 et 440 (³) : casus omnes ab ipso enumerati, ex nostra quam mox exhibe-

(¹) Voir Observation IX.

(²) Ce fragment est tiré du préambule du *Doctrinæ analyticæ inventum novum* de Jacques de Billy (p. 2), où il suit le passage ci-après :

« Quis ex primitiis radicibus elicit derivatas, tum primi gradus, tum secundi, tum tertii et sic deinceps in infinitum? nemo plane : uni Fermatio debetur hoc inventum: unus ille haec omnia non ex alienis cumulavit operibus, quod rhapsodi quidam facere consueverunt, sed proprio marte eudit et ex suis ipse fontibus hausit : hoc ille quum mihi amicissime communicasset per literas, judicavi dignissimum quod typis mandaretur, et ne ab ejus mente nullatenus recedam, exscribendum mihi videtur in primis compendium quoddam totius methodi, cui nomen debet *Appendicis ad dissertationem Claudi Gasparis Bacheti de duplicatis apud Diophantum æqualitatibus*. En ipsissima illius verba, »

(³) Pages 332-333 de l'édition de Samuel Fermat. « Sextus modus est quando propositi numeri diversimode componuntur ex Quadratis, Numeris et Unitatibus,

Primo ergo accidit utrumque propositorum numerorum componi ex tribus speciebus supra dictis et eorum intervallum unicà tantum constare specie. ..

Secundo accidit utrumque propositorum numerorum ex duabus componi speciebus,

bituri sumus methodo, infinitas admittunt solutiones, quae a prima per iteratas analyses gradatim in infinitum derivantur.

Methodus haec est : Quæratur solutio quæstionis propositæ secundum methodum vulgarem, hoc est secundum methodum Bacheti aut Diophanteam, prodibit statim valor numeri sive radicis ignotæ; quo peracto, iteretur analysis, et, pro valore novæ investigandæ radicis, ponatur una radix plus numero unitatum prioris radicis. Redueetur quæstio ad novam æqualitatem duplieatam, in qua unitates utrimque reperientur quadratæ, propter priorem solutionem; ideoque differentia æquationum ex numeris tantum et quadratis, quæ sunt proximæ inter se species, constabit : quare resolvetur, ex Diophanto et Bacheto, nova haec duplikea æqualitas. Ex qua, pari artificio, tertia, et ex tertia quarta, et sic in infinitum, deducentur.

Quod non advertisse aut Diphantum, aut Bachetum, imo et Vietam, dispendium hucusque Analyseos maximum fuit. Sed præcipuum inventionis nostræ artificium in iis se prodit quæstionibus, in quibus primigenia analysis, pro valore incognitæ radicis, exhibet numerum notâ defectùs insignitum, qui ideo minor esse nihilo intelligitur. Methodus autem nostra in hoc easu, non solum in problematis quæ per duplikeas æqualitates solvuntur locum habet, sed generaliter in aliis quibuscumque, ut experienti notum fiet.

Sic igitur procedit : Quæratur etc. (*vide supra*, p. 337, l. 10, usque ad representabit, p. 338, l. 5) (¹).

alterum scilicet ex Quadratis et Unitatibus, alterum ex Numeris et Unitatibus, intervallum autem illorum constare ex Quadratis et Numeris....

» Tertio accidit alterum propositorum numerorum componi ex Quadratis, Numeris et Unitatibus, alterum ex Quadratis et Numeris....

» Quarto accidit alterum propositorum numerorum componi ex Quadratis, Numeris et Unitatibus, alterum ex Quadratis et Unitatibus....

» Quinto denique accidit alterum propositorum numerorum componi ex Quadratis, Numeris et Unitatibus, alterum vero ex Numeris et Unitatibus.... »

(¹) BILLY ajoute : « Haecenus Fermatius ». Les différences, pour cet alinéa, entre le texte de l'*Observatio* publié par Samuel Fermat (S) et le texte de l'*Inventum novum* (B) sont les suivantes :

P. 337, l. 12, notâ defectùs insignitur S habet notam defectùs B; 13, intelligitur S deprehenditur B; 14, ut loquitur Vieta S ut verbis Vietae utar B.

XLV (p. 338-339).

(Ad problema XX commentarii in ultimam quæstionem Arithmeticorum Diophanti.)

BACHETUS. Invenire triangulum rectangulum, cujus area sit datus numerus. Oportet autem ut quadratus areae duplicate, additus alieni quadratoquadrato, faciat quadratum.

Area trianguli rectanguli in numeris non potest esse quadratus.

Hujus theorematis a nobis inventi demonstrationem, quam et ipsi tandem non sine operosa et laboriosa meditatione deteximus, subjun- genus. Hoe nempe demonstrandi genus miros in Arithmeticis suppe- ditabit progressus.

Si area trianguli esset quadratus, darentur duo quadratoquadrati quorum differentia esset quadratus; unde sequitur dari duo quadratos quorum et summa et differentia esset quadratus: datur itaque numerus, compositus ex quadrato et duplo quadrati, æqualis quadrato, ea conditione ut quadrati cum componentes faciant quadratum. Sed, si numerus quadratus componitur ex quadrato et duplo alterius qua- drati, ejus latus similiter componitur ex quadrato et duplo quadrati, *ut facillime possumus demonstrare;* unde concludetur latus illud esse summam laterum circa rectum trianguli rectanguli, et unum ex qua- dratis illud componentibus efficere basem, et duplum quadratum æquari perpendiculo.

Illud itaque triangulum rectangulum conficietur a duobus quadratis quorum summa et differentia erunt quadrati. At isti duo quadrati mi- nores probabuntur primis quadratis primo suppositis, quorum tam summa quam differentia faciunt quadratum: ergo, si dentur duo qua- drati quorum summa et differentia faciant quadratum, dabitur in integris summa duorum quadratorum ejusdem naturæ, priore minor.

Eodem ratiocinio dabitur et minor ista inventa per viam prioris, et semper in infinitum minores invenientur numeri in integris idem præ- stantes. Quod impossibile est, quia, dato numero quovis integro, non possunt dari infiniti in integris illo minores.

Demonstrationem integrum et fusius explicatam inserere margini vetat ipsius exiguitas.

Hac ratione deprehendimus et demonstratione confirmavimus *nulum numerum triangulum, praeter unitatem, aequari quadratoquadrato.*

XLVI (p. 16.).

(**Ad commentarium in proposition. IX Diophanti De multangulis numeris.**)

BACHETUS : Dato latere invenire polygonum.... Dato polygono invenire latus.

Propositionem pulcherrimam et mirabilem, quam nos invenimus, hoc in loco sine demonstratione apponemus :

In progressione naturali, que ab unitate sumit exordium, quilibet numerus in proxime majorem facit duplum sui trianguli; in triangulum proxime majoris, facit triplum sue pyramidis; in pyramidem proxime majoris, facit quadruplum sui triangulotrianguli; et sic uniformi et generali in infinitum methodo.

Nec existimo plenarius aut generalius in numeris posse dari theorema. Cujus demonstrationem margini inserere nec vacat, nec licet.

XLVII (p. 49.).

(**Ad proposition. XXVII Bacheti Appendicis de numeris polygonis Libr. II.**)

Unitas primum cubum; duo sequentes impares conjuncti, secundum cubum; tres sequentes, tertium cubum; quatuor succedentes, quartum: semperque uno plures sequentem deinceps in infinitum eubum aggregati impares constituant.

Hanc propositionem ita constituo magis universalem.

Unitas primam columnam (¹) in quacunque polygonorum progressionem constituit; duo sequentes numeri, mulletati primo triangulo toties sumpto quot sunt anguli polygoni quaternario mulletati, secundam

(¹) Fermat a voulu généraliser, pour les différentes sortes de nombres polygones, la notion de cube (produit par n du carré de côté n), et il a appelé *colonne* le produit par n du polygone de côté n . Cette expression technique, qu'il semble avoir forgée lui-même, est généralement restée incomprise.

columnam; tres sequentes, muletati secundo triangulo toties sumpto
quot sunt anguli polygoni quaternario muletati, tertiam columnam; et
sic eodem in infinitum progressu.

XLVIII (p. 41.).

(Ad proposition. XXXI Bacheti Appendicis Libr. II.)

In hac progressionē [*nempe* arithmeticā, in qua minimus terminus aequatur differentiæ],
productus ex cubo minimi in quadratum trianguli numeri terminorum aequatur aggregato
cuborum a singulis.

Hinc sequitur enīm maximi, toties sumptum quot sunt numeri ter-
minorum, ad aggregatum cuborum habere minorem rationem quam
quadruplam.

APPENDICE.

I.

DÉDICACE DU DIOPHANTE DE 1670.

ILLUSTRISSIMO VIRO D. D. IOANNI BAPTISTÆ COLBERTO, REGI AB INTIMIS CONSLIIS ET A
SECRETIS, ERARIJ CENSORI GENERALI, SYMPIO REGIORVM EDIFICIORVM, NAVIGATIONIS EI
COMMERCI PÆFFECTO, REGNI ADMINISTRO, ETC.

Prodit in lucem tuis auspicijs, Vir Illustrissime, Diophantus varijs
auctus parentis mei obseruationibus; Illas mole quidem exiguae, sed
pondere, ni fallor, maiores, quæ tua est summa humanitas, forsitan
non aspernaberis, præsertim cum ad numeros pertineant qui radicis
instar ae velut in centro Matheseos positæ, diffunduntur in omnes illius
circuli partes. Cur enim Geometria, et quidquid ei affine est, alium
quam te ambiat Patronum, qui terrarum orbem animo metiris, vt in
extremis Regionibus in quibus olim emoriens natura defecisse videba-
tur, pœoclara Regis maximi facta celebrentur, et Barbarorum pectora
liberalibus imbuta disciplinis mitescant. Cum vero illas ferè omnes aut
earum semina Mathesis contineat, menti imperio natae et membris
famulatio aptis opitulatur, pacisque ac belli temporibus idonea, non
tantum Regijs ædibus magnificè extruendis, sed etiam vrbibus tutò
propugnandis utilem se prebet. Huius doctrinæ non immerito captus
illecebris Parens meus, quem adhuc lugeo, illam succisiuis horis in
medio forensium negotiorum strepitù, absque ullo tamen Iurispruden-
tiæ, et Senatorij muneris dispendio non infeliciter excoluit. An autem
haec, quas tibi, Vir Illustrissime, offero lucubrationes, pondere, vt dixi,
maiores sint quam mole, si satis otij suppeteret, tu facillimè iudicares,
qui Lynceà sagacitate in abdita quæque penetrans, veritatem ab errore

non minus quam veram virtutem à fucatâ secernis, et eorum qui operam
nauant aerario puras manus æquè dignoseis, ac puritatem auri se pro-
bare posse Matheseos quondam ille genius Archimedes celeberrimo
circa coronam Hieronis experimento demonstravit. Sed te aliò vocant
multa magna que, in quibus ita versaris, vt te pluribus parem, et adhuc
majoribus dignum ostendens, innueti Principis famam, illiusque sub-
ditorum lenamen, tibi laborum metu proponas. Id abunde testantur
commercij reparatæ, et Piratarum repressæ vires qui Herculem Galli-
cum Herculeas columnas transeuntem et vtrumque mare committen-
tem vident è latebris tanquam è Caei speluncâ et pertimeseunt; idem
quoque testantur portus bellicis instructi nauibus quæ peregrinis non
indigent armamentis, et hostibus terrorem incutient vt pateat qui mari
potitur, eum rerum potiri; testantur denique hinc restauratæ tuis curis
Artes, nobilique consortio, vt egregiorum æmulatione opificum certa-
tum augeri ac perfici possint, tuâ industriâ sociatae, illinc scientiarum
arcana in tuis ipsis penatibus mirum in modum illustrata. Quæ satis
fidem faciunt quantum tibi cordi sit non solum vt Regni, sed etiam vt
Reipublicæ litterariae fines promoueantur et vt quidquid ex nouo illius
orbe aduehitur, aspirante tui fauoris aurâ oblinionis et inuidiae seo-
pulos vitare possit; nunquam illos metuet hoc tui nominis præsidio
munitum opus, si benignâ manu, vt enixè rogo, suscicias istud aeterni
monumentum obsequij, quod tibi voyeo,

Addictissimus

S. FERMAT.

II.

PRÉFACE DU DIOPHANTE DE 1670.

Lectori Benenoſo.

DIOPHANTVM hic habes, et varia quibus auctus est obſeruationes, paucas illas quidem et breues, non tamen contemnendas; nec enim me latet hujusmodi opera ponderari potius quam numerari à peritis aestimatoribus, quibus vnicā demonstratio, imò interdum vnicum Problema magni voluminis instar est; in Mathematicis nimis in disciplinis, noua Laconico fīet more exhibita veritas pluris fieri solet, quam verbosa quorundam tautologia; Doctis tantum quibus pauca ſufficiunt, harum obſeruationum auctor ſcribebat, vel potius ipſe ſibi ſcribens, his ſtudijs exerceri malebat quam gloriari; adeo autem ille ab omni ostentatione alienus erat, vt nec Incubrations suas typis mandari curauerit, et ſuorum quandoque responsorum autographa nullo ſervato exemplari petentibus vltro miserit; norunt ſcilicet plerique celeberrimorum huius ſæculi Geometrarum, quam libenter ille et quantà humanitate, ſua ijs inventa patefecerit; Quamobrem ſuperſtitiososdam Ipsius amicos, ſaepe hortatus ſum ſæpiusque hortabor, vt ſi quos illius ingenij partus blandâ manu ſucepterint, illos in muſæi vmbra diutius delitescere nou patientur; dum autem plura quæ breui, vt ſpero, prodibunt, colligo, tibi non iniucundam fore duxi, novam horum Diophanti operum, istarumque ſimul obſeruationum editionem: Illas Parens meus quaſi aliud agens et ad altiora festinans margini variis in locis apposuit, praesertim ad quatuor vltimos libros; cum enim ardua ſectaretur ille, faciliora et vulgo Logistarum nota quæ duobus primis libris continentur,

aut ut ipsius Diophanti verbis vtar, τὰς ἐν ἀριθμητικῷ στοιχειωδῷς ἔγραπται ferè omnino pratermisit; Qualis autem Quantusque in Arithmeticis fuerit Diophantus, sat sciunt qui primis, ut dicitur, labris puram Logisticam gustauerunt; tredecim ille scriperat Arithmeticorum libros, quorum sex tantum extant, vñusque de numeris multangulis, reliqui vel temporis iniuriā perierunt, aut alicubi forsitan Thesauri instar ita seruantur, ut nullius videantur esse, dum publici juris fieri non possunt; meminit Diophanti Suidas in voce Hypathia, et Lucilius libro secundo Anthologie capite vigesimo secundo Diophanti Astrologi recordatur; an vero Suidas et Lucilius de hoc eodemque loquantur, nihil comperti habemus; eum multi circa Neronis tempora vixisse putant, nec deest qui Antonino pio imperante eum floruisse leuibus fretus coniecturis suspectur; illud audacter asserere licet, hoc Auctore nullum antiquiorem haetenus innotuisse, qui hanc instaurauerit doctrinam, quam à Græcis acceptam Arabes cum ipso Algebrae nomine ad nos transmisisse existimantur; eximia vero Problemata quæ hoc opus complectitur, adeo humanæ mentis captum videntur superare, ut ad eorum explanationem indefesso Xylandri labore et mirandâ Bacheti sagacitate opus fuerit; duo illi fuere doctissimi horum librorum interpretes, nam vix eo nomine dignus est Græcus Scholiastes; Bombellius verò in Algebra quam Italico sermone vulgauit, Diophanti quæstionibus suas permiseens, fidi interpretis partes non sustinuit; neque eo functus est munere subtilissimus Vieta qui peragrans auia Logisticæ loca, nec alterius inhaerens vestigiis, sua maluit in lucem proferre inuenta quam facem preferre Diophantieis; quantum autem Analyticam vltra veteres terminos promouerit Paren's meus, tuum erit, Eruditæ Lector, judicium; vñiam ipsius cœptis non obstitissent angustiæ temporis, et plura parantem mors heu nimium immatura nobis illum non præripuisset! plura procul dubio ex eodem fonte manassent, nec suis quadam istorum problematum demonstrationibus carerent; quin vero ipse eas penes se, et in serinio, ut ita loquar, pectoris habuerit, tum aliæ lucubrations, tum illius animi candor et modestia dubitare non sinunt; licet autem à tot tantisque viris laudatus Paren's, à liberis absque

inuidia laudari possit, nec illud ingenti luctui solatium, vel potius irritamentum denegari debeat, magis tamen libenter, ni fallor, illius encomium perleges quod in diario Doctorum elegantissimo, et in plerisque clarissimorum scriptorum libris occurrit; horum nonnulli magnificè jamdudum mentionem fecere variorum ipsius operum, quæ licet inedita non tamen latuerunt, vt abundè testantur quædam excerpta quæ adjicere non piget, et doctrinæ Analyticæ inuentum nonum, collectum ex varijs illius epistolis à R. P. Iacobo de Billy Societatis Jesu Sacerdote, cuius perspicacissimum ingenium et eruditio commendatione non egent, cum in ipsius operibus satis eluceant; cæterum quidquid in hoc erratum fuerit, id Typographorum incuriae tribuas, et æqui bonique consulas quæso. VALE.

III.

DÉDICACE DES VARIA OPERA.

CELSISSIMO S. R. I. PRINCIPI FERDINANDO EPISCOPO PADERBORNensi, COADIVTORI
MONASTERIENSE, COMITI PYRMONTANO, LIR. BARONI DE FURSTENBERG, SAMVEL
DE FERMAT S. P.

Si minus quod tibi, Celsissime Princeps, offero non respucas, grati-
simul animi et obsequii quodam erga te, ac pietatis officio erga Paren-
tem fungi videbor : dum in illius operum Mathematicorum limine
nomen statuo, quod injurias temporum et invidiae morsus arcere pos-
sit. Quis enim unquam credat improbari quod tu semel probaveris,
quem Aretoi syderis instar intuentur quicunque scientiarum pelagus
sulcare cupiunt, mox tutius et tranquillus futurum, cùm fluctus om-
nino sedaverit lenior pacis aura quæ tandem spirare cœpit? Sie autem
per omnes orbis literarii partes lucem spargis, ut te cuneti suspiciant
et neminem despicias; ita multorum errorem Magnatum damnas qui
veluti quodam summæ dignitatis privilegio sibi concessum existimant,
ut non tantum impune, verum etiam splendidè possint esse indocti; et
se contempnendos putent nisi Musas spernere audeant. Sed abundè tua
probat authoritas nulli magis utiles esse literas, quam ei qui, ut decet,
Pastor populorum esse velit, nulli plus gloriae afferre: quia raro conve-
niunt imperii comes sollicitudo, et aptus colenda menti secessus. Idem
profecto centrum ferè nunquam habent civilium curiarum et sublimium
disciplinarum circuli : in tanto negotiorum circuitu rectâ ad doctrinæ
culmen ascendere non miùs forsitan difficile Politico videatur, quam

Geometrae curvas rectis aequare, cuius rei specimen exhibet hic edita dissertatio. Superavit tamen omnes obices tua Celsitudo, tibique fidum in mediis tempestatibus portum condere potuisti, et egregiis plerisque scriptoribus quos tuarum fama virtutum ad Paderæ fontes allicit, ubi venam quovis latice puriorem nanciscuntur, ubi te præeunte citius discunt quò properandum sit, quàm si studiis in umbra educatis anxiè semotos calles investigarent. Longum scilicet iter est per præcepta, breve per exempla, brevissimum per exempla Principis viri, quem etiam avia peragrandem loca plurimi libenter sequi conantur; sed paucissimi sunt qui tuis inhærere vestigiis queant; et dum optas

Voce ciere viros, Phœbūnque accendere cantu,

vocis tuæ suavitas tuis non mediocreter votis obstat. Deterret nimirum qui sic hortatur; silere docet, qui tam docè loquitur. Id ego experior quoties opera tua pervolvo, quæ mihi licet ignoto et immerenti mittere voluisti: illa semper, adulacionis expers, cuius causas procul habeo, mirari simul et laudare gaudeo quæ vix quisquam imitari posse confidat. Monumentis enim Paderbornensibus, quæ tam munificè restaurans tam eleganter celebras, monumentum longè perennius exegisti: si Quinetilii Vari, cuius cladem cedro dignis carminibus memoras, Legiones Romæ reddi nequeunt, at saltem tui sermonis illecebris et venustate Vari vel Augusti sæculum ei reddere videris, Virgiliumque simul et Horatium ac utriusque præsidium et decus referre. Augurabatur olim lepidus Vates non defuturos Marones, quandiu sint Mæcenates, sed quidquid præclarum in Mæcenate et Marone fuit, in eodem pectore reperiri posse nemo speraverat, sive quòd nimia copia Poëtas nopes et steriles plerunque reddit (unde Theocritus * Diophanto fatetur artes excitari paupertate, quam laboris magistram vocat) sive quòd alienis carminibus ei non opus est qui suis satis oblectari potest, ut adoptivos liberos quærere non solet cui natura legitimam sobolem dedit. Verùm in te, Celsissime Princeps, collecta non sine stupore cer-

* Idyl. 16.

nimus, quæ divisa tam illustres alios effecerunt; et tua singularis humanitas, quæ tot eximias dotes connectens, cœlestes gemmas auro inserere videtur, spondet à te benignè excipiendum, tuoque in sinu fovendum hunc ingenii paterni partum, qui suo defensore orbatus, ut posthumus, tuo patrocinio indiget, quod venerabundus exposco.

DE CESSISSIMO PRINCIPE FERDINANDO FURSTENBERGIO, EPISCOPO PADERBORNENSI, ETC.

OB AVREVM NUMISMA, IN QVO

illius imago conspicitur, missum.

AUREA Piero quam culmine mittis imago
 Quæ nos tro ingressa lares fulgore replevit
 Immeritamque manum, Phœbi ipsa referre videtur
 Ora, solo qui cuneta foveat, nec florea tantum
 Rura super latus rutilat glebasque feraces,
 Cernere sed sterilem non deditur arenam;
 Sic hilares oculos simul et cum fronte serena
 Innocuos mores insignis vultus adumbrat;
 Sit tamen ars quamvis spectanda numismatis, illam
 Effigiem superavit opus quodecumque Camænis
 Sponte tuis fluxit dulci de fonte leporum:
 Seilicet Aonij melius te vertice montis
 Spirantem ostendunt Musæ, dum natus Olympo
 Doctrinam pietate auges, castasque sorores
 Ad superos tollens, dignoscis quam sit inane
 Ornari ingenium, nimioque calescere motu,
 Si vacuum æthereo pectus non uritur igne.
 Luminibus quantis et quot virtutibus omnes
 STAVITER* afficiens animos, validique catenis

* Illustrissimi Principis tessera STAVITER ET FORTITER.

Eloquij blandus victor trahis! his ego sensi
 Me placidè captum jampridem, nec tibi possim
 Hoc magis addici, qui me devincit, honore.
 At quas nunc grates referam? Te principe Vatum
 Munera digna mihi Romanaque carmina desunt;
 Carmina Mæcenas sed tu par ipse Maroni
 Nostra nec expectas, nee vilia munera queris.
 Non eget exiguà sublimis arundine laurus,
 Et rauca non vocis eget tua fama susurro;
 Sat nitidis Latio quibus aurea redditur ætas
 Eximias scriptis potuisti pandere dotes,
 Purior illimi ien splendens lumen solus,
 Ut decet, ipse suis radijs se pingit Apollo.

DE PRINCIPIS EIVSDEM PRECLARO

Monumentorum Paderbornensium opere.

Dum Paderae fontes aeterno carmine Princeps
 Aonij celebrat spes columenque chori,
 Ut superat quæ sic ponit monumenta, suisque
 Altius ipse aliud tollit ad astra modis!
 Hujus Cana fides ornat pia pectora, mentem
 Lux Sophiae, Latij prisens et ora lepor.
 Amissas* his olim Aquilas quæ flevit in arvis,
 Delicias illine Roma decusque trahit.
 Fernandi eloquium Tiberis miratur, et aevi
 Immemor, Augusti sæcla redire putat.

* Natus est Illustris, Princeps in ea Germaniae parte in qua caesa fuerunt Quinetiliæ Vari Legiones.

DE TODEM PRINCIPE QUI MIRANDIS

*ageat doctrinæque dotibus stemmatis ac digitatum splendorem augens,
pacem omnibus mortum et facundie suavitate persuadere posuit.*

ODE.

Nunc corda mulcens ô utinam Sacer
 Notos recursans per fluvios Olor
 Mox cogat infensos canorà
 Voce potens lituos silere;
 Hic prima Pindi gloria cui fayet
 Phœbus, nitentem Lilia quem tegunt,
 Quas ore non compescat iras
 Pieria modulatus arte?
 Ut cum quarelis dulcisonis nemus
 Vox blanda latè lusciniae replet,
 Discordis oblitæ susurri
 Mille solent vulneres tacere;
 Non ille frustra sit patriæ datus
 A quo feroces fleeti animi quennt;
 Martis nec incassum per arua
 Threicius cecinit Sacerdos :
 Orpheus parentem Calliope coles
 Lenire plectro quot didicit feras!
 Sermone sic prestat domare
 Pectora, quam superare ferro.

IV.

PRÉFACE DES VARIA OPERA.

ERUDITO LECTORI.

Non te latet, Eruditæ Lector, opera Mathematica præfatione vix indigere : nam ut Paralogismi culpam frustrâ longo sermone Geometra deprecari vellet, aut pro vera demonstratione falsam obtrudere; ita non opus est assensum solidæ rationis viribus debitum suppliciter efflagitare, quem adversarius videns sciensque, licet valde reluctans, denegare non possit. Priusq[ue] supervacaneum foret laudes Mathematicum fusè celebrare, cùm hanc spartam tot egregij scriptores adornandam jampridem suscepérint. Quis enim nescit Geometriam et uberes illius fructus ad cœlum evchi à Platone, qui non solum eam divinitūs humanæ menti insitam, sed etiam ab ipso numine excoli putavit? nonne merito Mathesis à Philone vocata fuit liberalium artium metropolis, quas, ubi desit illa, luminibus, et veluti manibus orbatas esse liquet? Unde à vero non aberrat qui ut manum instrumentum ante instrumenta, sic et Mathesin diei posse credit artem ante alias artes, cùm illius terrâ marique, et bello ut pace, tam evidens utilitas sit; quod unus instar omnium docuit olim Archimedes, dum infirmus corpore sed invictus ingenio senex, obsidionis Syracusanæ pars maxima, patriæ vis summa fuit, Briareus et Centimanus à Romanis appellatus : quamobrem admiratione perculsum Marcellum licet hostem ab eo tot damnis affectum ei tamen inimicum esse noluisse Livius tradit, sed propinquis inquisitis honori præsidioque nomen, ac memoriam tanti viri fuisse. Mathematicas deinde disciplinas ansas Philosophia

videri quis diffiteatur? cum Philosophus quamvis abundè Logicae versutis et argutijs instructus, si lux mathematica non afflugeat in Physica comparari possit Poliphemo in spelunca oceano, et numeris, quo frui potuit, usum nescienti, vini scilicet, cui praelaris non ita pridem Philosophus Geometriam similem dici posse arbitratus est, quod recens inflat, vetus oblectat et vires auget. At non istorum operum Authorem inflavit unquam Mathesis, et tot demonstrationes, dum ab ipso non sunt editæ, quibuslibet argumentis melius demonstrant eum ab ostentatione laudisque cupidine alienum fuisse. Quòd autem de illarum sorte sollicitus non fuit, ferè semper autographa nullo servato responsorum exemplari mittere solitus, parum abfuit quin haec, quæ fortè non interitura credes, omnino extincta fuerint, antequam in publicam lucem prodirent. Hinc fit ut quia hæc sparsim disjecta colligere facile nou fuit, fato posthumorum operum serò, pauciora, et minus culta typis edantur. Hinc etiam contingere poterit ut omnia que hic occurrent tibi non videantur nova : sed quavis alij de quibusdam rebus, quas hic invenies, scripserint et lucubrations suas priùs vulgaverint, non idèò minùs haec inventa istorum operum Authori debentur, qui adeò fastūs, et invidiae expers fuit, ut aliena suis sat aliunde notis immisuisse credi non possit, qui sua vix sibi tribuebat. Ab eo, exempli causâ, libri duo Apollonij Pergæi de locis planis procul dubio restituti sunt, licet Franciscus Schooten Academie Lugduno Batavæ Professor illos à se restitutos asserat; nam sua typis mandavit Franciscus Schooten anno 1657, sed libros duos, qui hic extant, Apollonij Pergæi de locis planis se vidisse Lutetiae manuscriptos, nec non ad locos planos et solidos Isagogen, testis omni exceptione major Herigonius asserit tomu 6. cursus Mathematici editi anno 1634 (¹). Credere tamen, vt dixi, malum Batavum Professorem eadem de re seripsisse, quām ab eo, vel à quovis alio aliquid perpetratum esse suspicari quod ingenuum animum dedeceat, vel inverecundiam plagij probare possit. Verum in

¹) Voir la note 1 de la page 171, où est rétablie la véritable date de la mention faite par Hérigone.

istis, ni fallor, operibus, de quibus te non ex parva mole judicatum
sat scio, occurret tibi non injucunda varietas, ut et in epistolis, quae
vel ab Authore, vel ad ipsum à plerisque doctissimis viris scriptæ fuen-
runt. Has inter sunt nonnullæ Pascalij in quibus ingenij non minus
tersi quàm perspicacis radios agnosces, quos ejusdem aliae lumenbra-
tiones, et ipsæ satis exhibent Pascalij cogitationum reliquæ : illud
enim opus in quo *pendent opera interrupta*, multis eximium Matheseos
circa res sacras specimen videtur, *aequataque machina carlo*. Quis autem
ignorat qualis quantusque Geometra et quam insignis in Academia
Parisiensi Professor fuerit Robervallius, cuius hie aliquot epistolas
legere poteris, et perlegisse gaudebis? Eduntur hie quoque nonnullæ
Gallicè vel Italicè scriptæ à Kenelmio Digbæo, qui praeter generis nobis-
titatem et honores gestos, non solum ingenio doctrinâque, sed etiam
pietate conspicuus fuit, ac verae Religionis cultu, quam ut gladio, sic
et calamo tueri conatus est, ut fidem facit aureus illius liber de veritate
Catholicæ Religionis Anglicæ scriptus. His epistolis additur una aut
altera Frenieli, cuius miram Arithmetica problemata solvendi facili-
tatem à multis prædicatam, et ejusdem responsis confirmatam Ana-
lystæ norunt. Quas verò non adjecimus circa Cartesianam Dioptricam
epistolas legere poteris in tertio volumine epistolarum Cartesij enjus
stupenda sagacitatis circa Geometriam admiratione se captum fatetur
is etiam qui nonnunquam ab eo dissentit. Ut autem in varijs istis ope-
ribus, sic et in epistolis multa reperies quæ ad Geometriam, vel Ana-
lyticen pertinent aut numerorum arcana, de quibus si plura videre
eupias, habes observationes ad Diophantum, cuius opera typis mandari
enravi anno 1670, et Doctrinæ Analyticæ inventum novum collectum è
variis epistolis D. Petri de Fermat ab insigni Geometra R. P. Jacobo de
Billy S. J. Sacerdote. Est hie præterea nonnihil circa Mechanicam et
Geostaticam, nec non Dioptricam ac Physicam, circa quàm v. g. non
contemnendam fore confido epistolam de proportione quà gravia deci-
dientia accelerantur, ad Gassendum, quæ ipsi Gassendo viro exquisitæ
eruditioñis, et candore ac moribus qui Christianum Philosophum de-
cent, prædicto non displicuit, ut ejus responso, licet brevi, satis patet.

Sic etiam celebris Itali Geometrae Abbatis Bened. Castelli epistola probat ei non displicuisse quæ hic scripta sunt circà motum gravium aut centrum gravitatis. Cæterum in his Parentis mei operibus et epistolis quæ multas disputationes circà quæstiones arduas continent, et quibus duas addidimus criticis observationibus non sphenendis referatas, nullam vocem quæ sit acerbior, nullum pervicacis controversiae vel amarulentæ contentionis occurrere vestigium, poteris observare. Id innatam mansuetudinem Authoris arguit, qui nullâ contradicendi libidine veritatem querens, illam ab alijs inveniri gaudebat et gratulabatur : qui secùs agunt eam ut juvenes proci colere videntur, dum sibi dumtaxat affulgere vellent quod diligunt; sed qui veritatem divino, ut par est, amore prosequuntur, ipsam omnibus innotescere cupiunt, suamque felicitatem angeri putant, cum ejusdem plurimi sint participes. Epistolas verò ad Authorem scriptas, que hic extant, ut naetus sum, edendas ingenuè existimavi, nullomodo minnere sed angere eu-piens tantorum virorum famam, quorum alia responsa, nondum prælo commissa, si mihi suppeterent, ut harum disputationum seriem edere non pigeret. Ex istis autem operibus, Eruditæ Lector, fructūs, ni fallor, et voluptatis non parùm percipere poteris et si quid incuriā Typographorum erratum sit, illud suppleas aut ignoscas quæso.

Schemata suis locis in toto opere, ut in illius parte, reperirentur, nisi defuissecul sculptor ligni notis Geometricis incidendi peritus; sed figuræ ⁽¹⁾ quæ cùm textu edita non fuerunt, ad fibri calcem sunt rejecta, numeris paginarum, ad quas referuntur, appositis, quod semel mouisse sufficiat.

⁽¹⁾ Ce mot *figuræ*, qui rend la phrase incorrecte, doit y avoir été ajouté après coup. Dans l'édition des *Varia opera*, les figures sont insérées dans le texte jusqu'à la page 103. Il y a à la fin du Volume cinq Planches contenant les figures des pages 104 à 167, plus une qui manque à la page 91. Pages 201 et 203, reparaisseant dans le texte trois autres figures relativement simples.

V.

ÉLOGE DE MONSIEVR DE FERMAT,

Conseiller au Parlement de Tolose.

Du Journal des Savans, du Lundi 9. Fevrier 1665.

On a appris icy avec beaucoup de douleur la mort de M. de Fermat Conseiller au Parlement de Tolose. C'estoit un des plus beaux esprits de ce siecle, et un genie si universel et d'une estendue si vaste, que si tous les savans n'avoient rendu témoignage de son merite extraordinaire, on auroit de la peine à croire toutes les choses qu'on en doit dire, pour ne rien retrancher de ses louanges.

Il avoit toujours entretenu une correspondance tres-particuliere avec Messieurs Descartes, Toricelli, Pascal, Frenicle, Roberval, Hugens, etc. et avec la pluspart des grands Geometres d'Angleterre et d'Italie. Mais il avoit lié une amitié si étroite avec M. de Carcavi, pendant qu'ils estoient confreres dans le Parlement de Tolose, que comme il a esté le confident de ses estudes, il est encore aujourd'huy le depositaire de tous ses beaux écrits.

Mais parce que ce Journal est principalement pour faire connoître par leurs ouvrages les personnes qui se sont renduës célèbres dans la république des lettres; on se contentera de donner icy le catalogue des écrits de ce grand homme; laissant aux autres le soin de luy faire un éloge plus ample et plus pompeux.

Il excelloit dans toutes les parties de la Mathematique; mais principalement dans la science des nombres et dans la belle Geometrie. On

a de lui une méthode pour la quadrature des paraboles de tous les degrés.

Une autre *de maximis et minimis*, qui sert non seulement à la détermination des problèmes plans et solides; mais encore à l'invention des touchantes et (¹) des lignes courbes, des centres de gravité des solides, et aux questions numériques.

Une introduction aux lieux, plans et solides; qui est un traité analytique concernant la solution des problèmes plans et solides; qui avoit été venu devant que M. Descartes eut rien publié sur ce sujet.

Un traité *de contactibus sphæricis*, où il a démontré dans les solides ce que M. Viet Maître des Requestes, n'avoit démontré que dans les plans.

Un autre traité dans lequel il rétablit et démontre les deux livres d'Apollonius Pergæus, des lieux plans.

Et une méthode générale pour la dimension des lignes courbes, etc.

De plus, comme il avoit une connaissance très-parfaite de l'antiquité, et qu'il estoit consulté de toutes parts sur les difficultez qui se presentoient; il a éclairé une infinité de lieux obscurs qui se rencontrent dans les anciens. On a imprimé depuis peu quelques-unes de ses observations sur Athénée; et celuy qui a traduit le Benedetto Castelli de la mesure des eaux courantes, en a inséré dans son ouvrage une très-belle sur une Epistre de Sinesius, qui estoit si difficile, que le Pere Petau qui a commenté cét auteur, a avoué qu'il ne l'avoit peu entendre. Il a encore fait beaucoup d'observations sur le Theon de Smyrne et sur d'autres Auteurs anciens. Mais la pluspart ne se trouveront qu'éparses dans ses Epîtres; parce qu'il n'écrivoit gueres sur ces sortes de sujets, que pour satisfaire à la curiosité de ses amis.

Tous ces ouvrages de Mathématique, et toutes ces recherches enriques de l'antiquité, n'empêchoient pas que M. de Fermat ne fit sa charge avec beaucoup d'assiduité, et avec tant de suffisance, qu'il a passé pour un des plus grands Jurisconsultes de son temps.

(1) *Livre des touchantes des lignes courbes.*

Mais ce qui est de plus surprenant, c'est qu'avec toute la force d'esprit qui estoit nécessaire pour soutenir les rares qualitez dont nous venons de parler, il avoit encore une si grande delicatesse d'esprit, qu'il faisoit des vers Latins, François et Espagnols avec la même elegance, que s'il eût vécu du temps d'Auguste, et qu'il eût passé la plus grande partie de sa vie à la Cour de France et à celle de Madrid.

On parlera plus particulièrement des ouvrages de ce grand homme, lors qu'on aura recouvert ce qui en a été publié, et qu'on aura obtenu de M. son fils la liberté de publier ce qui ne l'a pas encore été.



VI.

OBSERVATION DE MONSIEUR DE FERMAT

SUR SYNESIUS.

*Rapportée à la fin de la traduction du Livre de la mesure des eaux courantes,
de Benedetto Castelli (¹).*

Les pages qui restent vides dans ce cayer m'ont donné la pensée de les remplir de la belle observation que j'ay apprise ces jours passez, de l'incomparable Monsieur de (²) Fermat, qui me fait l'honneur de m'aimer, et de me souffrir souvent dans sa conversation. C'est sur la quinzième Lettre de Synesius Evêque de Cyrene, qui traite d'une matière qui n'a été entendue par aucun des interprètes, non pas même par le séavant Pere Petan, ainsi qu'il l'adyoné lui-même dans les Notes qu'il a faites sur cett Autheur; Et je donne d'autant plus volontiers cette observation, qu'elle a beaucoup de rapport avec les traitez qui sont cy-devant.

Cet Evêque écrit à la séavante Hypatia, qui estoit la merveille de son siecle, et laquelle enseignoit publiquement la Philosophie, avec l'admiration de tous les séavans, dans la celebre Ville d'Alexandrie. Fay

(¹) Traduction publiée par Saporita sous le titre : *Traicté de la mesure des eaux courantes de Benedetto Castelli religieux du Mont-Cassin et Mathematicien du Pape Urbain VIII. Traduit d'Italien en François avec un discours de la jonction des Mers, adressé à Messieurs les Commissaires députez par sa Majesté. Ensemble un Traicté du mouvement des eaux d'Evangeliste Torricelli, Mathematicien du Grand Due de Toscane. Traduit du Latin en François.* — A Castres, par Bernard Barouda, Imprimeur du Roy, de la Chambre de l'Edict, de la dite Ville et Dioceſe, 1664. — Le texte reproduit par Samuel se trouve pages 84-87, sous le titre : *Observation sur Synesius.*

(²) Monsieur Fermat Saporita.

traduit cette Lettre du Gree en cette maniere. Je me trouve si mal, que j'ay besoin d'un hydroscope. Je vous prie d'en faire faire un de cuivre, et de me l'achefer. C'est un tuyau en forme de Cylindre, qui a la figure et la grandeur d'une flente; sur sa longueur il porte une ligne droite, qui est coupée en travers par de petites lignes, par lesquelles nous jugeons du poids des eaux. L'un des bouts est couvert d'un cone, qui est posé également dessus, en telle sorte que le tuyau et le cone ont une même base. L'on appelle cét instrument Baryllion. Si on le met dans l'eau par la pointe il y demeura debout, et l'on peut aisement compter les sections qui coupent la ligne droite, et par là l'on connoit le poids de l'eau.


Comme nous avons perdu la figure et l'usage de cét instrument, de même qu'une infinité d'autres belles choses, que les Anciens avoient inventées, et dont ils se servoient, les seavans de ce temps icy se sont donnez beaucoup de peine pour comprendre quel estoit cét instrument dont parle Synesius. Il y en a qui ont cru que c'estoit une Clepsydre, mais le Pere Petau a rejetté avec raison cette opinion. Pour Iuy, il avouë, qu'il ne le comprend pas, il soupçonne pourtant que c'estoit un instrument qui servoit à niveler les eaux, et qui avoit du rapport avec celuy dont Vitruve fait mention au livre 8. ch. 6. de son Architecture, qu'il appelle Chorobates, mais il est aisē de juger par la lecture de Vitruve, et de Synesius, que ce sont deux instrumens fort differens, et en figure, et en usage, et que si tous denx ont des sections, comme remarque le Pere Petau, celles du Chorobates sont perpendiculaires sur l'horizon, et celles de l'hydroscope Iuy sont paralleles. Je passe sous silence plusieurs autres differences, que je pourrois remarquer, pour rapporter le sentiment de Monsieur de (¹) Fermat, qui est sans doute le veritable sens de Synesius. Cét instrument servoit pour examiner le poids des différentes eaux pour l'usage des malades; car les Medecins sont d'accord que les plus legeres sont les meilleures; le terme (²) ζεπτή, dont se sert Synesius, le monstre clairement. Il ne signifie

(¹) Monsieur Fermat *Saporta*.

(²) Terme de ζεπτή *Saporta*.

pas icy *libramentum* le nivlement, comme a écrit le Pere Petau, mais en matière de Machines, il signifie le poids, que les Latins appellent *momentum*, et de la le traité des equiponderans d'Archimede a pour titre Ἐπορθωνία⁽¹⁾. Mais d'autant que la balance, ny aucun autre instrument artificiel, ne pouvoit pas donner exactement la différence du poids des eaux, à cause qu'elle est⁽²⁾ petite entre elles, les Mathématiciens inventerent sur les principes du traité d'Archimede *de his quæ rehantur in aqua*, celuy dont parle Synesius, qui monstré par la nature des eaux mêmes, la différence du poids qu'elles ont entr'elles, la figure en est telle (fig. 150); AF est un Cylindre de cuivre, AB est le bout

Fig. 150.



d'en haut, qui est toujours ouvert, EF est le bout d'embas, qui est couvert du cone EIF, qui a la même base que le bout d'embas. AE, BF, sont deux lignes droites coupées par diverses petites lignes, tant plus il y en aura, tant plus exact sera l'instrument. Si on le met par la pointe du cone dans l'eau, et qu'on l'ajuste en telle sorte qu'il se tienne debout, il n'y enfoncera pas entièrement; car le vuide qu'il a au dedans l'en empêchera; mais il y enfoncera jusques à une certaine mesure, qui sera marquée par les petites lignes; et il y enfoncera diversement, suivant que l'eau sera plus ou moins pesante; car plus l'eau sera legere, plus il y enfoncera; et moins, plus elle sera pesante, comme il nous seroit aisé de le démontrer, s'il en estoit question icy. Voila la figure et l'usage de cét instrument, et la raison de cét usage. La lettre de Synesius s'y rapporte si exactement dans toutes ses circon-

⁽¹⁾ Ἐπορθωνία *Saporta*.
⁽²⁾ est fort petite *Saporta*.

stances, que feu Monsieur de Monchal, Archevéque de Tolose, ayant envoyé cette explication au Pere Petau, il avoüa que Monsieur de (1) Fermat estoit le seul qui avoit compris quel estoit l'instrument, et il avoit écrit que dans une seconde impression il la mettroit dans ses notes. Mais parce que cela n'a pas esté fait, j'ay cru que le Lecteur scavant et curieux ne sera pas marry que je lui en aye fait part.

(1) Monsieur Fermat *Saporta.*

VII.

VIRO CLARISSIMO DOM. DE RANCHIN,

SEN. THOL.,

PETRUS DE FERMAT S. P. D.

Polyaenum (¹) tibi tuum, Vir Clarissime, mitto, sed observanda in eo quaedam suppeditat codex manuseriptus optimæ notæ auctorum rei militaris hactenus imeditorum quem penes me habeo (²); apud eum collectionem quamdam præceptorum et monitorum militarium inveni sub nomine Παρεκθόλων, cuius auctorem licet manuseriptus non detectat, colligo tamen ex glossario Graecobarbaro Meursij (³), eum esse Heronem, non illum quidem Alexandrinum cuius spiritalia et alia quaedam opuscula extant, et qui antiquo, hoc est, optimo ævo, Graecè scripsit, sed alium posterioris ævi, quod pleraque ipsius vocabula Graecobarbara satis immunt; utrumque, aetatem nempe et nomen auctoris, confirmat Meursius in voce κοντουρέρνιον, ubi citantur sequentia Hero-nis verba in παρεκθόλων, ἀπέστειλε γρῦν τῆς νυκτὸς εἰς τὰ ἄπληκτα κύτων καὶ τὰ κοντουρέρνια, haec enim verba cum in meo manuscripto desint (⁴), supplendum in eo nomen auctoris ex manuseripto Meursii; tempus vero quo haec scribebantur et quo voces ἄπληκτον et κοντου-

(¹) Les observations critiques qui suivent se rapportent à l'édition *princeps* du texte grec de Polyen, donnée par Casaubon (Lugduni, 1589, apud Io. Tornaeum, in-12). Elles ont été recueillies par Samuel Mursinne dans la préface de son édition, Berlin, 1756.

(²) On ignore ce qu'est devenu ce manuscrit grec.

(³) Imprimé à Leyde en 1587, réimprimé en 1614 et 1620.

(⁴) Il faut sans doute lire *advint*.

ζέρνιον in usu erant, ultra septingentos plus minus annos non videtur excurrere; in hoc autem παρεκθετῶν tractatu, pleraque Polyenii strategemata suppresso authoris nomine alijs saepe verbis referuntur, quandoque et ijsdem, unde ampla emergit emendationum et notarum criticarum penus; celebriores aliquot tibi, vel si mavis doctis omnibus tuo nomine jure representationis libenter exhibeo.

Cleomenis strategema narratur lib. I Polyenii pag. 20 editionis Tornæsianæ sequentibus verbis: Κλεομένης, Ακαδαιμονίων βασιλεὺς (¹), Ἀργείοις ἐπολέμει καὶ ἀντεστρατοπέδευσεν. τὴν τοῖς Ἀργείοις ἀκριβῆς συλλαχὴ τῶν δρωμένων τοῖς πολεμίοις καὶ πάντας ὅσα Κλεομένης βούλοιτο, ὃπος αἱρευχος ἐσήμαινε τῇ στρατιᾷ, καὶ αὐτοὶ τὰ ἵσα δρᾶν ἐσπούδαξαν. ὅπλι-
ζομένων, ἀγθωπλίζοντο. ἔξιόντων, ἀντεπεξίεσαν ἀναπομονένων ἀντανε-
παύοντο. Κλεομένης λάθια παρέδωκεν ὅταν ἀριστοποιεῖσθαι αγρύζῃ, ὅπλι-
σασθαι· ὃ μὲν ἐκήρυξεν, οἱ δὲ Ἀργείοις πρὸς ἄριστους ἐτράποντο. Κλεομένης
ώπλισμένους ἐπαγγάγων εὑμαρῶς ἀνόπλους καὶ γυμνοὺς τοὺς Ἀργείους
ἀπέκτεινε, hoc loco post verba ἔξιόντων, ἀντεπεξίεσαν, addendum ex
manuscripto ἀριστώντων, ἡρίστων, quod finis ipsius strategematis plem-
nissimè confirmat.

Themistoclis strategema, eodem libro pag. 14, refertur hoc modo: Θεμιστοκλῆς Ἰωνων Ξέρεῃ συμμαχούντων, ἐκέλευσε τοῖς Ἑλλησι κατα-
γράψειν ἐπὶ τοῦ τείγους, Ἄνδρες Ἰωνες, οὐ δίκαια ποιεῖτε στρατεύοντες
ἐπὶ τοὺς πατέρας. τούτων ἀναγνωσκωμένων, βασιλεὺς ὑπόπτους αὐτοὺς
ἐποιήσατο, corrigendum ex manuscripto ἐλογίσατο, quam esse veram
lectionem innuit sensus.

Agesilai strategema occurrit lib. 2^o (²), pag. 86. Ἀγησιλαος, ait ille, ἐν Κορωνείᾳ Ἀθηναίους ἐνίκησεν· γῆγειλέ τις, οἱ πολέμοις ρεύμοισιν
εἰς τὸν γεών τῆς Ἀθηνᾶς· ὃ δὲ προσέταξεν, ἐδῆν αὐτοὺς οἱ καὶ βούλοιντο
ἀπίειναι· ως ἀρα εἴη σραλερὸν συμπλέκεσθαι τοῖς ἐξ ἀπονοίας μαχομένοις.
ibi loco vocis Ἀθηναίους reponendum ex manuscripto Θηθαίους.

(1) Les *Varia* omettent Ακαδαιμονίων βασιλεὺς, que donne le Diophante de 1670. Pour tout le reste du détail des passages cités (grec et traduction latine), on a suivi le texte de l'édition de Polyen de 1589.

(2) Samuel a imprimé *lib.* 30.

Aliud Agesilai stratagema refert Polyænus eodem libro pag. 103. Αγησιλαος ἐν ταῖς διεπρεπείαις ἥξιον τῶν πολεμίων τοὺς μάλιστα δυνατούς πέμπεσθαι πρὸς αὐτὸν, οἷς διακλέζηται περὶ τῶν καινῇ συμφερόντων· τούτοις ἐπὶ πλειστον συγγενέμενος καὶ κοινωνῶν ἐστίας καὶ σπουδῶν, ταῖς πολεστιν στάσιν ἐνεποίει διὰ τὰς τῶν πολλῶν ὑποψίας. Vulteius hoc modo interpretatur : *Agesilaus in legionibus petebat ab hostibus, ut maximè potentes ad se mitterent; cum quibus de communi utilitate sermones conferret. Cum his plurimum habens consuetudinis, et communicans focum et cineres, seditiones in urbes excitabat, propter vulgi suspiciones. Videlur interpres loco verbi σπουδῶν quod est in textu Graeco, legisse σποδῶν cum vertat *cineres*, sed nihil mutandum ex manuscripto evincitur ubi leguntur haec verba καὶ ὅρχους πρὸς αὐτοὺς ποιούμενος.*

Clearchi stratagema narratur libro eod. pag. 110, his verbis : Κλέαρχος τὸν ἐν Θράκῃ νυκτερινὸν φέρει τὸ στράτευμα κατελάμβανον, ἡ δὲ παράγγειλεν, εἰ γένοιτο νύκτωρ θόρυβος, μηδένα δρῦσὸν ἀνίστασθαι· ἡ δὲ ἀνατάξις ἀναρρείσθω. τὸ παράγγελμα τοῦτο ἔδιδαξε τοὺς στρατιώτας, καταρροῦντο τοὺς νυκτερινοὺς φέρου. Verba quidem hīc supplenda ex manuscripto, que tamen videntur in suo codice vidisse interpres Latinus, licet desint in editione græcā Tornæsij, sunt autem sequentia, καὶ οὕτως ἀνεπαύσαντο ἀναπτρῶντες καὶ ταρασσόμενοι. Atque ita desierunt exilire ac perturbari.

Perdicæ stratagema sequens legitur libro 4, pag. 314 (¹) : Περδίκας Ἰλλυριῶν καὶ Μακεδόνων πολεμούντων, ἐπειδὴ πολλοὶ Μακεδόνες ἥλισκοντο ζωγρεῖν, καὶ οἱ λοιποὶ Μακεδόνες λύτρων ἐλπίδι πρὸς τὰς μάγιας ἦσαν ἀτολμότεροι, ἐπεκγρυκεύσατο περὶ λύτρων, ἐντελάμενος τῷ κήρυκι, ἐπονεθόντι ἀγγεῖλαι, ὡς ἄρα λύτρα Ἰλλυριοὶ μὴ προσίσιντο, ἀλλὰ ψηφίσαιεν τοὺς αἰγυμαλώτους απιννύειν. οἱ δὲ Μακεδόνες ἀπογνόντες τῆς διὰ τῶν λύτρων σωτηρίας, εὔτολμότεροι πρὸς τὰς μάγιας ἐγένοντο, ὡς ἐν μόνῳ τῷ νικᾷν ἔγροντες τὸ σύνεσθαι, quod sic interpretatur Vulteius. *Perdiccas, Illyriis et Macedonibus bellum gerentibus, cum multi Macedones caperentur rivi, reliqui etiam redemptionis spe ad pugnam minùs alacres erant.*

(¹) Les Farin indiquent pag. 111.

quibus legationem inter se de redemptoriis muneribus mittentibus, praecepit legato, ut reversus nuntiaret, se redemptoria munera Illyriorum non accepturum, sed condemnatos captivos morte affecturum. Macedones, desperatè salute redemptivè, audacieores ad pugnandum reddeabantur, quippe quibus in sola victoriā salutis posita esset. In hoc stratagemate vocem Ἄλλωροι mutandam in Ἄλλωρῶν indicat nota marginalis editionis Tornesianæ; si vera esset explicatio Vulpii, non solum vera sed et necessaria esset illa emendatio, sed frigidissimum esset stratagema, si sequeremur sensum interpretis: Polyenus quippe vult Perdiccam praecepisse legato, ut reversus nuntiaret Illyrios redemptoria munera non accepturos, et hic est verus sensus stratagematis, quem Hero aliis verbis, secundum hanc quae est vera et germana interpretatio, expressit in manuseripto his verbis, ἐπετήρευτε τοιούτον, παρεσκεύασε τινὰ ὡς πρόσφυγα ἐλθόντα ἀπὸ τῶν πολεμίων εἰπεῖν ὅτι οἱ πολέμιοι ἔσουσι εύσταχτο καὶ ἀπεκύρωτα ἵνα ὅσους κρατήσουσιν αἰγυμαλώτους ἀποκτείνωσι.

Alexandri stratagema refertur etiam lib. 4, pag. 248, verbis sequentibus, Ἀλέξανδρος Δαρείῳ παρατάσσεσθαι μέλιτων, παράγγελμα τοῖς Μακεδόνιν ἔδωκεν· ἦγε ἐγγῆς γένησθε τὸν Ηέρσων, εἰς γόνοι κλίναντες τοῖς γερσιν· διατρίβετε τὴν γῆν. ἦγε δὲ ἡ σάλπιγξ ὑποσημήνη τότε δὴ.... Μακεδόνες οὕτως ἐποίησαν· οἱ δὲ Ηέρσαι στήμα προσκυνήσεως ἰδόντες, τὴν πρὸς τὸν πόλεμον ὄρμὴν ἔξελυσαν καὶ ταῖς γνώμαις ἐγένοντο μαλακώτεροι. Δαρείος δὲ ἐκυδρίσθη, καὶ φαιδρὸς ἦν, ὡς ἀμαρτία κρατῶν· οἱ δὲ Μακεδόνες ὑπὸ τῷ συνθήματι τῆς σάλπιγγος ἀναπηδήσαντες, ὁμορόδην ἐμβάλλουσι τοῖς πολεμίοις, καὶ τὴν φάλαγγα φέρειντες, ἐς φυγὴν ἐτρέψαντο.

Hoc loco desunt quaedam verba post vocem τότε, quae supplenda ex manuseripto ubi narratio est integra et elegans: lacuna itaque ex eo sic replenda, τότε μετὰ θυμοῦ καὶ ἀνδρείας τοῖς πολεμίοις προσθάλλετε.

Pammenis stratagema tale proponitur libro 5, pag. 385. Παχυμένης ὀλέκηγην ἔγων δύναμιν ὑπὸ πλειόνων ἀποληρθείεις, ἐπεμψεν αὐτόμοιον ἐς τὸ τὸν πολεμίων στρατόπεδον· ὃ δὲ σύνημα ἐκμαθὼν ἐπανελθὼν ἤγγειλε τῷ Παχυμένει. ὃ δὲ νυκτὸς ἐπιθέμενος τοῖς πολεμίοις, πολλοὺς αὐτῶν φθείρας διεξιπάσατο αὐτὸς σύνημα· τοῖς δὲ ἦν ἀπορία, γνωρίζειν ἐν σκέτῳ τοὺς οἰκείους μὴ δύναμένοις διὰ τοῦ συνθήματος.

Hic addenda ex manuscripto post verbum αὐτὸς sequentia, αὐτὸς μὲν καὶ ὁ τούτου στρατὸς ἐγίνωσκον τὸν πολεμίων τὸ σύνθημα, ἐκεῖνοις δὲ θπορίᾳ ἡνὶ τῷ σκότῳ τῆς νυκτὸς γνωρίζειν τοὺς ιδίους ἢ τοὺς πολεμίους, τὸν πολεμίων τὸ σύνθημα ἀποκρινομένων.

Pompisei stratagema refertur lib. 5, pag. 402. Ηομπίσκος, περιστρατεύσθων πολιν, ἐπὶ μὲν τὴν πολλὴν τῆς γύρας ἔξιέναι τοὺς πολεμίους ἐκφύγουσιν ἐπὶ δὲ τόπον ἔνα συνεγένετο... καὶ τοις λητομένοις ἀπέγεσθαι τοῦ τόπου τούτου προσέταξεν, οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως ἀδεὼς ἐνταῦθα προσέσαν· ἡ δὲ παρὰ τῶν σκοπῶν ὡς ἔμαθεν τοὺς ἤκοντας πολλούς, ἐπιθέμενος τοὺς πλειστούς αὐτῶν ἐγγείρεσσατο.

Vox συνεγένετο, quae hic vulgo legitur, corrigenda ex manuscripto et loco illius reponendum συνεγένεται quod ex conjecturā viderat Casaubonus ut patet ex ipsius notis.

Alexandri Pherensis stratagema refertur lib. 6, pag. 426. Ἀλέξανδρος Ηάνορον πολιορκούντος Λεωσθένους πρὸς ὄπασας τὰς Ἀττικὰς ναῦς φρανερῶς νυκτογείν οὐ θερρῶν, διέπεμψεν ἐπὶ ἀκάπτου νύκτωρ, etc. legendum esse, ἐπὶ ἀκαπτοῦ, ut vult Casaubonus in notis, confirmat codex manuscriptus ubi legitur διὰ μικροῦ πλοιαρίου, quæ verba idem sonant.

Cyri stratagema narrat Polyænus lib. 7^a (²), pag. 477, his verbis, Κύρος Μήδοις παρατελέμενος τρὶς ἤτερην, ἐπεὶ δὲ τῶν Ηέρων οἱ γυναικες καὶ τὰ τέκνα τῆσαν ἐν παταργάδαις, τὴν τετάρτην μάγγην ἐνταῦθα συντρίψει πᾶσιν ἔρυγον οἱ Ηέρωι, ὡς δὲ οἶδον τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναικας, παθόντες ἐπ' αὐτοῖς, ἀνέστρεψον, καὶ τοὺς Μήδους ἀτάκτως διώκοντας τρεψάμενοι, νίκην τελειωάντην ἐνίκησαν, ὡς μηδέπι Κύρον πρὸς αὐτοὺς ἀλληλούς δειθηγατο μάγγης.

Hic loco voxis παθόντες corrigendum ex manuscripto συμπαθόντες, quae vox itidem restituenda in stratagemate Apollodori pag. 435, manuscriptus noster ex quo coniicimus vocem παθόντες mutandam in συμπαθόντες verbis sequentibus rem narrat et stratagema Polyæni exprimit, si δὲ συμπαθέσι τούτων νικάσμενοι, etc. vox autem illa melius

authoris sensu respondet quam τι παθόντες ut legendum censuit Casan-

bonus.

Darii stratagema narratur lib. 7, pag. 489, hoc modo. Δαρεῖος ἐποίε-
μει Σακκάρις τριγῇ διηρημένοις μιᾶς ἑκατησες μοίρας· τῶν δὲ Σακκῶν
ἴζωντων τὰς ἑσθῆτας, καὶ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ὅπλα περιέθηκε τοῖς Ήρ-
σιοῖς, etc. hic loco vocis ίζωντων que est corrupta in editione Tornesii,
legendum ex manuscripto ἀναφεύεται.

Autophradatis (¹) stratagema legitur lib. 7, pag. 516 et tale est,
Αὐτοφραδάτης ἐμβαλεῖν Ηισιδάτις βουλέμενος τὴν εἰσβολὴν στενόπορον
καὶ ψυλαττομένην ὁρῶν, προστίγαγε μὲν τὸ στρατόπεδον, πάλιν δὲ ἀπέγα-
γεν ὀπίστω, μέγιοι σταδίων ζεῦξις ἐπήλθεν, οἱ μὲν ψυλάττοντες τῶν Ηισι-
δῶν ἀπεγκλάγησαν, οἱ δέ μενοι τοὺς πολεμίους ἀπελτήσθησαν· ὃ δὲ τῶν Κιλῶν
καὶ ὀπλιτῶν τοὺς ἐλαρροτάτους ἤσθιον, πολλῇ σπουδῇ δέραμον διῆλθε τὰ
στενὰ καὶ τὴν Ηισιδῶν γῆραν ἐπέρθησεν.

In hoc stratagemate loco verborum μέγιοι σταδίων ζεῦξις reponendum
procul dubio ἐπίσημον κέππω, quod Vulcius arithmeticarum apud Grae-
cos notarum parum callens non intellexit, similitudine inter ζ quod
significat 6, et ζ' quod significat 90, delusus, legendum igitur μέγιοι
σταδίων ζ', quam esse veram lectionem, ratio ipsa primum confirmat,
si enim Autophradates ad sex tantum stadia recessisset, hostes suspi-
cione, et metu non liberasset, deinde in manuscripto legitur ἔννενή-
κοντα absque notis arithmeticis.

Scipionis continentiae exemplum laude dignissimum refertur lib. 8,
pag. 568, sequentibus verbis, Σκηπίων δορυσίκωτον ἤσθιον ἐν Τερρίᾳ
πόλιν Φοίνισσαν, ὡς οἱ ψυγαγωγοὶ παρθένον ἔργαγον κάλλους ὑπερρυθώς
ἔγραψαν, τὸν πατέρα καῦτης ἀναζητήσας, ἐγχρίσατο καῦτῷ τὴν θυγατέραν.
τοῦ δὲ δόραν προσκομισαντος, ὃ δὲ καὶ ταῦτα συνεγχρίσατο, προτικαὶ ψήσας
ἐπιδιδόνται τῷ κόρῃ, etc. ibi vulgo legitur ψυγαγωγοὶ quod interpres
vertit *capiticorum ductores*, sed legendum ex manuscripto ψυγαγωγοὶ.

(¹) Cet alinéa et le suivant sont dans le Diophante de 1670, mais manquent dans les *Faria*.

hoc est *virginum ductores*, quæ correctio et verissima et elegantissima,
ut nullus supersit dubitandi locus.

Plura adjungerem, sed feris jam desinentibus quarum beneficio
otium suppetebat, finem quoque huic παρεκθελῶν παρεκθελῆτη imponi-
mus. Vale et me ama.



VIII.

VIRO CLARISSIMO D. DE PELLISSON,

LIBELLOBUM SUPPLICUM MAGISTRO.

SAMUEL DE FERMAT S. P. D.

Criticas observationes quas mihi nuper misisti, vir clarissime, saepius legi non sine voluptate et admiratione; in illis enim ingenii, judicij, et doctrinæ dotes quas in te jampridem suspicimus ubique elucent: nihil autem invenire possum quod tanti muneris vice tibi referam, nisi commodum egestati meae succurrerent variae lectiones quas vir tibi singulari conjunctus amicitia, cujus mihi juvanda semper est recordatio, margini apposuit quorundam librorum quos sedulo pervaluebat, et quorum pleraque loca, sed ἤδος πάρεργον, emendavit: scis enim quam præcoci ille libertate florum amoenitatem fructum matritati junxerit, nec me latet quantu ipse fiducia suas exercitationes solitus sit in tuum sinum effundere; licet autem omnes istae quas excerpti emendationes, vel parentis mei conjecture⁽¹⁾, tibi novitatis gratia non commendentur, illas tamen, quæ tua est comitas, te benigna manu suscepturum non dubito.

Theonem Smyrnæum, ne te diutius morer, vir clarissime, nosti, auctorem operis illius cui titulus τῶν κατὰ μαθηματικὴν γρηγορίων εἰς τὴν ζωὴν Ηλέατονς ἀνάγνωσιν, quod prodromi instar est aut isagoges Philo-

(1) Les mots *vel parentis mei conjecture* sont omis dans le Diophante de 1670.

sophiae Platonicae, quæ nemini Geometriâ non initiatu patebat : illud opus edidit Lutetiae anno 1644 Ismael Bullialdus vir doctissimus et Latinitate donatum elegantibus notis illustravit ; sed non omnibus illud mendis purgasse videtur, ut aliquot, ni fallor, exemplis, quæ sequuntur, planum fiet.

Primum occurrit pag. 78 illius operis ubi περὶ ἀρμονίας et συμφωνίας agit : locum illum exscribere non piget, ipsa enim series emendationis procul dubio necessitatem et veritatem ostendet : τὰ (¹) γράμματα, ait ille, ψωνὶ πρώται εἰσὶ καὶ στοιχείωδεις (²), καὶ διαιρέτοι, καὶ ἐλάχισται etc. (³), et inferiorū, τὰ δὲ διαστήματα ἐκ τῶν φθόγγων, οἵτινες πάλιν ψωνὶ πρώται καὶ διαιρέτικαι, καὶ στοιχείωδεις, huius vocis διαιρέτικαι asteriscus in margine (⁴) respondet cum voce διαιρέται, at hic repónenda his videtur vox ἀδιαιρέτοι loco τοῦ διαιρέτοι et διαιρέτικαι, legendū nempe γράμματα ψωνὶ εἰσὶ ἀδιαιρέτοι, idque confirmat Manuel Bryennius (⁵), cap. 1, lib. 2 Αρμονικῶν : legendū præterea φθόγγων, οἵτινες πάλιν ψωνὶ εἰσὶ πρώται καὶ ἀδιαιρέτοι, et haec quoque lectio confirmatur verbis ejusdem Bryennii lib. 1, cap. 3, ubi dicit φθόγγος ἔστι ἀργή ἀρμονίας ὡς ἡ μονάς τοῦ ἀριθμοῦ, τὸ σημεῖον τῆς γραμμῆς, καὶ τὸ νῦν τοι γέροντο, punctum vero et instans sunt ἀδιαιρέται et consequenter φθόγγος ἀδιαιρέτος, non dividendi vim habens, ut vult interpres Latinus (⁶) : nec immerito Bacchinius Senior in introductione artis musicæ (⁷) quaestioni illi τί σῦν ἔστιν ἐλάχιστον τῶν μελωδούμενῶν, respondet, φθόγγος, quem non tantum ἐλάχιστον, sed etiam ἀπομονοῦ esse

(¹) Le texte de Boulliau porte τὰ δὲ.

(²) Les mots καὶ στοιχείωδεις sont omis dans les *Faria*.

(³) Les *Faria* omettent etc.

(⁴) La leçon διαιρέται est également indiquée en marge, par Boulliau, pour διαιρέτοι dans le premier passage.

(⁵) Le texte grec de Manuel Bryenne n'a été publié que par Wallis, dans le Tome III de ses Œuvres (Oxford, 1699). Samuel de Fermat cite donc cet auteur d'après un manuscrit, que M. H. Omont a retrouvé à la Bibliothèque Nationale. Il contient, de la main de Fermat, des annotations critiques que nous publions comme dernière pièce de cet appendice.

(⁶) Boulliau traduit comme suit le second passage grec donné plus haut : *intervallo vero sonis [constant], quae voces rursum sunt primæ, vim dividendū habentes, et elementares.*

(⁷) *Antiquar musicar auctores septem*, ed. Meibomius (Amsterdam, 1652), I, page 1.

docet antiquæ musicæ celeberrimus auctor Aristides Quintilianus lib. I de Musicâ (¹), atque ita authoritas æque ac ratio suffragatur huic emendationi, quæ fit unius tantum litteræ mutatione. Minimè quoque mutatione alia fit eodem capite licet minoris momenti correccio, ubi vulgò male legitur, φησὶ καὶ τοὺς Πυθαγορικοὺς, legendum scilicet, φασὶ, ut apud Bryennium λέγουσι (²). Paulò inferius ubi legitur ἀποτελεῖται ἡ φθόγγος βραδεῖας δὲ βαρύς, καὶ σφοδρᾶς μὲν μείζων ἥγος, ἕρεμου δὲ μικρὸς, legendum videtur ἔρεμαίας, et Bryennii authoritate confirmatur (³).

Haetenus de sono de quo agitur in cap. illo 6. In cap. vero 8, agitur de semitonio, et ita vulgò legitur καθή (⁴) καὶ τὸ ἡμίφωνον γράμμα σύγ, ώς ἡμίσυ ρωνῆς καλούμεν, ἄλλ' ὡς μὴ τῷ αὐτοτελεῖ κατὰ ταῦτα φωνεῖν, legendum vero videtur καθὸς non καθή (⁵) : legendum præterea ἄλλ' ὡς μὴ αὐτοτελῆ καθὶ κατὰ τρονῆς ἀποτελούν, quæ lectio ejusdem Bryennii authoritate nixa veriore vulgatā sensum efficit.

Atque harum probatio lectionum desunni potest, ἐκ τῶν παρὰ τοῖς μουσικοῖς ὑποτιθεμένων καὶ ἐκ τῶν παρὰ τοῖς μαθηματικοῖς λαμβανομένων, ut Porphyrii verbis utar, quæ in commentariis clarissimi interpres referuntur pag. 276, sed non sine mendo, malè enim ibi legitur, ἐκ τῶν παρὰ (⁶) τῇς μουσῆς ὑποτιθεμένων.

Nec silentio prætermittenda est elegantissima, et audacter dicam, certissima alterius loci ejusdem Theonis emendatio paginâ 164, ubi de oetonario loquitur : refertur ibi vetus inscriptio quam in columna Aegyptiaca reperiri tradidit Evander hoc modo, Ηρεσθύτατος πάντων Οσιρίς, θεοῖς ἀθανάτοις, πνεύματι, καὶ οὐρανῷ, ἥλιῳ καὶ σελήνῃ, καὶ γῇ.

(¹) *Antique musicæ auctores septem*, ed. Meibomius, II, page 33.

(²) Dans son édition *Theonis Smyraci Expositio rerum mathematicarum*, Teubner, 1878, Ed. Hiller n'a pas adopté cette correction, comme il l'a fait pour les précédentes; et en effet, Théon continue à citer ici le péripatéticien Adraste. L'erreur de Fermat a été au reste occasionnée par Boulliau, qui a traduit *aiunt*.

(³) Hiller lit ἡεπίκει, qui est moins bon.

(⁴) καθὴ Samuel. Mais Boulliau donne καθή, qui n'a nullement besoin d'être corrigé en καθὸς. Samuel a dû faire quelque méprise. - Hiller suit, dans ce passage, la leçon de Fermat, en supprimant le dernier mot ἀποτελοῦ, qui est surabondant.

(⁵) καθὸς Samuel.

καὶ νοῦτὸν, καὶ ἡμέραν (¹), *καὶ πατέρι τῶν ὄντων καὶ* (²) *ἐσομένων ΕΡΩΤΕ*
πνηγεῖς τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς βίου συντάξεως, id est, ut vertit Bullialdus,
antiquissimus omnium Rerum Osiris diis immortalibus Spiritui, et Carlo, Soli,
et Luna, et Terrae, et Nocti, et Dici, et patri corum qua sunt quaque
futura sunt, prædicabo memoriam magnificentiae ordinis ritus ejus : men-
dosum procul dubio in hæc inscriptione illud ΕΡΩΤΕ, et hanc lec-
tionem si refineas quis inde sensus elici poterit? legendum igitur
ΕΡΩΤΗ, atque ita parvâ unius scilicet litteræ mutatione huic loco sua
lux, et amoris sua laus facile restituitur; nec aliena est ab hoc loco sa-
pientissimi Platonis, eujus velut interpres Smyrnaeus ille, sententia,
dum ait in convivio (³) καὶ μὲν δὴ τάν γε τῶν ζώων ποίησιν πάντων τις
ἐνοντιώσεται μὴ οὐχὶ (⁴) *ἔρωτος εἶναι σορτίαν τῇ γίγνεται* (⁵) *καὶ φύεται*
πάντα τὰ ζῶα, etenim animalium omnium affectionem, ut vertit Serranus,
ex amoris sapientiâ existere, id est gigni atque nasci, ecquis negaverit,

Per quem genus omne animantium
Concepitur, visitque exortum lumina Solis (⁶).

Apud Iulium Frontinum (⁷) de aquæductibus Romæ pag. 106 editionis Plantinianaæ, vulgò sic legitur: *in vicenariâ fistulâ, que in consti-*
nio utriusque rationis posita est, utrique rationi penè congruit. Nam habet
secundum eam computationem, que interjacentibus modulis servanda est
in diametro quadrantes viginti: cum diametri ejusdem digiti quinque sint
et secundum eorum modulorum rationem qui sequuntur ad eam, habet
digitorum quadratorum ex gnomoniis viginti. Hic procul dubio legen-
dum non ad eam, sed aream: eujus emendationis ratio ex supputatione
geometrica ducitur.

(¹) καὶ ἡμέραν. *Samuel.*

(²) καὶ τῶν *Samuel.*

(³) PLATON, *Banquet*, 197 a. — Samuel emploie l'édition de Platon d'Henri Estienne, 1578, qui renferme la traduction latine de Jean de Serres.

(⁴) μὴ *Samuel.*

(⁵) La vulgate ajoute τι.

(⁶) LUCRECE, *De Rerum natura*, I, v. 4-5: *Per te quoniam genus etc.* — Hiller a adopté la leçon Ερωτε proposée par Fermat.

(⁷) Voir ci-après, sous le numéro X, la Lettre de Fermat à Ismael Boulliau du 21 novembre 1645.

Eadem enim paginā legitur, *centenaria autem et centenum vicenum, quibus assidue accipiunt, non minuantur, sed augmentur. Nec usu frequens est*: videtur legendum *Cen.* id est *centenaria*, loco vocis illius *Nec.* litteris scilicet ordine inverso accipiendo, cum fortasse in manuscripto repertum fuerit *Cen.* hoc est *centenaria*, quod transcriptor transposuit et legendum *Nec.* particulā sensui magis, ut videbatur, accommodatā perperam existimavit.

His emendationibus unam aut alteram duorum insignium locorum addam, quorum primus est apud Sextum Empyricum, alter apud Athenaeum : Sextus ille (¹) lib. I. Pyrrhonianum hypotyposeon pag. 12, ostendere conatur quam variæ sint pro diversitate aetatum Phantasiae, παρὰ δὲ τας ἡλικιας, inquit, διτὶ οἱ αὐτὸς ὄχη τοις μὲν γέρουσι φυγόδες εἰναι δοκει· τοις δὲ ἀκριδίουσιν, εὔηραστος. καὶ <τὸ> αὐτὸς βρῶμα τοις μὲν πρεσβυτάτοις ἀμαυρὸν φαίνεται, τοις δὲ ἀκριδίουσι κατακορὲς, καὶ ϕωνὴ <δροῖως> τῇ αὐτῇ τοις μὲν ἀμαυρα δοκει τυγχάνειν, τοις δὲ ἔξακουστος, id est, ut vertit Henrion Stephanus, *Ex aetatibus autem quoniam idem aer senibus quidem frigidus esse videtur, aliis qui in aetatis flore* (²) *sunt, bene temperatus, et idem cibus, senibus quidem tenuis ridentur, at iis qui florent aetate crassus; eodem modo et vox eadem, aliis quidem depressa esse videtur, aliis autem* (³) *alta;* at hujus loci eleganter sensus erit si legatur non βρῶμα sed γρῶμα, alioquin de sensu visus qui facile maximam mutationem patitur, nullus hie foret sermo: præterea τὸ ἀμαυρὸν melius colori convenit quam cibo, et aequè de colore ac de cibo dici potest τὸ κατακορές, sic apud Virgilium legimus, *saturatas murice vestes* (⁴) *et h̄ali saturo fucata colore* (⁵).

Nunc ad Athenæi locum transeo; quis autem urbanissimi illius

(¹) Fermat s'est servi de l'édition gréco-latine des Chouet, Orléans, 1621. Il faut lire pour la référence pag. 22, au lieu de page 12.

La correction qu'il propose a été adoptée par Fabricius dans son édition gréco-latine des Œuvres de Sextus Empiricus, page 28, note Z. Elle avait été également proposée par Sauvaise.

(²) flore constituti sunt *Samuel*.

(³) vero *Samuel*.

(⁴) Cette expression est de Martial, VIII, 48.

(⁵) *Georgiques*, IV, 335.

scriptores sales varià conditos eruditione ignorat? Et si quid in eo frigidum aut inficetum occurrat, quis ibi mendum subesse non suspicetur? Suspecta igitur erit lectio loci illius in quo hic auctor lib. 12. loquitur de depravatis Alcibiadis moribus, qui locus si vulgatam lectionem retineas ipso forsitan Alcibiade depravatior erit : Athenaei (¹) verba haec sunt, Λυσίας δὲ ὁ φίλωρ περὶ τῆς τρυφῆς αὐτοῦ λέγων φησίν· ἐκπλεύσαντες γάρ ποιητῇ Ἀξιογος καὶ Ἀλκιβιάδης εἰς Ἑλλήσποντον ἔγημαν ἐν Ἀθύδῳ δύο σύντε, Μεδοντίδας τὴν Ἀθύδην δὲν, καὶ Ξυνοκείπην. ἐπειτα κύτοιν γίνεται θυγάτηρ, ἣν οὐκ ἔρχεται δύνασθαι γνῶναι, ὅποτέρου εἴη. ἐπεὶ δὲ τὴν ἀνδρὸς ώραῖς, ξυνεκοιμῶντο καὶ ταύτῃ, καὶ εἰ μὲν γρῦπτο καὶ ἔγοι Ἀλκιβιάδης, Ἀξιογος ἔραστεν εἶναι θυγατέρα· εἰ δὲ Ἀξιογος, Ἀλκιβιάδης : error hic procul dubio in voce illa Ξυνοκείπην et legendum Ξυνοκείπην (²) hoc est *concubuerunt*, atque ita si falsa Xynocceipe deleatur, et sola supersit illa duobus nupta Medontias, portentosæ istorum invenum libidinis novitati nihil detrahetur; veritas autem istius emanationis satis per se patet, et ex ipsâ loci serie elici potest, in quo illud δύο σύντε alioqui supervacuum foret, nec jam amplius ambigua proles; ratio igitur illius correctionis in promptu est, cui ejusdem Athenaei accedit authoritas, is (³) enim lib. 13. iterum de Alcibiade loquitur hoc modo, Μεδοντίδας γοὺν τῆς Ἀθύδην δὲς ἀκοῆς ἔρασθεις (⁴) ἔστερξε, καὶ πλεύσας εἰς Ἑλλήσποντον σὺν Ἀξιόγῳ, δὲς ἣν αὐτοῦ τῆς ώρας ἔραστης, ὡς φησι Λυσίας ὁ φίλωρ ἐν τῷ κατ' αὐτοῦ λόγῳ, καὶ ταύτῃ

(¹) Pages 534-535 de l'édition de Lyon, 1657. — Page 704 de cette même édition, après certains *Collectanea in aliquot Athenaei loca*, *Authore Viro Illustri L. I. S. T.*, on dit :

« ALIA IN ATHENEUM ANIMADVERSIO SINGULARIS, AUCTORE VIRO ILLUSTRI P. F. S. T. »

Page 535 A. Μεδοντίδας τὴν Ἀθύδην καὶ Ξυνοκείπην.

« Mirum viros doctos non animadvertisse hic mendum subesse, cum si ponas Axiochum et Alcibiadem duas uxores duxisse, Medontiadem et Xynocceipen, tota periit lepidæ narrationis gratia. Legendum verò pro Ξυνοκείπην, συνορεῖτην, à verbo συνορεῖν, numero duali præteriti actiū imperfecti, id est conceumbabant, Axiochus nempe et Alcibiades vni tantum Medontiadi, quæ cùm filiam peperisset, dubium quidem erat ex utrius semine nata esset : ideoque cùm pulber esset facta, vterque in illius amplexus ruebat, eo praetextu, quod non ex se, sed ex altero susceptam diceret. »

(²) On plutôt Ξυνοκείπην. La leçon συνορεῖτην (*voir* la note précédente), qui ne conserve pas la forme attique, ne peut guère être attribuée à Fermat.

(³) Page 574 de l'édition de 1657.

(⁴) Ce mot ἔρασθεις est omis par *Samuel*.

ἐξοιρώντει τῷ πόλεμῳ, id est ut interpretatur Dalechampius, *Medontidem Abydenam auditione tantum ille amare coepit, et imprimis charam habuit. eam tamen eum Hellespontum nacibus adiisset. Axiocho navigationis comiti, et pulchritudinis ipsius amatori, ut inquit Lysias in oratione quam contra eum scripsit, utendam dedit : ibi autem fictitiae Xynoceipes nulla mentio, et illud ἐξοιρώντει æque ac ξυνωκείτη communes Aleibiadis, et Axiochi amores fuisse satis arguit.*

Sed ab istorum juvēnum voluptate oculos avertamus, et eam quæ ex studiorum societate percipitur, puriorem et diuturniorem, summumque adversorum solatium litteras esse fateamur; cum tu his mirum in modum ohlecteris, non iniucundas tibi fore confido observationes in quibus amici manum agnosees; ipsius ego lucubrationum sparsas varijs in locis reliquias è tenebris quibus abditæ jampridem erant (¹), eruere conatus sum, neque hæc contemnda duxi, ut ex hoc spicilegio rerum quæ diligentissimos (²), ut ita loquar, messores latuerunt, pateat, quantam earum auctor in liberiori et conjecturis aperto critices campo segetem fuerit collecturus, si saepius in illo spatiari voluisset : Vale et me ama.

(¹) quibus illas parentis modestia abdiderat *Samuel* dans son édition de Diophante.

(²) perspicacissimos *Samuel* dans son édition de Diophante.

IX.

ISMAELI BULIALDO V. C.

P. E. S. D. P. (¹).

Duas potissimum modulorum seu fistularum, quibus aqua erogatur aut accipitur, species constituit Frontinus in *Tractatu de Aqueductibus*, quarum una secundum diametros foraminis seu aperturæ aut Inminis, ut loquitur ipse Frontinus, consideratur; altera secundum aream ipsam, hoc est spatium planum ipsius foraminis, quod in utroque easu rotundum et circulare supponitur.

Prioris fistularum speciei series ita procedit, ut earum diametri per quadrantem minus digiti juxta progressionem arithmeticam continuo augeantur (²).

Primus istius terminus est circulus ejus diameter est quadrans digiti; secundus, ejus diameter habet duos quadrantes digiti; tertius tres, quartus quatuor, et sic de ceteris usque ad vicenariam, centenariam, et ulterioris gradus fistula.

In hac serie vicenaria fistula, verbi gratia (³), ea est ejus apertura vel lumen habet diametrum 20 quadrantium (⁴) unius digiti.

(¹) Publié par Camusat (*Histoire critique des journaux*, Amsterdam, J.-F. Bernard, 1734, p. 199-195) avec l'adresse fautive *Paulus Fermatius Ismaeli Bulialdo V. C. S. D. P.*
— Reproduit par M. Ch. Henry (*Recherches sur les Manuscrits de Pierre de Fermat*, p. 16-17).

(²) augeatur *Cam.*

(³) V. C. *Cam.*

(⁴) quadratorum *Cam.*

Posterioris fistularum speciei series non secundum diametros, sed secundum aream ipsam luminis progreditur.

Prima nempe hujus speciei ea est quae habeat aream $<$ unius digitii quadrati, secunda quae aream $>$ duorum digitorum quadratorum, quinaria quae quinque.

His positis, intelligis, Vir Clarissime, prioris speciei fistulas differre omnino a fistulis speciei posterioris. Nam, cum prima posterioris speciei habeat pro area ipsius aperturae unum digitum quadratum, prima prioris speciei pro area aperturae non habet vigesimam dumtaxat partem unius digitii quadrati, quod facile colligitur ex supputatione arithmeticâ juxta rationem Archimedeam (¹), quam si sequaris, semper prioris speciei fistulas minores fistulis speciei posterioris invenies usque ad vicenariam; post vicenariam vero semper prioris speciei fistulas majores fistulis speciei posterioris invenies. Ipsa vero vicenaria, quae in confinio, utrobique fere aequalis existit: lumen enim vicenariae prioris speciei est ad lumen vicenariae speciei posterioris ut 55 ad 56, et sic differentia est unius tantum quinquagesimæ quintæ.

Ex supradictis patet emendandum textum Frontini in *libro de Aqueductibus*, p. 106 Stewechianæ editionis (²) apud Raphelengium 1608, et ita concipiendum:

In vicenariâ fistula, quæ in confinio utriusque rationis posita est, utrique rationi (³) pene congruit. Nam habet, secundum eam computationem (⁴) quæ interjacentibus (⁵) modulis servanda est (quæ quidem est prior fiss-

(¹) Archimedeam *Can.*

(²) Stewersianæ edit. *Can.* Il s'agit du Volume intitulé : *F. Int. Et. Vegetii Renate Comitis aliorumque aliquot veterum De Re Militari libri. Accedunt Frontini stratagematicis eiusdem auctoris alia opuscula. Omnia emendatius quedam nunc primum edita a Petro Scriverio cum commentariis aut notis God. Stewechii et Fr. Modii. Ex officina Plantiniana Raphelengii MDCCVII.*

(³) Dans son édition critique *Iulii Frontini de aquis urbis Romæ libri II* (Leipsig, Teubner, 1858), Fr. Bücheler corrige *utraq[ue] ratio* d'après le manuscrit *Cassineus*, unique source du texte de Frontin. Le passage reproduit par Fermat se trouve dans cette édition, page 15, 1.21 à page 16, 1.3.

(⁴) comparationem *Can.*

(⁵) Polenus a corrige *in antecedentibus*, ce qui concorde avec la legon du Cassinensis, *in tecedentibus*.

tularum species), *in diametro quadrantes viginti; cùm diametri ejusdem dígití quinque sint, et secundum eorum modulorum rationem qui sequuntur, aream* (¹) *(ita confidenter corrigimus, cùm vulgo male legatur ad eam: haec est enim posterior fistularum species quæ) habet digitorum quadratorum ex gnomoniis* (²) *viginti.*

Cùm enim vicenaria prioris speciei habeat in diametro quadrantes viginti unius dígití, hoc est quinque digitos, erit (³) quadratum diametri 25 digitorum. Est autem proxime ut 14 ad 11, ita quadratum diametri ad circulum, ex Archimede, et est proxime pariter ut 14 ad 11, ita 25 ad 20. Ergo vicenaria prioris speciei, quæ habet viginti quadrantes in diametro, habet etiam fere viginti digitos quadratos areæ, ut pene aequalis sit fistula vicenariae speciei posterioris: quod probandum erat ad sensum Frontini planius aperiendum.

Ut autem perfectius innotescat vicenarias utriusque speciei omnium proximas inter se esse (⁴), exponatur tabula sequens

1	11	224	6	66	224	11	121	224	16	176	224	21	231	224
2	22	224	7	77	224	12	132	224	17	187	224	22	242	224
3	33	224	8	88	224	13	143	224	18	198	224	23	253	224
4	44	224	9	99	224	14	154	224	19	209	224	24	264	224
5	55	224	10	110	224	15	165	224	20	220	224	25	275	224

Primus ordo est numerorum ab unitate in progressionē naturali.

Secundus est a 11; progreditur per additionem ipsius 11.

Tertius est ejusdem semper numeri 224.

Patet autem ex supputationibus geometricis fistulam prioris speciei ad fistulam posterioris esse ut numerus collateralis secundæ columnæ

¹) Bücheler a fait la même correction que Fermat, mais comme il met plus haut le point-virgule après *sint* et non après *viginti*, il considère le texte comme en désordre et propose de le remanier, ce qui est inutile, car le sens est bien celui qu'indique Fermat:

Dans le tuyau du module 20, qui se trouve à la rencontre des deux façons de compter, celles-ci se trouvent sensiblement d'accord. Car, selon le système adopté pour les modules inférieurs, il a 20 quartes de doigt en diamètre; cela faisant 5 doigts de diamètre, il aura aussi, si on le rapporte au système des modules supérieurs, une section de presque 20 doigts carrés», au lieu de 20 doigts carrés exactement, qu'il devrait avoir d'après ce système.

²) ex gnomoniis *Serie*, et gnomonum *Cam*, exiguo minus Bücheler.

³) edit *Cam*.

⁴) intersesse *Cam*.

ad numerum 224 tertiae. Exempli gratia, fistula quinta (¹) prima speciei est ad fistulam quintam secundæ ut 55, qui est numerus collateralis 5, est ad 224. Etc.

Unde apparet, cùm numeri 220 et 224 sint omnibus secundæ et tertiae columnæ inter se proximiores, vicenariam, quæ est ipsis collateralis, esse ejus naturæ et proprietatis quam innuit Frontinus. Unde evidens est non solum correctionem nostram esse veram, sed etiam necessariam, imo et demonstratam.

In eadem pagina emendandus est etiam textus, ut sensus restituatur Frontino, ubi etiam legitur :

Centenaria autem et centenum vicenum, quibus assidue accipiunt, non minuantur, sed augentur.

Post haec autem verba, inquam, sigillatim exponit Frontinus qua proportione aquarii has duas fistulas fraudulenter auxerint; sequitur itaque *nec usu frequens est* : legendum loco vocis *nec*, *cen* hoc est *centenaria*, quæ haud dubie hac ratione tribus primis characteribus in MSS. designabatur. Quod cùm exscriptores non caperent, inverso vocabulo, voci *cen* substituerunt *nec*, decepti fortasse simili, quam aliquot ante lineis, cùm de duodenaria loquitur Frontinus, viderant, expressione (²).

Si hanc emendationem non admittas, erunt hæc omnia scopæ disolutæ. Sensus integer Frontini id præcipue vult, aquarios quatuor fistularum modum mutavisse, quod ita exprimit :

Sed aquarii, cùm manifestæ rationi in (³) pluribus consentiant, in quatuor modulis nominaverunt (⁴) duodenaria (⁵) et vicenaria et centenaria

(¹) *quinta Cam.*

(²) La conjecture de Fermat est plus ingénieuse que solide; mais, de fait, les mots *nec usu frequens est* ne se trouvent pas dans le Cassinensis. Bücheler (p. 16, l. 16-17) les a donc supprimés purement et simplement.

(³) Fermat ajoute ici *in* au texte de l'édition qui ne porte que *pluribus*, avec l'indication de la variante *plurimum*. Bücheler fait la même addition, d'après Polenus (p. 16, l. 9).

(⁴) D'après le Cassinensis, pour ce mot qui a torturé Fermat, il faut partout lire *nominaverunt*.

(⁵) *duodenariam et vicenariam et centenariam Cam.*

et centenam vicenam, ubi quid per vocabulum nominaverunt intelligat, quo idem Frontinus duobus aliis locis paginæ sequentis⁽¹⁾ 107 ostitur, amplius querendum et consulendi forsitan codices MSS.

Reliqua sequuntur in quibus suspicaremur aliquid transponendum, si Scaligerianam audaciam anderemus imitari, et ita omnino legendum post verba superiora⁽²⁾:

Viceniam exiguum faciunt diametro dīgitū semisse⁽³⁾, capacitate quinariis tribus⁽⁴⁾ et semuncia, quo modulo plerumque erogatur. Reli-

⁽¹⁾ pag. seq. *Cain.*

⁽²⁾ L'ordre du texte édité est le suivant : *Et duodenarie quidem, quod nec magnus error nec usus frequens est, diametro adficerunt dīgitū semunciam sicilicū, capacitatē quinariae et bessē. Reliquis autem tribus modulis plus deprehenduntur. Viceniam exiguum faciunt diametro dīgitū semisse, capacitate quinariis tribus et semuncia, quo modulo plerumque erogatur. Centenaria autem et centenam vicenam etc.* L'interversion proposée par Fermat est inutile. Voici le sens général du passage (éd. Bücheler, p. 16, l. 8 à 18) :

« Les distributeurs d'eau se conforment, en général, pour les modules des tuyaux, aux exigences de la raison; toutefois ils ont innové pour quatre modules, n° 12, 20, 100 et 120. Pour le module 12, l'erreur n'est pas grande et d'ailleurs l'usage de ce module n'est pas fréquent: ils augmentent le diamètre de $\frac{1}{16}$ de doigt, la capacité de $\frac{97}{500}$ de quinaire^(a). Pour les trois autres modules, la différence est plus grande. Le module 20, le plus employé pour les concessions, est diminué par eux de $\frac{1}{2}$ doigt, ce qui réduit la capacité de 3 quinaires $\frac{1}{24}$ (exactement $\frac{1}{25}$). Au contraire, les modules 100 et 120, qui servent constamment pour les prises, ne sont pas diminués, mais augmentés, etc. »

⁽³⁾ Bücheler ajoute *et semuncia*, contre l'autorité des manuscrits, parce qu'à dans le tableau qui suit un peu plus loin (p. 19, l. 13), Frontin donne 5 doigts $\frac{1}{24} \frac{1}{288}$ pour le diamètre du module 20, ce qui correspond à la section de 20 doigts carrés (système des modules supérieurs). Mais il est clair qu'ici Frontin compte le module 20, suivant le système des modules inférieurs, à 20 quarts de doigt ou à 5 doigts de diamètre.

⁽⁴⁾ Bücheler ajoute *et quadrante*, pour le motif indiqué dans la note précédente. Comme le prend ici Frontin, le module 20 vaut évidemment 16 quinaires, et non 16 quinaires $\frac{1}{4} \frac{1}{24}$, comme il est indiqué au Tableau suivant (p. 19, l. 14). Quant au module effectif des *aquaria*, sa valeur en quinaires est $\left(4\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 12\frac{24}{25}$. La différence avec 16 est $3\frac{1}{25}$ ou $3\frac{1}{24}$, à moins d'un scrupule $\left(\frac{1}{288}\right)$ près.

^(a) Le *quinare* est le tuyau de module 8 (diamètre $\frac{5}{4}$ de doigt), pris pour unité de capacité. La fraction $\frac{97}{500}$ est celle que donne le calcul, mais ne correspond pas exactement au texte de Frontin.

quis (¹) *autem tribus modulis plus deprehenditur: duodenaria quidem, quod* (²) *nec magnus error nec usu frequens est, diametro addecerunt digiti semunciam sicilicam, capacitati quinariae* (³) *et bessem. Centenaria autem et centenum vic. etc.*

Sed de voce *nominaverunt* quid statuimus? quid statues, mi Bürialde? quid statuerit docti? Sensem quidem capimus, sed expressionem Frontini aut sensum ipsius expressionis desideramus.

Non difficile est quæcumque in hæc pagina et in paginis 107 et 108 de capacitatibus fistularum, earum diametris et perimetris enunciantur, quæ mire corrupta sunt apud Frontium, ex geometricis suppurationibus emendare. Quas si forte desideres, non gravabimur aggredi atque firmiter probare, ut, si ea, quæ dixerat ipse Frontinus, non fuerint plane assecuti, ea saltem, quæ dicere debuerat, supplere non dubitemus.

Interea vale, Bürialde doctissime et amicissime.

Dabam Tolosæ Tectosagum ad diem xxiv novemboris (⁴) anni à C. N. MDCLV.

(¹) Bücheler ajoute *In* devant *reliquis*, ce qui semble inutile.

(²) Bücheler supprime *quod*, d'après le Cassinensis, et ajoute plus loin *cum* avant *diametro*.

(³) quin et bessem *Cam.*, quinariae quadrantem *Buchaler*. Le Cassinensis donne *quinariae bessem*. Le texte est évidemment corrompu, mais la correction de Bücheler, faite d'après Polenus, est peu admissible. En fait, comme je l'ai dit plus haut, l'augmentation en quinaires est exactement $\left[\left(3\frac{1}{16} \right)^2 - 3^2 \right] \times \left(\frac{4}{5} \right)^2 = \frac{9^2}{400}$, ce qui correspond en scrupules à 69,84. La correction de Polenus suppose que Frontin aurait, par approximation, pris 72 scrupules. Mais, comme ici la différence est très petite, elle aura dû être calculée encore plus exactement que la précédente (*voyez* page 384, note 1). Il est donc probable que Frontin aura admis 69 scrupules $\frac{2}{3}$ (comme l'indique la legon *et bessem*; comp. 6d. Bücheler, p. 14, l. 24-25, *et bessae scripulae*). L'indication des scrupules, faite suivant la notation romaine des fractions de l'as, aura été laissée de côté par le copiste.

(⁴) nov. *Cam.*

X.

LETTRE DE HUET⁽¹⁾.

—

PETRO ET SOROELI FERMATIS, PATRI ET FILIO, TOLOSAM.

Cum omnibus officijs amore me suum Segræsius noster et jam nunc vester significauerit, tunc illud longe mibi gratissimum est quod, quorūcumque hominum aliqua laude florentium sibi conciliavit benevolentiam, ejusdem me statim fecit participem. Quod sic interpretor, existimasse ipsum non certiorem propensi in me animi testificationem dare se posse, quam si quod in vita carissimum hahet, amicos nempe, eos mecum communis esse vellet. Quo beneficii genere, si unquam alias, nunc certe me cumulare pergit, cùm doctrinæ, ingenij et urbanitatis egregia specimina ut ad me mitteretis, operâ suâ et aliquâ fortasse nostri apud vos commendatione perfecit. Parum equidem munere isto cāque quam de me suscepisse videmini opinione dignum me præbeam, nisi maximas vobis debere me gratias palam profitear et præclaras vtriusque vestrū dotes apud omnes decantem. Quod autem tuas veterum scriptorum castigationes et conjectanea, necon et poematia, tu Fermati pater, puncto meo approbare velle præte fers, sic accipio te industrie tuae testem et plansorem, non judicem querere. Sic ergo habeto nihil mihi magis consentaneum videri quam quod ξωοζεῖτην vocem nibili et a vero Athenai⁽²⁾ sensu alienam

⁽¹⁾ Lettre publiée par M. Gh. Henry (*Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat*, p. 73-76) d'après le manuscrit n° 997 de la Bibliothèque de l'Université de Leyde, pages 139 et 140, et la copie dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale, *Fonds latin* n° 11432, où elle est numérotée LXXVI.

⁽²⁾ Voir ci-dessus, page 378, note 9.

expungis, ἔργοντας autem acute et legitime substituis. Profecto, ut in emaculando eruditio hoc scriptore multum desudarint Dalecampius nostras et Casaubonus, non exiguam tamen, post amplam messem, spicilegio materiem reliquerunt. Quid item certius quām γρόγχον οὐ βρόγχον legendum apud Sextum philosophum (¹)? Haec Theonis (²) quam profers emendatio sese ipsa vel minimum attendenti luculententer probat. Quod autem in Clodiani (³) epigrammate *pater* in *puer* reformatum statuis, ριτιζότατον est et vulgaris καὶ παιδεγνωμότης ἡμῖς olfactum præterit. *Puer* porro in obsecenis esse qui nescit, quid sint παιδειά, quid παιδεραστεί, ignorat, nec catamitos nouit dictos esse pullos, nec Martialis (⁴) sententiam assequitur, cùm ait :

Sit nobis aetate puer, non pumice, lavis,
Propter quem placeat nulla puella miti

Atque utinam eiusmodi amoenitatibus, tuisque etiam elegantissimis epigrammatiis ac tuis item, Fermati fili, quae mirifice sane nobis sapient, par referre possem! Sed quod ab exiguâ nostra et paupertina facultate non suppetit, id denoto erga vos animo, omnibusque obsequijs repræsentare conabor. Valete, Viri Eximij, Cadomi III non. dec. MDCLIX.

Si lucubrationibus tuis geometricis, in quibus diceris obtinere principatum, Fermati pater, me impertieris, optime de me fueris promeritus.

(¹) Voir ci-dessus, page 377.

(²) Voir ci-dessus, page 376.

(³) Il s'agit de l'épigramme LXXVI de Clodien (éd. Heinsius, 1650), vers 5 et 6, où l'on lit :

Quod turpem *pateris* cano puer podice morbum.
Feminas signis Luna Venusque tubit.

Fermat proposait de lire *pueris* au lieu de *pateris*; cette conjecture, ingénieuse mais futile, n'a pas été prise en considération par les éditeurs subséquents de Clodien.

(⁴) Martial, XIV, épigramme 203.

XI.

LETTRE DE FERMAT.

PTR. DAN. HUETIO S. P. D. PETR. FERMATIUS. CADOMIUM⁽¹⁾.

Vix legeram tuam epistolam, cum effetam jandiu et marcescentem latini sermonis facultatem renocare statim sum aggressus, ut grati saltem animi officium quoddam rependerem, et elegantiam tuam quadamtenus adumbrarem. Sed non suenrerunt verba, et in medijs conatibus aeger jam deficiebam, aut si mauis aliud quoque Virgilianum⁽²⁾, *inceptus clamor frustrabatur hantem*, cum ecce commodum supernent urbanissimus Segresius, et amicum serio meditabundum, et jam pene cum vnguibus confluentem, ac secum nescio quid obmurmurantem intuitus: « Am vero, inquit, credisne Huetium a te aliquid elaboratum et quod demorsos sapiat vngues exspectare? Sincerum tantum cordis affectum expostulat, et in pignus amicitiae nascentis aliquot aut versiculos aut criticas obsernationes exposet. » — « Sed illud multo, inquam, difficilius euadet. Carmina enim paucissima penes me habeo, que tanto et tam celebri viro ausim communicare; animaduersiones autem criticas multo adhuc panciores valeam exhibere; nam is certe sum qui notas hujusmodi censorias, nisi ipsarum veritas luce ipsaclarior sit, omnino rejiciam; imo in ipsis ἀπόδεξιν ἐπιστρηψοντί, more geometrico, existimem requirendam. Qnod

⁽¹⁾ Lettre publiée par M. Ch. Henry (*Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat*, p. 77) d'après le manuscrit n° 997 de la Bibliothèque de l'Université de Leyde, pages 141 et 142, et la copie dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale, *Fonds français*, Vouc. Acq. n° 3280, f° 108 et 109.

⁽²⁾ Comparez *Éneide*, VI, 493.

» exempla, quæ jam ad clarissimum Huetium tuā operā peruenierunt,
» satis probant. Velim tamen in supplementum probationis adjungere
» doctissimi et eruditissimi illius viri approbationem vicem accuratis-
» simæ demonstrationis apud me obtinere, nec ullum amplius de vero
» Athenæi, Sexti, Theonis et Clandiani sensu dubitandi locum relin-
» quere. » — « Quà ergo, inquit, ratione, amice, et epistolæ et exspec-
» tationi respondebis? » — « Censeo, inquam, nil aliud mihi facien-
» dum, quam fortuitum hoc et familiare inter nos colloquium in
» speciem epistole efformandum, et Cadomum quamprimum transmit-
» tendum. » — Annuit Segresius, ego vero vsus sum consilio inopiae
meæ perquam accommodato, et amicitiam tuam, Vir Clarissime, si non
facundiâ, saltem obsequio obseruantissimo, in posterni tentabo pro-
mereri. Vale, Tolosæ, VI Kal. Januar. anni MDCLX.

XII.

CEDE DEO, SEI CHRISTUS MORIENS.

D. PETRI DE FERMAT CARMEN AMOREUM AD D. BALZACUM.

Obstupuit totiesque clusum mentis aenmen
 Dedidicit vanos veris preferre colores
 Luminibus. Quid bella moves, deletaque pridem
 Numinia præstigiis lingue solertis adumbras
 Infelix ratio? Num te simulachra tot annis
 Desita, et imbelles Divum sub imagine formæ
 Fallaci cinxere metu? Num te ostia Ditis
 Aut stygiæ remorantur aquæ, Elysiiive recessus,
 Et quidquid credi volnit Dijs æqua potestas?
 Perge tamen quò te securo tramite duemnt
 Balzaco præcunte viae, nec inertia dudum
 Fatidice responsa Deæ, quereusve silentes
 Dodonæ, aut facili venerare oracula Phœbi;
 Cede Deo. Cessit veteranum numerosa propago
 Cœlicolum : Deus ecce Deus, quem prona parentem
 Agnoscit natura suum, eni terra, salumque
 Pareat, et edomite fatalia habra procelle,
 Submittuntque ipsæ jam non sua murmura nubes.
 Hic puro fulgore micans, de lumine lumen
 Dum traheret, Deus unus erat, natusque supremi
 Eternæ aeternum manans de mente parentis
 Assumpsit veros morituræ carnis amictus,

Si qua forte queat mortalia flectere corda,
 Tantillumque animis extundere possit amorem.
 At postquam sumni tandem mandata parentis
 Horrendo sacrum caput objecere furor,
 Humanas mōrenti animo depromere voces
 Cœpit, et insolito successus membra fragore,
 Omnipotens, si nondūm orbem mala nostra piarunt,
 Et placet infandum pœnæ genus, en, ait, adsum
 Victima, lethiferoque libens succedo dolori.
 Cerne tamen sudore madens et sanguine corpus,
 Et si nulla super nostræ tibi cura salutis,
 At saltem solare animum non digna ferentem,
 Dixit et humentes oenlos ad sydera tollens,
 Quas non ille preces, quæ non suspiria fudit
 Anxius aerumnisque gravis, tua, rector Olympi,
 Dum satagit, mentemque futuræ accingere pugna (¹)
 Sponte parat? Cœlo intereâ demissus ab alto
 Aliger, ut varios animi componeret aestus,
 Improvisus adest, ceciditque repente fragorum
 Turba minax, auctaque superno robore vires
 Despectant longè poenas, nondumque paratae
 Incubuere Cruci : nam cur, supreme, moraris
 Rector, ait, cur me per tanta pericula vectum
 Sistis, inexpletoque obices opponis amoris?
 Dixerat, humanisque iterum succumbere curis
 Visa caro, tristes agitant præcordia motus,
 Needum securo gressu vestigia ponit.
 Haec inter dubiae mentis certamina totam
 Noctem orat, socios altus sopor urget inertes,
 Quos decuit vigiles oranti impendere curas.
 Heu pavidae mentes, si nec cœlestia tangunt,

(1) *Licez pugnae.*

Nec verae virtutis honos, hoc munere saltem
 Detungi jurata fides, jussuunque magistri
 Debuit una sequi; sed jam strepit undique murmur,
 Et segni tenebras abrumpunt lumine tæde;
 Quò se cunque feret, jam vis inimica propinquat,
 Fictaque adorantis species, verique dolores
 Non procul. Infausti tandem sub pondere ligni
 Deficit, affixusque cruci, jam verbera passus,
 Jam spinas, laceros spargens tormenta per artus
 Nempe urgebat amor, nostraeque cupido salutis,
 Humanam egressus sortem, mortisque tremendus
 Dum fieret morti propior, fremitusque, minasque,
 Et conjuratae spernens convicia turbæ,
 Degeneri vitam populo pacemque precatur,
 Nec, quas ipse tulit pœnas, tortoribus optat.
 Et jam finis erat, violataque pectora puri
 Muricis undantes spargebant undique rivos.
 Nec tamen imbelli subiit fata ultima mente;
 Quin magis assurgens, divinaque lumina, Cœlo
 Sic propior, vocemque sonoram ad sydera tollens,
 Summe Deus, quid me moribundum deseris, et jam
 Semianimum, populique tuoque furore fatigas?
 Sat tibi, sat mundo dedimus, finitaque dudum
 Singula praescriptas habnere oraenla metas.
 Sic fatur moriens, elataque lumina rursùm
 Figit humi, nec jam Cœlum spectare facultas
 Ulla datur, cecidere animi, marcentiaque ora
 Etherio vocem extremam fudere parenti:
 Hanc tibi, summe parens, animam commendo, nec ultra
 Prosilii, vitamque simul cum voce reliquit.
 Hand secūs extremo videas spiramine lychnum
 Ingentem nisu valido producere lucem,
 Et sursum elatas, iterum subsidere flamas.

Donec anhelanti similem circumfluis humor
 Deserit, et densæ subeunt fuliginis undæ.
 Debilis intereà visa est scintilla per umbras
 Semianimes atris miscere vaporibus ignes.
 Deficiunt tandem et vano conamine sursùm
 Evecti, æternis noctis conduntur in umbris.
 Nec tamen æternæ claudent tua lumen noctes,
 Nata Deo, veram referet lux tertia lucem,
 Et majora dabit renovato lumen mundo.

Quò me, quò, Balzace, rapis? juvat ire per altum
 Exemplo quoquinque tuo me musa vocarit,
 Exigno sine te vix suffectura labori;
 Scilicet optati venient tanto Auspice versus,
 Et quo Pierij frueris super ardua montis
 Editus, hoc olim forsitan potietur honore
 Balzaco proles non inficianda parenti.

XII.

NOTES CRITIQUES

SUR LES

HARMONIQUES DE MANUEL BRYENNE⁽¹⁾.

I.

NOTATA QUEDAM AD MANUELEM BRYENNIMUM.

In libro primo, capite περὶ συστήματος, loco horum verborum : τῶν πρὸι τε καὶ δύο λειμάντων, legendum : τόνων πέντε καὶ δύο λειμάντων⁽²⁾.

In libro 2^o, pag. 2^a : καὶ ἐποδοτητες, legendum : καὶ αἱ σφοδρέ-τετες⁽³⁾.

⁽¹⁾ Manuscrit grec 2430 de la Bibliothèque nationale. Copié au XVI^e siècle, sur papier, de 218 feuillets, in-folio, et relié en veau fauve. Ce volume, après avoir appartenu à l'archevêque de Toulouse, Charles de Montchal († 1651), dans la bibliothèque duquel il portait le n° XLIV, puis sans doute au surintendant Fouquet et à Ant. Faure, passa dans la collection de l'archevêque de Reims, Le Tellier, qui le donna au Roi avec ses autres manuscrits en 1700. On y trouve le recueil suivant des auteurs grecs qui ont traité de la Musique :

Alcipri isagoge musica (fol. 1^a); — *Gaudentii isagoge harmonica* (fol. 14^a); — *Anonymi opusculum de re musica* : Πεθῆται συντετρίψει... (fol. 24); — *Bacchi senioris isagoge musica* (fol. 32); — *Anonymi isagoge musica* : Τῷ παντελῇ τέλει... (fol. 36); — *Euclidis isagoge harmonica et sectio musici canonis* (fol. 49); — *Theonis Platonici summa et conspectus totius musicae* (fol. 59); — *Pappi excerpta de re musica* (fol. 51^a); — *Aristocxi harmoniorum elementorum libri III* (fol. 58); — *Nicomachi Geraseni harmonices eukhridiou*, libri II (fol. 82); — *Aristidis Quintiliani de musica libri III* (fol. 97); — *Manuelis Bryennii harmoniorum libri I et II* (fol. 145 à 201).

Les notes autographes de Fermat, dont nous devons la découverte à M. Henri Omont, sous-bibliothécaire au département des Manuscrits, forment un petit cahier de papier, in-4^e (fol. 203 à 218), relié à la fin du manuscrit; seuls les fol. 206, 208 à 214 et 216 à 218 sont écrits.

⁽²⁾ Ms., ch. VI, fol. 158, l. 18; édition Wallis (Oxford, 1699, f^o), p. 383, l. ult.

⁽³⁾ Ms., ch. I, fol. 163^v, l. 10; éd. p. 394, l. 13.

Ibid. : συμβονοῦσι δὲ ψύχρης πρὸς ἀλλήλους, ὡν θατέρου κρουσθέντος ἐπὶ τινος ἀργάνου τῶν ἐνταυτῶν, καὶ ὁ λοιπὸς κατὰ τινα σκειότητα καὶ συμπάθειαν συνηγγεῖ⁽¹⁾. Hæc verba videntur ad verbum descripta ex fragmēto Theonis, pag. 3^a ⁽²⁾. Ibi, loco horum verborum : ἀργάνου τῶν ἐνταυτῶν, legitur in manuscripto : τῶν ἐν τούτοις, sed manifestum in utroque est mendum; legendum τῶν ἐνταυτῶν. Esse enim tria instrumentorum genera apud veteres musicos notum, quæ Nichomachus in Enchiridio πνευματικὰ ἐντατὰ et κρουστὰ appellat. Ἐντατῶν vero, sive quæ chordis tensis constant, hæc est proprietas quam hoc loco indicat Bryennius, ut una ex duabus chordis consonantibus pulsata, altera statim occultâ quâdam sympathiâ resonet.

Pag. 4^a : τὰ γὰρ ἐννέα οὐχίον τε διαιρεθῆνται εἰς ἕξ⁽³⁾. Tonus bifariam dividi non posse ut probet, hanc rationem subdit. Male. Non enim quia numerus 9 in duas æquales partes dividi non potest, ideo tonus seu proportio sesquioctava bifariam dividi non potest. Aut igitur erravit Bryennius, aut (quod probabilius est) sunt hæc verba glossemata scioli ejusdam, quæ e margine in textum irrepserunt. Vera enim ratio hujus impossibilitatis tam in ratione sesquioctavâ quam in reliquis superparticularibus hæc est, quoniam inter duos numeros unitate distantes non cadit medius proportionalis neque in integris, quod per se patet, neque in fractis, cuius propositionis demonstratio est in proelivi.

Pag. 5^a, lin. 5^a, fin.: καὶ ἐπόγδοον καὶ ἐπιπεντεκαιδέκατον, legendum : ἐπόγδοον καὶ ἐπιέννυτον ⁽⁴⁾.

Pag. 7^a, in fig. 1^a, loco ultimi numeri 58, legendum 57 ⁽⁵⁾, hoc est 63, non 64.

Pag. 8^a, in 1^a fig. ⁽⁶⁾. Omnes numeri tetrachordum constituentes sunt corrupti, aut male huc ex 2^a fig. ejusdem paginae translati. Ita autem

⁽¹⁾ Ms., *ibid.*, l. 17; éd. p. 394, l. 23 (*cid.* καὶ supprimé avant *συμπάθειαν*).

⁽²⁾ Ms., fol. 51, l. 6; éd. Bouillau, 1644, in-1°, p. 80, l. 12.

⁽³⁾ Ms., fol. 163^{vo}, l. 21; éd. p. 396, l. 13.

⁽⁴⁾ Ms., fol. 164, l. 5 du bas; éd. p. 397, l. 18 du bas.

⁽⁵⁾ Ms., fol. 165; éd. p. 399.

⁽⁶⁾ Ms., fol. 165^{vo}; éd. p. 400.

se habent : $\tau\tilde{\epsilon}\eta$, $\tau\tilde{\epsilon}$, $\tau\psi\eta$, $\sigma\sigma\zeta$, quorum loco substitui debent sequentes :
 $\tau\pi$, $\sigma\sigma$, $\sigma\gamma\beta$, $\sigma\iota$, hoc est : 280, 270, 252, 210.

Corrigendi et numeri proportionum constitutivi, quos in vertice figuræ ita scriptos vides : $\hat{\epsilon}\pi\hat{\nu}\mu\zeta$, $\hat{\epsilon}\pi\hat{\nu}\nu\delta$, $\hat{\epsilon}\pi\hat{\nu}\zeta$, legendum horum loco : $\hat{\epsilon}\pi\hat{\nu}\zeta\zeta$, $\hat{\epsilon}\pi\hat{\nu}\nu\delta$, $\hat{\epsilon}\pi\hat{\nu}\varepsilon$ (¹).

In 2^a figura tertius numerus finalis debet corrigi, et loco $\tau\mu\eta$, legendum $\tau\mu\varepsilon$.

Pag. 10^a, ubi scribitur ἀριθμοὶ τῆτοι κακόριθμοι καὶ ἐμμελεῖς, legendum
ἐκπελεῖς, aut ἀνελεῖς (²), ut constet sensus.

Pag. 12^a. Αλλ' οὗτοι δὴ μόνοι οἱ πεντεκαίδεκα ἐπιμόριοι λόγοι εἰσὶν ἔξι
ἄνυκτος τοῦ τῶν ἐπιμορίων λόγων πλήθους· οἱ σύντρεις πως ἀλλήλους
συναπτομένοι, δύνανται τὸν ἐπίτριτον ἀποτελεῖν λόγον, καὶ οὐδὲνες ἄλλοι
πάρι τούτους ἐν οὐδεμιᾷ μηγγανῆ τοῦτο ποιεῖν δύνανται⁽³⁾. Non possum
hoc loco dissimulare Bryennii errorem audacter nimis et confidenter
asserentis nullas alias in omni superparticularium multitudine inve-
niri rationes praeter quindecim ab eo superioris assignatas, quarum tres
simil sumpta sesquiteriam componant. Ab eo supra allatae pag. 3^a
hujus libri sunt sesquiquarta, sesquiquinta, sesquisexta, sesqui-
septima, sesquioctava, sesquinona, sesquidecima, sesquiundecima,
sesquidecima quarta, sesquidecima quinta, sesquivigesima, sesquivi-
gesima prima, sesquivigesima tertia, sesquivigesima septima, et ses-
quiundragesima quinta, quas proposito dumtaxat satisfacere affirmat.
Contrarium facillime probamus. Eece enim sesquiducentesimam quin-
quagesimam quintam, quae hos quatuor terminos dabit

256 255 240 192,

Ex quibus finit tres proportiones superparticulares, nempe sesquiducentesima quinquagesima quinta, sesquidecima sexta et sesqui-quarta, que simul juncte sesquitertiae aequaliter contra mentem authoris, immo et infra terminos ab eo allatos alię inveniuntur. Nam ex

⁽¹⁾ Dans ces expressions, je met *la*; ne devrait pas porter l'accent grave.

⁽²⁾ Ms., fol. 166^{vo}, l. 10 du bas; éd., p. 402, l. 16 (*έγνελετς*).

⁽³⁾ Ms., ch. II, fol. 16^{verso}, l. 16; éd., p. 403, l. 8 du bas.

sesquidecemā tertiā, sesquiduodecimā et sesquiseptimā simul junctis conflatur sesquitertia; item ex sesquidecemā nonā, sesquidecemā octavā et sesquiquintā etc. Cui speculationi pulcherrimum problema subjungeremus, si per otium liceret: Nempe datā qualibet proportione superparticulari invenire quot modis in tres proportiones superparticulares dividi possit, aut generalius, quot modis in datum proportionum superparticularium numerum dividi possit, verbi gratiā, quot modis proportio sesquioctava in decem proportiones superparticulares dividi possit. Proponatur, si placet, hoc problema solvendum omnibus hujus aevi mathematicis. Ejus certe notitiam veteres et musicos et mathematicos latuisse verisimile est, cum Bryennium alioquin peritissimum et exactissimum fugerit.

In cap. 10^a, pag. 2^a, in numeris versus figurae verticem atramento depictis, loco α , legendum γ , hoc est 8, non 20 (¹). Hi enim numeri sunt differentiae numerorum qui proportiones constituunt et qui ordine restitui debent versus figurae finem, nempe $\sigma\alpha\delta$, $\sigma\alpha\varsigma$, $\rho\pi\theta$, $\rho\xi\gamma$.

Pag. 4^a, deest quartus numerus in vertice figurae, nempe post tres $\alpha\tau\mu\delta$, $\alpha\sigma\zeta\varsigma$, $\alpha\varphi\lambda\delta$, ponendus quarto loco $\alpha\gamma$, hoc est 1008.

Media proportio malè exprimitur in vertice, nam non $\varepsilon\pi\lambda\alpha\zeta$ legendum, sed $\varepsilon\pi\lambda\zeta$ simpliciter, hoc est sesquiseptima, non sesquivigesima septima.

In numeris atramento depictis loco primi numeri $\pi\delta$, legendum et reponendum ut in reliquis $\rho\beta$ (²).

In eadem pagina, ubi legitur: ἡ δὲ παρυπάτη πάλιν τούτου διατόνου ὄμαλοις γένους συντονωτέρα ἐστὶ τῆς παρυπάτης τοῦ μαλακοῦ ἐντόνου ἐπιεικοστεβόρμῳ λόγῳ ἔγγιστα, legendum ἐπι ἐννάτῳ καὶ δεκάτῳ λόγῳ ἔγγιστα (³).

In numeris proportionum differentias experimentibus qui a vertice

(¹) Ms., ch. X, fol. 183^{v°}; éd. p. 431.

(²) Ms., fol. 184^{v°}; éd. p. 433.

(³) Ms., *ibid.*, l. 12 (ms. τοῦ διατόνου); éd. p. 433, l. 9 du bas (τοῦ διατόνου . . . ἐντόνου γένους). Wallis a d'ailleurs corrigé ἐπιεικοσταδεκάτῳ.

figurae versus finem sive $\pi\alpha\tau\dot{\alpha}\sigma\tau\dot{\gamma}\rho\circ\varsigma$, ut Graeci loquuntur, protenduntur, loco $\dot{\epsilon}\pi\lambda\theta$, legendum $\dot{\epsilon}\pi\lambda\vartheta$, hoc est 10 , non 9 (¹).

In sequente figura desunt duo numeri parhypaten et lichanion syn-toni diatoni exprimentes, qui sunt $\frac{27}{25}$ et $\frac{25}{24}$, hoc est 1260 et 1120.⁽²⁾

Eadem pagina 5^a, lin. 6^a, ubi legitur ἐπὶ τριακοστῷ λόγῳ ἔγγισται, delenda vox ἔγγισται, hic et inferius eadem pagina (²), ubi de eadem proportione fit mentio. Accurata enim est proportio 36, ad 35, ad differentiam parhypates prioris et posterioris tetrachordi exprimendam.

Huc usque proiecti, omnes fere figuræ corruptas cum cerneremus usque ad finem libri, proelivius duximus errores ob oculos ponere communis figure beneficio, ne aliter obscurior esset glossa quam textus.

Quæ iteratæ lectione visa sunt emendanda hie apposuimus.

Libro 1º, cap. 1º, pag. 1ª, linea ultimà, ubi in manuscripto legitur οὐτὶ πάθη τῶν φυσικῶν εἰς ὅν γίγνονται, legendum : εἰδῶν γίγνονται (¹).

Pag. 5^a, lin. 21^a, τοῦ μὲν ἀπὸ τοῦ φίλοιος, legendum : τοῦ φίλοιος (⁹).

Cap. 2^o, lin. 8^a, περὶ τοῦ ἡρμοσμένου σαρῆν εῖ, legendum : σαρῆ-γεισην (⁶).

Cap. 3^o, pag. 2^a, lin. 11^a, καὶ πάντες τὸν τούτον φανόμενον ποιεῖν, σύκετι λέγειν φασί, ἀλλ' οὐδὲν, corrige : καὶ πάντες τοὺς τοῦτο φανομένους ποιεῖν (¹).

⁽¹⁾ *Voir* note 2, p. 307.

²) Ms., fol. 185; *éd.*, p. 134.

³⁾ Ms., *ibid.*, l. 6 (*μεταξωπῷ πίπτεται*): éd. p. 434, l. 19 (*τριπλασιώνεται*): cf. ms., *ibid.*, l. 6 du bas, et éd. l. 3 du bas. — L'omission de *πίπτεται*, dans le texte de Fermat, est due à une simple inadvertance.

⁽³⁾ Ms., ch. I, fol. 17, l. ult.; éd. p. 363, l. 14.

⁵⁾ Ms., fol. 147^v, l. 21; *ed.*, p. 364, l. 5.

¹⁶) Ms., ch. II, fol. 149^{vo}, l. 15; éd. p. 367, l. 5 du bas. Le ms. porte : *sapt'ya!*¹⁶ (= *sapt'yastav*).

⁷⁾ Ms., ch. III, fol. 154, l. 11 (*ms.* et *ed.* *χασίν*); *ed.* p. 376, l. 3 (*τὸν τούτο φαινόμενον*).


Cap. 1^o, pag. ult., lin. 14^a, διάρχονται μέν εἰσιν οὐ μόνον δὲ καὶ ἐμμελεῖς,
legendum ἐξηλεῖς (¹).

II.

RESTITUTIO FIGURARUM LIRRI 2ⁱ APUD MANUELEM BRYENNIVM.

Figurae tetrachordorum sunt aut simplices aut composite (²). Simplicium constructio aut restitutio est in promptu; compositas ita restitues, adhibita constructione et ad eam reliquis accommodatis. Esto

Fig. 151 (Figura ultima, cap. 9).



igitur figura ultima capitinis 9ⁱ, quae per characteres grecos et latinos
denotatur, et zōmō διαγράμματος vicem gerit.

(¹) Ms., ch. IV, fol. 156^o, l. 14; éd. p. 380, l. 4 du bas.

(²) Les tétrachordes grecs comprennent quatre cordes désignées ici, dans l'ordre de longueur décroissant, par les noms d'*hypate*, *parhypate*, *tchanos*, *nete*. Les extrêmes sont toujours dans le rapport de $\sqrt{3}$ à 3, mais les rapports intermédiaires varient suivant les genres. Manuel Bryenne connaît huit genres, pour lesquels les trois rapports intermédiaires

Ita nempe emendari et recte construi debet.

Supra semicirculum ABC hæc verba poni debent : κοινὸν τετράγωνὸν τοῦ διατόνου ὄμοιον καὶ τοῦ συντόνου διατόνου γένους.

In rectâ γz : ēπὶ τε.

In rectâ zf : ēπὶ γ .

In rectâ fg : ēπὶ 0.

In rectâ op : ēπὶ τα.

In rectâ pq : ēπὶ ι.

In rectâ $q\zeta$: ēπὶ 0.

In Z : $\frac{2}{3}\zeta$.

In R : $\frac{2}{3}$.

In M : π .

In K : $\phi\beta$.

In τ : ς .

In v : ι .

In φ : γ .

successifs, en allant de l'*hypate* à la *nete* (rapports dont le produit doit faire $\frac{2}{3}$), sont consignés dans le Tableau ci-dessous :

I.	Ditonien ($\delta\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha$)	$\frac{2}{3} \times \frac{9}{8} \times \frac{9}{8}$
II.	Syntone diatone ($\sigma\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha$)	$1\frac{6}{5} \times \frac{9}{8} \times \frac{10}{9}$
III.	Diatone égal ($\delta\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha\delta\tau\alpha\tau\alpha$)	$1\frac{2}{5} \times \frac{11}{10} \times \frac{10}{9}$
IV.	Mol tendu ($\mu\lambda\alpha\alpha\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha$)	$2\frac{8}{7} \times \frac{8}{7} \times \frac{9}{8}$
V.	Mol diatone ($\mu\lambda\alpha\alpha\tau\alpha\tau\alpha\delta\tau\alpha\tau\alpha$)	$2\frac{1}{6} \times \frac{10}{9} \times \frac{8}{7}$
VI.	Chromatique syntone ($\gamma\beta\delta\mu\alpha\sigma\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha$)	$2\frac{2}{1} \times \frac{12}{11} \times \frac{7}{6}$
VII.	Chromatique mol ($\gamma\beta\delta\mu\alpha\mu\lambda\alpha\tau\alpha\tau\alpha$)	$2\frac{8}{7} \times \frac{15}{13} \times \frac{6}{5}$
VIII.	Enharmonique ($\dot{\epsilon}\nu\alpha\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha\tau\alpha$)	$1\frac{5}{4} \times \frac{24}{23} \times \frac{5}{4}$

Les figures simples donnent en nombres entiers les longueurs des cordes de chaque genre; Fermat a déjà plus haut indiqué des corrections pour les figures simples suivantes :

Fol. 165. Mol diatone. — Fol. 165^o, fig. 1. Chromatique mol. — *Ibid.*, fig. 2. Enharmonique. — Fol. 185^o. Mol tendu.

Les figures composées donnent en nombres entiers les longueurs des cordes de deux genres comparés l'un à l'autre. Fermat a déjà touché plus haut (fol. 185^o) la comparaison du *mol tendu* et du *diatone égal* et (fol. 185) celle du *mol tendu* et du *syntone diatone*. Il reprend maintenant l'exposé du système de ses corrections sur la première figure composée de Manuel Bryenne (*syntone diatone* et *diatone égal*) et sur la suivante (*mol tendu* et *diatone égal*), qu'il avait déjà corrigée.

In H : $\pi\eta_i$.

In I : π .

In π : η_i .

In ρ : η_i .

In σ : η_i .

In rectâ $\delta\gamma$: $\epsilon\pi\lambda\mu\delta$.

In rectâ $\gamma\beta$ nihil in hac figura ponî debet quia lichenos diatoni aequales et lichenos diatoni syntoni sunt aequales.

Figura 3^a capitî 10ⁱ (¹).

Supra semicirculum ABC , κοινὸν τετράγωνὸν τοῦ μακραῖοῦ ἐντόνου γένους καὶ τοῦ διατόνου ὑπαλοῦ.

In rectâ $\eta\varepsilon$: $\epsilon\pi\lambda\zeta$.

In rectâ εf : $\epsilon\pi\lambda\zeta$.

In rectâ fg : $\epsilon\pi\lambda\eta_i$.

In rectâ op : $\epsilon\pi\lambda\iota\theta$.

In rectâ pq : $\epsilon\pi\lambda\iota$.

In rectâ $q\gamma$: $\epsilon\pi\lambda\theta$.

In Z : $\alpha\pi\mu\delta$.

In R : $\alpha\sigma\zeta\varsigma$.

In M : $\alpha\zeta\lambda\delta$.

In K : $\alpha\eta_i$.

In τ : $\rho\eta_i$.

In ν : $\rho\xi\beta$.

In φ : $\rho\kappa\varsigma$.

In H : $\alpha\sigma\lambda\beta$.

In I : $\alpha\rho\kappa$.

In π : $\rho\iota\beta$.

In ρ : $\rho\iota\beta$.

In σ : $\rho\iota\beta$.

In rectâ $\delta\gamma$: $\epsilon\pi\lambda\iota\theta$.

In rectâ $\gamma\beta$: $\epsilon\pi\lambda\pi$.

(1) Voir plus haut, page 397, note 2.

Eadem methodo in reliquis procedemus, sed, ne figuram integrum construere cogamur, deinceps errata tantum indicabimus et restituemus, aut quæ desunt supplebimus. Quod ut commodius fiat, sciendum perpetuâ et uniformi methodo quid valeant aut indicent singuli characteres.

Rectæ $\gamma\varepsilon$, εf , fg denotant proportiones chordarum unius ex tetrachordis.

Characteres Z , R , M , K denotant terminos harum proportionum.

Characteres π , ρ , φ differentias horum terminorum.

Rectæ op , pq , qz proportiones chordarum alterius ex tetrachordis.

Characteres Z , H , I , K terminos harum proportionum; primum quippe et ultimum terminum duo tetrachorda communem habent.

Characteres π , ρ , σ differentias horum terminorum.

Denique recta $\delta\gamma$ indicat proportionem parhypates prioris et posterioris tetrachordi.

Et recta $\gamma\beta$ proportiones hypates (¹) prioris et posterioris tetrachordi.

In 4^a figura ejusdem capitîs (²) desunt duo numeri ita supplendi :

In H : $\alpha\pi\varepsilon$.

In I : $\alpha\varepsilon z$.

In 3^a figurâ cap. 11ⁱ, ita corrige (³) :

In rectâ $\gamma\varepsilon$: $\varepsilon\pi i z$.

In 4^a figurâ ejusdem capitîs, ita corrige (⁴) :

Numerus K : $\sigma\gamma\beta$.

Desunt numeri H et I , ita supplendi :

In H : $\pi\varepsilon$.

In I : $\sigma\pi$.

(¹) *Lisez liehau au lieu de hypates.*

(²) *Mol tendre et syntone diatone. Voir plus haut, p. 398, note 2.*

(³) *Mol diatone et diatone égal.*

(⁴) *Mol diatone et syntone diatone.*

Figura 5^a ita restitui debet, corruptissima enim est in manuscripto (¹) :

In rectâ $\gamma\varepsilon$: $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ z.

In rectâ εf : $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ θ .

In rectâ fg : $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ ζ .

In rectâ op : $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ $z\zeta$.

In rectâ pq : $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ ζ .

In rectâ $q\gamma$: $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ γ .

In Z : $\gamma\beta\beta$.

In R : $\gamma\mu$.

In M : $\zeta\alpha\zeta$.

In K : $\zeta\delta$.

In H : $\gamma\mu\gamma$.

In I : $\zeta\zeta\zeta$.

In τ : $\lambda\beta$.

In ν : $\xi\delta$.

In ρ : $\sigma\beta$.

In π : $x\delta$.

In ρ : πz .

In σ : $\xi\gamma$.

In rectâ $\delta\nu$: $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ π .

In rectâ $\gamma\beta$: $\hat{\epsilon}\pi\hat{\eta}$ $\xi\gamma$.

In figura 3^a cap. 12^t, desunt aut corrupti sunt termini proportionum ita supplendi (²) :

In Z : $\tau\xi\delta$.

In R : $\tau\sigma\beta$.

In M : $\sigma\lambda z$.

(¹) *Mol diatone et mol tendu.*

(²) *Chromatique syntone et diatone égal.* Dans cette figure et dans la suivante, Manuel Bryenne avait pris, pour les cordes du genre *chromatique syntone*, les longueurs : 988, 275, 259, 216, dont la seconde est seulement approchée, et prise au lieu de $274\frac{1}{11}$, longueur théorique.

In K : $\zeta_2' \gamma_1$.

In H : $\sigma_2 \beta$.

In I : σz .

Emendanda etiam horum differentiae :

In τ : $i\beta$.

In ν : zx .

In φ : $\lambda\gamma$.

In π : ρ ; et σ : reponendum $x\beta$; sunt enim haec tres differentiae aequales.

In figura 4^a ejusdem capituli (¹) eadem opus est emendatione :

In Z : $\varphi x \gamma$.

In R : $\varphi \delta$.

In M : $\nu \xi \beta$.

In K : $\tau_2' \varsigma$.

In H : $\nu_2 \varepsilon$.

In I : $\nu \mu$.

Similiter :

In τ : $x\delta$.

In ν : $\mu\beta$.

In φ : $\xi \varsigma$.

In π : $\lambda\gamma$.

In σ : $\nu \varepsilon$.

In ρ : $\mu \delta$.

In figura 5^a ejusdem cap. ita corrigendum est (²) :

In Z : $\beta \nu \xi \delta$.

In R : $\beta \tau \nu \beta$.

(¹) Chromatique syntone et syntone diatone.

(²) Chromatique syntone et mol tendu. Manuel Bryenne avait pris pour les cordes du mol tendu les longueurs : $70\frac{1}{4}$, $67\frac{3}{4}$, $59\frac{1}{4}$, $52\frac{1}{8}$. La seconde n'est qu'approchée, au lieu de $67\frac{8}{15}$.

In *M* : $\beta\gamma\nu\zeta$.

In *K* : $\alpha\omega\mu\eta$, 1848.

In *H* : $\beta\tau\sigma\zeta$.

In *I* : $\beta\sigma\theta$.

In τ : $\rho\beta$.

In ν : $\rho'\zeta$.

In φ : $\tau\eta$.

In π : $\pi\eta$.

In ρ : $\sigma'\zeta$.

In σ : $\sigma\lambda\alpha$.

In rectâ $\delta\eta$: $\dot{\epsilon}\pi\lambda\zeta\eta$. Sed et in textu, eâdem paginâ, lin. 5^a, loco $\dot{\epsilon}\pi\lambda\zeta\eta$ εννεντηκοστοέκτῳ, reponendum $\dot{\epsilon}\pi\iota\epsilon\nu\nu\nu\eta\kappa\sigma\tau\sigma\gamma\delta\omega$. Eadem emendatio in lin. 22^a ejusdem paginæ fieri debet.

In figura 6^a ejusdem capitîs, corrige (¹) :

In *R* : $\alpha\psi\xi\delta$.

In *K* : $\alpha\tau\pi\zeta$.

In *H* : $\alpha\psi\xi$.

In π : $\pi\eta$.

In figurâ 3^a cap. 13 (²) :

In rectâ *op* : $\dot{\epsilon}\pi\iota\epsilon\nu\delta\epsilon\kappa\pi\zeta$.

In figurâ 4^a ejusdem cap., ita corrigendum (³) :

In *Z* : $\alpha\gamma\pi$.

In *R* : $\alpha\gamma\chi$.

In *M* : $\alpha\gamma\beta$.

In *K* : $\alpha\sigma\xi$.

In *H* : $\alpha\gamma\sigma\varepsilon$.

In *I* : $\alpha\omega$.

(¹) *Chromatique syntone et mol diatone*.

(²) *Chromatique mol et diatone égal*.

(³) *Chromatique mol et syntone diatone*. Manuel Bryenne avait pris, pour les cordes du *chromatique mol*, les longueurs : 480, 463 (au lieu de $462\frac{6}{7}$), 432, 360.

In $\tau : \tilde{\zeta}$,

In $\sigma : \rho\gamma_i$,

In $\varphi : \sigma\nu\beta$,

In $\pi : \rho\varepsilon$,

In $\rho : \rho\omega\varepsilon$,

In $\sigma : \rho\mu$.

Eadem pagina, lin. 9^a, delenda vox $\tilde{\varepsilon}\gamma\mu\sigma\pi\alpha$, et etiam in lin. penult.

In fig. 5^a ejusdem cap. (¹) :

In $K : \rho\gamma_i\pi$,

In $\varphi : \tilde{\tau}\lambda\zeta$,

In fig. 6^a ejusdem cap. (²) :

In $K : \tau\varepsilon$,

In $H : \sigma$,

In $I : \tau\tilde{\zeta}$,

In fig. 7^a ejusdem cap. (³) :

In rectâ $\gamma_i\varepsilon : \tilde{\varepsilon}\pi\lambda\zeta\tilde{\zeta}$,

In $\varphi : \rho\omega\mu\gamma_i$,

In figurâ 3^a cap. 14 (⁴) :

In $H : \rho\tau\beta$,

In $\tau : \rho\tilde{\delta}$,

In fig. 7^a ejusdem cap. (⁵) :

In rectâ $op : \tilde{\varepsilon}\pi\lambda\varepsilon$,

In rectâ $pq : \tilde{\varepsilon}\pi\lambda\gamma_i$,

In $Z : \rho\tilde{\rho}\tilde{\delta}$,

In $K : \omega\gamma_i$.

(¹) Chromatique mol et mol tendu.

(²) Chromatique mol et mol diatone.

(³) Chromatique mol et chromatique syntone.

(⁴) Enharmonique et diatone égal.

(⁵) Enharmonique et syntone diatone.

In H : $\rho\hat{k}\varepsilon$.

In I : σz .

In τ : $z\hat{z}$.

In π : $\xi\theta$.

In φ : $\rho\varepsilon$.

In figurà 5^a ejnsdem cap., ita corrige (¹) :

In Z : $\varepsilon\rho\gamma\beta$.

In R : εy .

In M : $\rho\omega\lambda$.

In K : $\gamma\omega\xi\delta$.

In H : $\rho\hat{\alpha}\xi\eta$.

In I : $\rho\hat{\alpha}\mu\xi$.

In τ : $\rho\varepsilon\beta$.

In ν : σv .

In φ : $\pi\xi\varepsilon$.

In π : $\rho\pi\delta$.

In ϱ : $\gamma z z$.

In σ : $v\pi\gamma$.

In figurà 6^a ejnsdem cap. (²) :

In τ : $\rho\xi\eta$.

In ν : $\tau v \varepsilon$.

In φ : $\rho\omega\mu\theta$.

In π : $\tau\xi\eta$.

In figurà 7^a ejnsdem cap. (³) :

In rectâ $q\gamma$: $\varepsilon\pi\iota\alpha\tau\sigma\varepsilon$.

In Z : $\gamma\iota'\xi$.

In R : $\xi\rho z$.

(¹) *Euharmonique et mot tendu*. Nombres de Bryenne pour les cordes de l'*euharmonique* : 1792, 1753 ($\frac{1}{23}$ négligé), 1680, 1344.

(²) *Euharmonique et mot diatome*.

(³) *Euharmonique et chromatique syntone*.

In M : $\zeta \tilde{\gamma} \tilde{\beta}$.

In π : $\tilde{\alpha} \tilde{\gamma} \gamma$.

In figura ultima ejusdem cap. ita corrigendum (¹) :

In Z : $\alpha \beta \omega \pi$.

In R : $\alpha \beta \gamma$.

In M : $\alpha \beta \omega \varepsilon$.

In K : $\theta \gamma \tilde{\beta}$.

In H : $\alpha \beta \omega \alpha$.

In I : $\alpha \alpha \beta \beta$.

In τ : $\sigma \pi$.

In σ : $\delta \kappa \varepsilon$.

In δ : $\beta \omega \varepsilon$.

In π : $\omega \xi$.

In ρ : $\omega \alpha \gamma$.

In σ : $\alpha \tilde{\alpha} \tilde{\beta} \beta$.

Fallitur Bryennius linea 1^a hujus paginæ ; ubi enim scribit, ἐπιεῖδος προστατῷ θέλῳ, emendandum ἐπιεῖγηκοστοεννάτῳ. Eadem emendatio et in linea antepenultimā ejusdem capitū fieri debet (²). Ideoque in rectā

$\delta\alpha$: reponendum ἐπὶ $\xi\theta$.

Proportio enim composita ex sesquivigesimā tertiā et sesquiquartā superat compositam ex sesquidecemimā quartā et sesquiquintā, non proportione sesquiseptuagesimā, ut vult hic author, sed sesquisexagesimā nonā.

In figurā 3^a, cap. ult. (³) :

In H : $\psi \delta$.

In rectā $\gamma \beta$: ἐπιογόργοκοστός.

(¹) *Enharmonique et chromatique mol.* Les nombres de Bryenne sont triples de ceux de Fermat.

(²) Ms., fol. 197^{vº}, l. 1 et 19; éd., p. 157, l. 24, et p. 458, l. 3.

(³) *Ditonien et diatome égal.*

In figurā 4^a ejusdem cap. (¹) :

In rectā $\gamma\zeta$: ἐπιέννυατος.

In rectā $\delta\gamma$: ἐπογόρηκαστός.

In π : $\rho\tau$.

In ρ : π .

In σ : $\xi\delta$.

In figurā 5^a ejusdem cap. (²) :

In rectā fg : ἐπιέγόσσις.

In Z : $\alpha\beta\gamma\beta$.

In R : $\alpha\beta\gamma\tau\eta$.

In M : $\alpha\beta\beta$.

In K : $\alpha\tau\mu\delta$.

In H : $\alpha\beta\gamma z$.

In I : $\alpha\beta\beta$.

In τ : $\xi\delta$.

In σ : $\sigma\iota\varsigma$.

In ρ : $\rho\xi\tau\eta$.

In π : $\zeta\omega$.

In ρ : $\rho\pi\theta$.

In σ : $\rho\xi\tau\eta$.

In figura 6^a ejusdem cap. (³) :

In R : $\varepsilon\rho z$.

In π : $\sigma\alpha\gamma$.

In textu hujus paginæ, lin. 12, loco verbi ἐπιτρίπακοστῷ, legendum : ἐπιτρίπακοστοῖστῷ (⁴).

In figurā 7^a ejusdem cap. (⁵) :

In K : $\beta\beta\beta$.

(¹) *Ditomien et syntone diatone.*

(²) *Mol tendu et ditomien.* Les nombres de Bryenne sont sextuples.

(³) *Mol diatone et ditomien.*

(⁴) Ms., fol. 200^{av}, l. 12; éd. p. 464, l. 8.

(⁵) *Chromatique syntone et ditomien.*

In τ : $\rho\pi\eta$.

In σ : $\sigma\kappa\delta$.

In φ : $\tau\nu\beta$.

In ρ : $\sigma\zeta\varsigma$.

In figurâ 8^a ejusdem cap. (¹) :

In H : $\rho\pi\theta$.

In I : $\zeta\pi\zeta$.

In τ : $\tau\pi$.

In σ : $\omega\mu$.

In hâe paginâ, lin. 1^a, loco verbi ἐπιεικοστοτρίτῳ, legendum ἐπιεξη-
κοστοτρίτῳ (²).

In figurâ ultimâ ejusdem capitîs (³) :

In H : $\varepsilon\rho\pi\theta$.

In I : $\delta\pi\zeta\eta$.

Possunt in his omnibus figuris notari etiam differentiae terminorum R et H , et terminorum M et I ex alterâ videlicet parte rectarum $\varepsilon\rho$ et $\delta\pi$. Quod in quibusdam figuris fecit author, ino videtur in omnibus fecisse, quia integra ad nos non pervenerunt. Hoc autem in figuris ad-
jicere est in promptu.

Videtur etiam author summam numerorum τ , σ , φ , et summam nu-
merorum π , ρ , σ , extra figuram e regione ipsorum collocasse, quod
etiam in omnibus figuris restituere facillimum est.

Figuræ simplices horum capitum ex restitutis et emendatis superius
capitis primi figuris facillime restituentur, eadem enim sunt, quas
initio horum capitum author repetit.

(¹) *Chromatique mol et ditonien.*

(²) Ms., fol. 201^v, l. 1; éd. p. 465, l. 14.

(³) *Enharmonique et ditonien.*



VARIANTES ET NOTES CRITIQUES.

VARIANTES ET NOTES CRITIQUES.

LIEUX PLANS D'APOLLONIUS.

(Legons des *Varia = Fa*, pages 10 à 15.)

P. 3. ligne 5 Appollonium (*aussi* 9) ★ 10 Appolloniis

P. 4. 5 à 11 = *Co* (Commandlin) fol. 162 recto, ligne 8 en remontant, à fol. 162 verso, ligne 2. La ponctuation de *Co* a été conservée, ★ 7/8 spaciū *Co*, ★ 17 | PROPOSITIO I. *en vedette* (*Fa*, 13), ★ 22. Les figures des *Varia* ne sont pas numérotées; les renvois aux figures ont été ajoutés au texte entre parenthèses.

P. 5. 8 quamecumque

P. 6. 6 cum (*aussi* 13, 14 et 23) ★ 15 | II. PROPOSITIO. *en vedette* (*Fa*, 14) ★ 23 rectang.

P. 7. Fig. 3. La figure comporte une seconde droite marquée BAD et menée par le point A de l'autre côté de CE; de même, la ligne DE est double. ★ 3 cum ★ directum] ajoutez comprehendentes spatium datum (*cf.* p. 9, 8). ★ 9 | aequalē (*Fa*, 15)

P. 8. 6 eundem ★ 16 cum ★ 27 VR | VI

P. 9. 7 cum (*aussi* 22) ★ 11 III. PROPOSITIO. *en vedette*

P. 10. 6 | habet (*Fa*, 16) ★ 7 Cum

P. 11. 2 priore] *le renvoi est fait à la prop. 1, fig. 2, ★ secunda*] p. ★ 7 tum après sensus] tam ★ 9 IV. PROPOSITIO. *en vedette* ★ 15 | describatur (*Fa*, 17) ★ 21 GE | GD ★ propositionis] positionis

P. 12. 3 vel EA sub AB ★ 7 cum ★ 10 priore] prima (*le renvoi est fait à prop. 2, fig. 4*) ★ 18 ou voudrait ajouter sed ut BA ad AC, ita HA ad GA; erit igitur ut HA ad GA, ita AD ad AI.

P. 13. 2 secundo] p. ★ secunda] p. ★ posueramus] perseveramus ★ 6 PROPOSITIO V. *en vedette* ★ 11 punctum (*Fa*, 18) ★ FEG] EFG ★ 15/16 similes ergo trianguli ★ 17 Cum ★ 21 occurrente

P. 14. 5 PROPOSITIO VI. *en vedette* ★ 9 | cui (*Fa*, 19)

P. 15. 3 cum ★ 6 secundo] 2. (*aussi* 13) ★ 13 VII. PROPOSITIO. *en vedette*

P. 16. 7 | aio (*Fa*, 20) ★ 8 cum (*aussi* 10 et Cum 12) ★ 11 synthesim ★ 20/21 pro-eucatur ★ 21 Centro D] ajoutez, intervallo DE.

P. 17. 3 cum ★ 4 VIII. PROPOSITIO. *en vedette* ★ 9 ductae ★ 10 | et (*Fa*, 20)

P. 48. 3 demonstratis \star 4 A et B (*à corriger*) \star 10 ut H]inH \star 14 Appollonii
 \star 20 secunda]o². \star 21 interdum etc.] voir p. 4, 9/10 \star 22 prima]1

P. 49. 4 similiter etc.] voir p. 4, 9/10 \star 11/12 = Co. 162^o, I, 5 à 6 \star 16 cum
 \star 18 | PROPOSITIO, III. (*Va.* 22) \star 19/21 = Co. 162^o, I, 6 à 8 \star 23 *Euclide*, III, 33
 \star 25/27 = Co. 162^o, I, 8 à 10 \star 25 spaci Co. \star positione et magnitudine basis

P. 20. 1 Element. = *Euclide*, I, 40 \star 4/6 = Co. 162^o, I, 11 à 14 \star 22 Sup[er (*Va.*
 3)) \star 24 cum

P. 21. 2 cum (*aussi* 4) \star Fig. 18. Les droites CN, FO ne sont pas tracées.
 \star 11/13 = Co. 162^o, I, 14 à 19 \star 11 quodam omis

P. 22. 1 spe cie (*Va.* 24) \star 3 cum \star 5 dimissis.

P. 23. 19 rationem (*Va.* 25)

P. 24. 4 8 = Co. 162^o, I, 19 à 25 \star 4 quotecumque Co. \star 7 duera Co. \star reliquis
 Co. reliquiā *Va.* \star 10 VI] sextae \star Voir, pour le renvoi à l'*Isagoge* dans la Note, la
 page 93.

P. 25. 4 AB, AC] AC, AB \star Fig. 22. Les *Varia* donnent deux figures; dans la seconde, qui n'a pas été reproduite, toutes les lignes sont à l'intérieur du triangle ABC, sur les côtés duquel l'ordre des points est le suivant : ADRLBKOVZIEA. \star 18 cum (*aussi* 19)
 \star 19/20 VE, MO] MO, VE

P. 26. 9 cum \star 11|VE (*Va.* 26) \star 20 perallelas \star 24 porrigendas

P. 27. 4/8 = Co. 162^o, I, 25 à 30 \star 6 spaciū Co. \star 7 aequalis sit Co. sit aequalis
Va. \star 8 spacio Co. \star 21 eūm \star Voir, pour le renvoi à l'*Isagoge* dans la Note, la
 page 102.

P. 28. 4 et (*Va.* 27) \star Fig. 23. Les *Varia* donnent deux figures différant seulement
 par l'ordre des points : AB et GCDEF dans la première (supprimée); BA et DCEGF dans la
 seconde. \star 8 et 20 eūm

P. 29. (*Va.* 28) \star 3/5 = Co. 162^o, I, 32 à dernière \star 3 sunt Co. \star 4 spacio Co.

P. 30. 3 eūm \star 12|Nam (*Va.* 29) \star 16 per quartam secundi (*Euclide*, II, 4)
 \star Voir, pour le renvoi à l'*Isagoge* dans la Note 2, la page 99.

P. 31. 3 AD quadrat. \star 3/4 quartam propositionem 2^r (*Euclide*, II, 4) \star 9 datam]
 datum \star 19|NC (*Va.* 30) \star 23/24 Co. 162^o, I, dernière à 163, I, 1) a seulement : si sint
 in proportionē data vel rectæ lineaæ vel circumferentiae;

P. 32. 3 rectos \star 7 ut R, quadratum ad S, et ita \star 9 OVZ]NOZ

P. 33. 3 id est R, quadratum ad S, quadratum, ita AN, quad. ad VB, Quad. \star 9 (*Va.*
 31) \star 10/11 = Co. 163, I, 1 à 7. \star 12 fit Co sit *Va.* \star 13 et om. *Va.* \star 14 contingere Co.

P. 34. 7 latitudinem rectam AP (*à corriger*) \star 17] rectangulum (*Va.* 32) \star 21 AB
 in BO]AB, in AO \star 22 aequatur

P. 35. 4 rrectangulum \star deficiens in figura \star 10/12 = Co. 163, I, 7 à 10 \star 11 ma-
 jor Co. \star 12 datam Co. datum *Va.* \star 13 BI]IB (*à corriger*)

P. 36. 3 ita] ut ★ 7 VNB (*la première fois*)] NNB ★ [Sed (*Va.* 33) ★ 8 cum ★ 11 sint ★ 13 utrinque ★ 21 datum]

P. 37. 9/10 = Co. 163, l. 16 à 13 ★ 9 quoteunque Co. quoteunque *Va.* ★ 10 spacio Co. ★ 14]dico (*Va.* 34) ★ 20 cum

P. 38. 2 utrinque (*aussi* 12 et 17) ★ 5 Centro C]centro E (*sur la figure des Variet.* le centre est effectivement E) ★ 6 CA]EA ★ 7/8 eandem ★ 10 et 12 cum

P. 39. 4 CE]AE ★ 8]Si (*Va.* 35) ★ 12 in 1. 2. et 3. (*de même*, 1. 2. 3. *sur les figures* 37 et 38)

P. 40. 3 in 1. ★ 4 in 2. ★ 5 in 3 ★ 6 in 1. et in 3. figura ★ 7 et 14 et 16 utrinque ★ 7 illine]illi ★ 14 In 2. ★ 16 in 1. ★ 20 quacunque ★ 21 (*Va.* 36) ★ in 1. figura

P. 41. 1/2 secunda et tertia ★ 3 In 1. ★ CN]EN ★ 6 AD (*la première fois*)] AB ★ 31 PRIMA]L

P. 42. 5 spa]tio (*Va.* 37) ★ 8 .Equetur] Arguetur ★ 25 At] ut

P. 43. 14]et ad (*Va.* 38) ★ 13 DM]p. e. OM, DM ★ 19 NM]DNM ★ Fig. 41. Les *Varia* donnent ici trois figures : la première a été reproduite plus loin (*fig.* 42) ; elle est accompagnée de la légende « AD 4 pars AB 2. + E. » c. a. d. $AD = \frac{1}{2}(AB + AE)$; la seconde a pour légende « AD 4 pars AB + E. » (*lisez* encore AE au lieu de E) et ne diffère de la troisième (*fig.* 41) qu'en ce que le point B est entre le point E et le point N de droite ; la légende de la troisième est « AD 4 pars AB + AE. » ★ 21 aequentur

P. 44. 8 BM]EM ★ 12 Q]Z (*sur la figure 43, la lettre Z est inscrite en dehors pour représenter le plan donné Z*) ★ 13 QI]ZI

P. 45. 1 QR]ZR ★ 4 QO]ZO ★ QR]ZR ★ 6]plano (*Va.* 39) ★ 15 cum ★ 23 utrinque ★ 28 secundo]2. ★ 31 DY]DI

P. 46. 2 quadrata ta ★ 6 VI]QI ★ 10 probandum ★ 14]et (*Va.* 40) ★ 16 quodlibet]quotlibet (*à corriger*)

P. 47. 2 sexties ★ 3 D]B ★ 9 rectâ assignata ★ Fig. 45. La lettre O manque. ★ 16 conditionata ★ 18]sextans (*Va.* 41)

P. 48. 2/6 = Co. 163, l. 13 à 18.

P. 49. 6 hypotesi ★ Fig. 47. La lettre O manque. ★ 12]LA (*Va.* 42) ★ 13/14 propositionem tertiam Appollonii triangulum EOB ★ 13 utrinque (*aussi* 21, 23, 26) ★ 22 auferetur ★ 25 sive]sine

P. 50. 1 IAO]IOA ★ quadratis]quadrato ★ 3 Geaus ★ 5/10 = Co. 163, l. 18 à 24 ★ 12 propos. 157. libri septimi (*cf. Pappus*, éd. Hultsch, p. 910-913) ★ 13 jusqu'à P. 51. 13 = Co. 260^o à 261 ★ 17 quoteunque

P. 51. 4/5 sunt... propterea]Co. disait : et angulus ad A utrisque communis, erit et reliquo relliquo aequalis et triangulum triangulo simile : quare, cum sit ut FA ad AL ita EA ad AB, erit ★ 7 ex (*après* quadratis) Co. om. *Va.* ★ 10 qua]drato (*Va.* 43) ★ 11 EAL]Co. ajoute ut demonstravimus ★ 13 FG Co. EG *Va.* ★ 17/19 = Co. 163. l. 24 à 27 ★ 19 eandem

CONTACTS SPHÉRIQUES.

(Léons des *Varia* : *Ta.*, pages 74 à 88.)

P. 52. 7 extitit ⋆ 10 qua ⋆ 17 elementis = *Euclide*, XI, 2 ⋆ 18 pers | picum (*Ta.*, 75) ⋆ 20 dat]dato ⋆ 21 cum

P. 53. 6 ACD]CAD ⋆ Fig. 49. Le triangle NOM n'est pas figuré; le point N est marqué entre A et O. ⋆ 13 et 15 cum

P. 54. 11 MEON]NEOM ⋆ 14 igiltur (*Ta.*, 76) ⋆ 18 cum

P. 55. 2 cum

P. 56. 5 cum ⋆ 12 Appollonio ⋆ 16 (*Ta.*, 77) ⋆ Fig. 52 : ne vient qu'après la fig. 53 et au bas de la page *Ta.*, 77.

P. 57. 10 ineli[nationem] (*Ta.*, 78)

P. 58. 4 cum ⋆ Fig. 54. Les points E, H ne sont pas marqués. ⋆ 14 (*Ta.*, 79) ⋆ 19 ERCA]ERCH (aussi 20)

P. 59. 3 cum (aussi 4, 5, 14, 19) ⋆ 6 etiam perpend. ad

P. 60. 1 (*Ta.*, 80) ⋆ 7 et 10 cum

P. 61. 1 LEMMA I, en redette ⋆ 3 ECA]ECB ⋆ elementis = *Euclide*, III, 36 ⋆ Fig. 57. Des perpendiculaires AN, CM sont abaissées des points A, C sur l'axe BD. ⋆ 8 [converti] (*Ta.*, 81) ⋆ 9 cum ⋆ 12 LEMMA II, en redette ⋆ 16 O, L, E, D]OELD

P. 62. Fig. 58. Des perpendiculaires ON, LI, EF, DB sont abaissées des points O, L, E, D sur l'axe AP. ⋆ 6 LEMMA III en redette (*Ta.*, 82)

P. 63. 7 sphericam sensible superflua ⋆ 13 cum (aussi 17, 31) ⋆ 26 LEMMA IV en redette ⋆ 30 nam secetur sphera ad planum ⋆ 32 planum (*Ta.*, 83)

P. 64. 1 Habemus]habens ⋆ 7 LEMMA V en redette ⋆ 9 plano]puncto ⋆ FGHI]FIII ⋆ Fig. 61. La lettre M n'est pas inscrite. ⋆ 13 B]BI ⋆ 16 superficieum (*Ta.*, 84)

P. 65. 6 M]H ⋆ 8 IFII]DFII ⋆ 9 PFM (les deux fois)]PFII ⋆ 11 FM]FIH ⋆ 22 exequemur ⋆ 30 31 per 2, problema (*Ta.*, 85)

P. 66. 3 cum

P. 67. 8 ex 3, lemmitate ⋆ 9 (*Ta.*, 86) ⋆ 14 fieri

P. 68. 5 VIII]octovum ⋆ 6 V]quinti ⋆ III]tertio ⋆ 8 (*Ta.*, 87) ⋆ 12 III]3. ⋆ et om. ⋆ 17 Une figure, qui a été supprimée, représente un cercle inscrit dans un angle ABC et renfermant deux cercles D, E qui sont tangents intérieurement au premier.

P. 69. 1 (*Ta.*, 88) ⋆ 4 sexto]VI. ⋆ 8 Une figure représente quatre cercles A, B, C, D tangents intérieurement à un cinquième ⋆ 15 sphæriens]lire sphæricis (?)

SOLUTION DU PROBLÈME D'ÉTIENNE PASCAL.

P = Texte d'après Bossut, *Oeuvres de Pascal*, 1779, Tome IV, pages 450 à 454.

F = Autographe de Fermat, Bibl. Nat. Imprimés, Réserve 8^V₃ 8⁸.

P. 70. 2 dñō de Paschal *F* (*P ajoute au titre : codem autore Fermat*). ★ 3 de Paschal *F*
 ★ hoc problema *P, om. F* (à supprimer) ★ Fig. 65. *Les figures jointes à l'autographie ne sont pas de la main de Fermat ; dans le texte, les lettres désignant les points sont en minuscule (sauf B et H) et surmontées d'un trait horizontal.*

P. 71. 1 AF]fa *F* (aussi 2) ★ AF]fi *F* (aussi 3) ★ 9 cum *F* cūm *P* ★ 12 IB]Bi *F*
 ★ 16 duplum]dimidium *FP* (peut-être faut-il lire utriusque dimidium triangulum)
 ★ 21 CO]oe *F* ★ 24 triangulo AFC} ajoutez avec *F* : isosceli

P. 72. 3 cum *F* ★ 4 recta *F* recta *P* ★ prima]6 *P, om. F* ★ 5 ED]de *F* ★ 6 igitur
 est ut rectangulum BHE ad *F* ★ 7 ad idem rectangulum AC*F* ★ 10 EH]He *F* ★ 18 non]ne *F*
 ★ 19 facillum] *F* ★ 20 secunda]2^a *F* septimā *P* ★ antea est en interligne et sed rāgē
 ayant triangulum *F* ★ Fig. 66. *La droite FM est tracée sur la figure de Bossut.*
 ★ 22 utrinque *FP* ★ et licet *F* ★ 23 variabit]variet *F*

P. 73. 1 ibit]erit *F* ★ 2 de]ex *F* ★ 3 concludet *F* ★ 9 cum *F* cūm *P* ★ 13 varians
 proportionem si *P* ★ 20 placet] *F* ajoute žωρ̄ζελος ★ Domino (les deux fois) dñō de *F*
 ★ 22 Baliani *P Galilaei F* ★ 23 Dominus]dñus de *F* ★ 25 expectamus *P* ★ 29 ac differ-
 entia *F*

P. 74. 8 Baliani *P Galilaei F* ★ 11 cum *F*

DEUX PORISMES.

P = Texte de Bossut des *Oeuvres de Pascal*, 1779, Tome IV, p. 449 à 450.

F = Autographe de Fermat, Bibl. Nat. Imprimés, Réserve 8^V₃ 8⁸.

Nota. -- Les figures jointes à l'autographie sont de la main de Fermat et semblables à celles qu'a reproduites Bossut : au nombre de trois correspondant à notre fig. 67 et avec la légende : *Id porisma t^{um}*; au nombre de deux pour notre fig. 68 avec la légende : *Id porisma 2^{um}* et avec la note : *circulos non adimplevimus, licet propositione tota circumferentia locum habeat.* (Dans la figure non reproduite pour le second porisme, les points V et O sont sur les prolongements du diamètre AG.) Les lettres des figures sont en minuscule, sauf A, B et H; dans le texte, elles sont surmontées d'un trait horizontal; au lieu de V, que nous avons adopté d'après l'usage des *Faria*, il faudrait partout lire U, comme a fait Bossut; au contraire, la lettre Y correspond à un v minuscule de Fermat.

P. 74. 13 *Fue porte pas de titre général. P y ajoute autore Petro Fermat.* ★ 14 1^{um} po-
 risma *F*, PORISMA PRIMUM *P* ★ 13 ABE]ABd *F* ★ querantur *F*

P. 75. 9 O]p F (*par erreur*) ★ 12 NH]pi F (*par erreur*) ★ 14 représentabit F ★ AB in D]ABd F (*supprimez donc sub après rectangulo*) ★ 15 2^{um} porisma F. PORISMA sicut NDU P ★ ABGD]ABep F (*en désaccord avec la figure*) ★ 22 quadrupla FP

P. 76. 1 F ajoute et avant sumptâ. ★ 3 ND]UD P nd F

PORISMES D'EUCLIDE.

(Leçons des *Taria = Fa*, pages 116 à 119.)

P. 76. 13 Euclideorum ★ 16 Pappus (*voir éd. Hultsch, p. 636, l. 18 à 30*) ★ 17 cum ★ 20 edax abelore vetustas (*hémistiche d'Ovide, Métam. XV, 872*) ★ 24 Willebrordus ★ 26 διορθωτής

P. 77. 3 4 Euclidavorum ★ 3 Pappus, p. 648, l. 19 à 20; traduction de Commandin, l. 160, l. 10 à 11 ★ 11/10 Virgile, *Enéide*, II, 589-590 ★ 13 sydus ★ 14 abscondamus ★ 16 dumtaxat ★ 17 quandoeunque

P. 78. 4 (*Fa, 117*) Videatur figura porismatis 1, est ajouté au-dessous de Porisma primum (les figures de cet opuscule sont gravées sur les Planches à la fin du Volume des *Taria*). ★ Fig. 69. La même figure comporte trois positions du point V, entre N et O, entre O et E, et entre E et F; comparez la fig. 70 et le texte, p. 79, 6 à 11. ★ Ligne 4 de la Note, *Bonillau a écrit Cavallierio*.

P. 79. 3 Videatur figura porismatis 2, ajouté au-dessous; la même addition, sauf les chiffres respectifs 3., 4., 5., est faite avant les énoncés des porismes suivants, 79, 12; 80, 8; 81, 9. ★ 13/14 uteunque

P. 80. 3 AO]AN ★ 8 (*Fa, 118*) ★ Fig. 72. Une lettre O est insérée au même point que la lettre H.

P. 81. 10 uteunque ★ 11 juneta AZ fiat]peut-être juneta AZ fiat ★ 13 HN]HC ★ 20 Pappus, p. 650, l. 10 à 11.

P. 82. 4 HN]HC ★ EHN]EHG ★ 9 Pappus, p. 650, l. 2 ★ 14 Cum ★ 15 cum ★ 19 Pappus (*Fa, 119*). *Voir* éd. Hultsch, p. 650, l. 3 à 4 ★ 20 quinti]5 ★ 21 RAC]RAB

P. 83. 3 quinti]5 ★ 6 Cum ★ ipsi]ipsa ★ 7/9 = Commandin, f° 160, l. 10 à 13. ★ 10 et 17 cum ★ 10/11 authorem ★ 12 Pappus, p. 658, l. 18 à 21 : πορίσματα ἐπειδής πολλαγές καὶ λογικές τοι.

PROPOSITION SUR LA PARABOLE.

(Leçons des *Taria = Fa*, pages 144 à 145.)

P. 84. 5 quatuor]4. ★ 6 utriusque ★ 7 in 1. fig.

P. 85. 4 CM]CN ★ 12 ex 52, 1. Apoll. ★ 13 in 2. fig. ★ 14 quatuor]4. ★ 18 cum (aussi 20 et 23) ★ 20 dentur]detur ★ 23 In 2. easu ★ 24 In 3. fig.

P. 86. 1 quatuor]4. (aussi 16) ★ 9 et 13 cum ★ 12 per 16, 3. Apoll.

P. 87. 2 cum (aussi 3) ★ [autem (*Fa, 145*) ★ 6 ex 29, 2. Apoll. ★ 11 M]N

LIEU A TROIS DROITES.

(Leçons de la copie ancienne, dans le manuscrit de la Nationale, fonds latin, nouv. acq. n° 2339, f° 15.)

P. 87. 21 Sur la figure, les lettres désignant les points sont en minuscule; dans le texte, la minuscule domine avec des variations irrégulières.

P. 88. 6 datur]dantur ★ 8 cumi (aussi 17) ★ 9 aequales ★ 10 rectang^{um} ★ 13 se-
cetur]fertur

P. 89. 2 cum ★ cim ★ 3 propoone^{nt} Apoll. ★ 6 rectang^{um} (aussi 7) ★ 9 cim
★ 10 recta OX]rectae ox ★ 11 relique]recta ★ 12 demonstracionem

LIEUX PLANS ET SOLIDES.

(Texte établi d'après la copie ancienne dans le MS., fonds latin, nouv. acq. n° 2339 = I,
f° 1 à 9, 12 à 14. Leçons des *Varia*; pages 1 à 11 = *Va.*)*

P. 91. 4 septimi]7, L *Va.* ★ Appollonium ★ 9 ad locos generalis L ★ 12 curva
infinita ★ 14 ignota]Va. ajoute (lineæ rectæ reponendum) ★ 15 circularem ★ para-
bolem ★ 16 hyperbolem ★ ellipsim

P. 92. 4 possunt institui ★ 3 ad angulum datum L ★ 9 Recta (*Va.*, 2) ★ Fig. 78.
La droite IM, mentionnée dans le texte (93. 7) n'est tracée ni dans L ni dans *Va.* En
regard de la figure de *Va.* est inscrit « DA $\frac{1}{4}$ BE » (l'accoleade correspond au signe d'éga-
lité). Enfin aucune des sources ne distingue entre les lettres algébriques et les lettres géo-
métriques. ★ 22 Z^r — DA ★ aequetur] aequi, L, $\frac{1}{4}$ *Va.*

P. 93. 2 Z^r ★ 6 ZI]EI L (en marge forsitan ZI) ★ sed angulus ad Z datur ★ 10 adli-
cientur L ★ 12/13 7, prop. lib. 1, Appollonii ★ 15 nos om. ★ 17 quodelunque L ★ recta-
om. ★ 19 efficietur ★ 21 Appollonianis ★ 23 aequatur L, *Va* ajoute en marge : AE $\frac{1}{4}$ Z^r
★ 24 hyperbolem ★ 25 quodlibet L quodvis *Va.* ★ 26 rectang. ★ 27 Z plano L

P. 94. 1 cum *Va.*, cum L (aussi 19, 20) ★ rectang. (aussi 9, 13) ★ Fig. 79. La courbe
n'est pas tracée, L *Va.* ★ 4 aut EI vel E ★ adlecta L ★ 5 Ponatur (*Va.*, 3) ★ 6 D^r *Va*
(aussi 8, 14, 15), D planum L ★ aequari L, acq. entre parenthèses *Va.*, qui a en redette
D^r + AE ≠ RA + SE sur trois lignes. ★ 8 D plano L ★ 9 duob. laterib. ★ 11 repe-
rariantur *Va* ajoute « Uno verbo *AS* (lisez *I-S*) aequetur *O* et *R-E* aequetur *I*:
igitur *OI* \propto (à savoir =) *D^r* (ajoutez — *RS*), quod proponitur, et haec erit constractio :
D^r (ajoutez — *RS*) aequetur *AEB*; rectang. (lisez rectangulum) igitur *ACF* erit *O* in *I*. »
Ce texte se rapporte une figure représentant deux arcs rectangulaires asymptotes d'une
branche d'hyperbole équilatérale dont *AC*, *AE* sont des abscisses; *CF*, *EB* les ordonnées
correspondantes. ★ 17 parall. (2 fois) ★ Dans L, la lettre V est toujours un U minus-
cule. ★ 20 ZP]ZI L (en marge forsitan ZP)

(*) Les leçons sans indication appartiennent seulement au texte des *Varia*. Dans L, les lettres
algébriques et géométriques sont généralement en majuscule; il y a quelques exceptions irrégulières.

P. 95. *I. D' *Va* (aussi 3)*, D plano *L* \star 2 hyperbolem \star Fig. 80. La courbe n'est pas tracée, *L Va*, \star 4 parall., \star Rectang., \star *T Va* a en marge sur 6 lignes confuses : « $A^2 \propto E^2$ » « A^2 ad E^2 in ratione data » « $A^2 + AE$ ad E^2 in ratioae » \star 7 cum *Va*, cum *L*, \star Aq. [*Va* emploie constamment la notation A^2 ; de même E^2 pour *Eq.* etc.], \star 7/8 aquatur]adq., \star 11 quad. *E* \star rectang., \star adficiuntur *L* \star 14 [Sit (*Va*, 4) \star ZI quadratum *L* \star Fig. 81]. Dans *Va*, les fig. 81 et 82 sont confondues et les courbes ne sont pas tracées sur cette dernière; dans *L*, la fig. 82 n'offre qu'une droite de N à I.

P. 96. *I adficiuntur *L** \star 5 perquirere \star 8 evadit \star 10 *Va a en marge* : $A^2 \propto DE$ \star 11 aeq. *Va*, aspetetur *L* (corrigez) \star 12 parabolem *Va*, qui agoue : constituantur NZ et ZI ad quemque angulum *Z* \star 13 circa] on voudrait au paravant : vertice N \star 14 datae \star 14, 13 parallela \star 13 NZ]NP *L* \star parabolem \star 17 IZ]IP *L* \star NZ]NE *L*. *La lieu de cette ligne*, *Va* donne : hoc est, si PI intelligatur esse A et NP intelligatur esse E.

P. 97. *5 *Va a en marge* : $E^2 \propto DA$ \star 6 parallela *L Va* \star 9 aequ. *Va*, qui a en marge $B^2 - A^2 \propto DE$ » « $B^2 - DE \propto A^2$ » sur trois lignes. \star 15 [Les parenthèses n'existent pas, *Va*, \star Fig. 83]. La courbe n'est pas tracée, *L Va*, \star 20 aquatur NZ]aquabitar NE \star quadrato *L* (aussi 21) \star 22 rectum]dextrum \star [NZ (*Va*, 5) \star 23 aequ. *Va*, aequatur *L*.*

P. 98. *I supr.*, \star ab *E* et *Iq. om.*, \star 4 *Va a en marge* : $B^2 - A^2 \propto E^2$, \star Fig. 84. Le cercle n'est pas tracé; les lettres *I* et *E* ne sont pas insérées, *L Va*; un point O est marqué à l'extrémité gauche de la droite MN, \star 8 quodeunque *L* \star 9 ZI] on voudrait ajouter : (sive *Eq.*) \star 9, 10 quad. NM \star 10 le signe $-$ est omis, \star quad. NZ \star 15 D in A bis]D in $A^2 L$, $^2 D$ in A *Va* (chaque des sources conservant par la suite sa notation propre) \star *Va a en marge* : $B^2 - ^2 DA - A^2 \propto R^2 + ^2 RE$, \star 17 aequ. \star 19 Ergo] *Va* ajoute : auferendo scilicet D^2 , quod utrinque fuerat additum,

P. 99. *I E = R* \star 3 aeq. \star 6 Appollonii \star 8 Appollonio \star 11 ellipsim *L Va* (aussi 15, 22); *Va a en marge* : $B^2 - A^2$ ad E^2 rati. \star 12 MN]NM *L* \star N]Z \star 16 quad NZ \star 22 commisceantur \star 23 [Si (*Va*, 6) \star 26 in ratione datâ *L* \star *Va a en marge* : $A^2 + B^2$ ad E^2 ratio hyperbol. \star 27 hyperbolem \star 28/29 quad.

P. 100. *I hyperbole* \star 2 toto]lisez tota \star 2/3 unâ cum RO quadrato om. \star 4/3 unâ cum quadrato NR om. \star 6 rectang. \star NR quad. *Va*, NR quadrat^m *L* \star Fig. 85. Les lettres *I* et *E* ne sont pas marquées. Dans la figure de *L*, il n'y a de courbe tracée qu'à l'intérieur du rectangle, \star *Va a en marge* : OI sit A, ON, seu ZI, sit E, \star 7 NO q. *L*, NO quadrat, *Va* \star ZI quadrat, \star quadrat, OI \star 9 NR quadratum *L* \star 12 I]Z \star hyperbolem \star 13 aequationem \star 14 adficiuntur *L* \star 16 affectionis *L* \star 19 adficiantur *L* \star 21 Aq. bis par exception *L* \star aequatur *Va* \star En marge de *Va* : $B^2 - ^2 A^2 \propto AE + ^2$ lisez $- E^2$).

P. 101. *I untrinque *L** \star 3 \star Eq. om. \star 6 MN q. *L* \star NZ quadrato *L* \star 7 quad. alis \star 8, hac (*Va*, 7) \star Fig. 86. Les lettres *I* et *E* ne sont pas marquées. \star 11 parallella \star 12 Cum *Va*, cum *L* \star 13 tota]toti \star 15 quad. MN — quad. NZ \star 17 NZ]UZ *L* \star 19 NR]UR *L* \star NO]RO

P. 102. *2 quad. NZ* \star 3 NR quadrati *L* (meilleur) \star NO quad. ad quad. OV \star 4 superrioribus \star 5 ellipsim *L Va* \star 6 dissimili *L* \star 13 propos. \star 13/14 lib. 1. Appoll-

★ 18 quoctuecumque $L \star 21$ practicen L , proxim $\mathcal{F}a \star 23$ habeant datam $L \star 24, 25$ E, terminus NZ, $L \mathcal{F}a \star 23$ Ici, L écrit bis en toutes lettres, après Aq. et Eq.

P. 403. ($\mathcal{F}a$, 8) ★ 1 perpend. ★ 2 date ★ NM]ZM ★ 3 L avait d'abord écrit : ipsi OZ aequalis ZM, puis corrigé une première fois : ipsi ZM aequalis ZO ★ Fig. 87. Le point 1 se trouve marqué au pied d'une perpendiculaire abaissée de O sur VZ; RM se confond avec notre ligne MH; l'arc OM n'est pas tracé $\mathcal{F}a$. Dans L , la figure, tout à fait incorrecte, comporte un cercle complet UOL, les droites UIZ, ZO, NM, RN et RM, cette dernière passant au-dessous de L. ★ 7[14] Cet alinéa est omis dans L . ★ 13 ($\mathcal{F}a$, 9) ★ ISAGOGEM La copie de L , pour l'Appendice, est d'une autre écriture que celle de l'Isagoge ; elle a subi diverses corrections, de la main de Roberval (?); notamment parabolam a ystenuati- quement été changé en parabolam, hyperbolam en hyperbolam, paraboles et hyperboles en parabolae et hyperbolae, parabole et hyperbole en parabola et hyperbola.

P. 404. 3 secant] corrigé de intersectante $L \star 6$ sectionis] corrigé de intersectionis L . ★ 9 A cubus \perp B in A quadratum L , $A^3 \perp B$ in $A^2 \mathcal{F}a$, qui continue l'emploi des expo- sants. ★ Z plano L , Zp $\mathcal{F}a$ (et de même ensuite) ★ 13 cum $L \mathcal{F}a \star 14$ A cubus \perp B in A quad. $L \star 17$ parabolam (aussi, 23) ★ 23 hyperbolam ★ 26 synthesim ★ 28 adfec- tis $L \star 31$ exempl. ★ quadratoquadraticis]quad. quad. $\mathcal{F}a$, quadratoquadratorum $L \star 32$ Aqq.]A³ ★ B sol L , B³ $\mathcal{F}a \star$ Zq.]Z pl. L , Zp $\mathcal{F}a \star$ Dppl. L , D^{3p} $\mathcal{F}a$

P. 405. 2 Dppl. L (aussi 10, 12) ★ B sol. L (de même 12; au contraire 10, B solid.) ★ 2 L omet le second signe — ★ 4 Cum (et 9, cum) $L \mathcal{F}a \star 8$ parabolam (aussi 14, 18) ★ 10 le premier signe — est omis $L \mathcal{F}a \star 12$ Dans $\mathcal{F}a$, la barre de division s'étend jusqu'au-dessous de aequalitibus; dans L , la fraction est divisée en deux. ★ 14 et ad (Va, 10) ★ 16/17]emend. $L \mathcal{F}a \star 19$ hyperbolam ★ 22/23 proport. ★ 24 A cubus $L \star 25$ Dans L , si est rotatur et remploré par posito nempe quod, de l'écriture de Roberval (?)

P. 406. 2 B in DE ★ 3 intersectionem]sectionem ★ 12 aeq. ★ 13 tamquam ★ para- bolem ★ 14 et AO applicatae ★ 15 parallela est bien dans L ; les crochets sont donc à supprimer. ★ hæ ★ 16 secunda]z. ★ 19 rectang. OVZ

P. 407. 1 dabitur]platur $L \star 4$ proportion. ★ 7 quadrat. quad. ★ 9 aequalib. ★ 12 aeq. (les deux fois) et $L \mathcal{F}a \star B[B^2 \star 13$ parabolam (de même 23) ★ 17 climactice]lacune de 3^{me} dans L , om. $\mathcal{F}a$; ce mot devrait être entre crochets. ★ 26 —]+ ★ Z sol $L \star$ Dppl. $L \star 27$]Ergo (Va, 11)

P. 408. 3 —]+ ★ 7 — om. $L \star 7/8$ aequale Bqq.—Bq. in Aq. bis +]fiet Aqq. \perp Bqq—Bq. in Aq. bis aequale Bqq.—Bq. in Aq.—L, aequale $B^3—B^2$ in A^2 aequale $B^4—B^2$ in $A^2+\mathcal{F}a \star 8$ Z sol. $L \star$ Dppl. L (aussi 16) ★ 10 Bq. bis] $^2B^2—\mathcal{F}a$ ★ 14 parabolam ★ 16 + $Zs. in A \over Nq.$]+ $Z sol. \over Nq.$ in A $L, \frac{-Z^2 in A}{N} \mathcal{F}a \star 19/20$ quadrato- quadrat. ★ 22 quad. quadratae ★ 23 cum $\mathcal{F}a$, Cum $L \star$ adfectione $L \star 27$ quadrato- quadrata ★ 29 est curandum

P. 409. 4 Z sol. L (aussi 11, 17) ★ 7 Bq. in Aq. bis] $^2A^2$ in B^2 (aussi 11 la 1^{re} fois) ★ 9 Bq. in Aq. bis] $^2B^2$ in $B^2 \star 11$ Z pl.]Zp (de même 13, 18, 21) ★ 12 secunda]z.A ★ 13 verbi gratia] (V. G) ★ 17 Zs.]Z ★ 19 hyperbolam $\mathcal{F}a \star 21$ Z pl. $L \star 22$ +] corrigé de plus $L \star 24$ —] corrigé de minus $L \star 26$ aequale L , aequ. $\mathcal{F}a \star 28$ aeq.

P. 410. 1 utrinque $L \star$ bis] L prend la notation abrégée " ★ 2 Bq. in Aq. bis (la 2^{de} fois)] $^2A^2$ in $B^2 \star 7$ parabolam ★ fiet istine.

LIEUX EN SURFACE.

(Leçons du manuscrit Arbogast-Boncompagni, fol. 51 à 55.)

- P. 411. 2 en renvoi, la note : d'après une copie. ★ 3 ἐπειδὴς ★ 13 | concis (f° 51^{vn})

P. 412. 2 Les numéros des lemmes ne sont pas inscrits ★ 12 erit | est ★ 13 | Si
P. 52)

P. 413. 3 | sint (f° 52^{vn}) ★ parabola aut hyperbola ★ 13 Archimedea ★ 21 cir-
cumferentiam (f° 53) ★ 27 NIP | NMP ★ 28 Cum

P. 414. 3 | NIP (f° 53^{vn}) ★ 4 Cum (aussi 9, 13, 17, 19) ★ 19 dumtaxat ★ 20 | satis-
faciat (f° 54)

P. 415. 14 | locorum (f° 54^{vn}) ★ 15 dumtaxat ★ 18 et 26 eun

P. 416. 1 | superficies (f° 55) ★ 16 quibuscunque ★ 20 | major (f° 55^{vn})

P. 417. 8 mabis (?) ★ 14 jan. ★ Au-dessous Finis,

DISSERTATION TRIPARTIE.

(Leçons des *Taria*, pages 110 à 115.)

- P. 118. 12 executuros ★ 13 cum

P. 119. 20 sive aquatio | nem (*Va*, 111)

P. 120. 4 verbi gratia] v.g. ★ 24 cuboēbus ★ planosolidum ★ solidosolido ★ 26 quadratocubus ★ planoplano ★ planosolido

P. 121. 3 quadratocubocubus ★ planoplanosolidum ★ planosolidosolido ★ 3 quadrato-quadratocubus ★ solidosolido ★ planoplano solido ★ 7 eum (*de même* 11)

P. 122. 3 parabolam ★ parabolæ (*Va* (*corriger* paraboles)) ★ Fig. 99. Non reproduite dans les *Varia*. ★ 11 eum

P. 123. 4 continent (*Va*, 112) ★ 13 eum ★ 21 3^t. ★ 4^t, 5^t. ★ 22 6^t, 7^t. ★ 8^t, 9^t. ★ 10^t. ★ 24 2^t. ★ 25 3^t. ★ 28 1^t.

P. 124. 1 ex] ex una parte, ex ★ 8/9 quadrati] *lire peut-être* quadratice ★ 14 Z plan. in A quad. quad. ★ 13 D solid. ★ M plan.plan. in A quad. ★ 27 utrinque

P. 125. 2 Z platum ★ 3 3^t. ★ 8 poste] riori (*Va*, 113) ★ 9 quadrati] *lire peut-être* quadratice ★ 9/10 quadraticum] quadratum ★ 12 prioris ★ 14 inter sol. N ★ 20 pe-racto] paeto ★ 23 quadratum] latus quadrati ★ aequandum] aequandi. *Peut-être faut-il conserver ces deux leçons en supprimant les mots à latere (23/26).*

P. 126. 2 1^t. (*Canxi* 8) ★ 11 problematis (aussi 14) ★ 13 homogena ★ 18 haec ★ forma ★ 23 Cum ★ 24 ad primam] pura ★ 26 eum ★ 27 quadratæ ★ 33 8^t. ★ 7^t. ★ 1^t.

P. 127. 1 10^t. ★ 9^t. ★ 5^t. ★ 12^t. ★ 2 11^t. ★ 6^t. ★ 3 Cum ★ 8^t. ★ 7^t. ★ 4 5^t. ★ 6^t. ★ 10^t. ★ 9^t. ★ 3 7^t. ★ 8^t. ★ 12^t. ★ 11^t. ★ 6 9^t. ★ 10^t. ★ 11 alienis] *Ou*

n'a pu retrouver à quel en particulier. Fermat aurait emprunté cette formule d'une pensée qui a été exprimée de diverses manières soit sur Platon, soit sur Aristote.

* 13 (*Fa*, 114) * 21 expatiari

P. 428. 1 5^t (*aussi* 21, 23, 29) * 2 6^t * 4^t (*aussi* 22, 30, 33) * 4 3^t (*aussi* 8, 11, 13, 28, 29) * 7/8 manebit D aequatio * 17 Cartesius solvi tantum * 11^t * 12^t * 19/20 7^t

P. 429. 2 4^t. (*aussi* 3, 28) * 4 triginta]trigesima * 5 7^t. (*aussi* 8/9) * 6 6^t. (*aussi* 10) * 7 A³ et B³D * 11 9^t. * 14 cum * 16 immutandam (*Fa*, 115) * 21 verb. grat.

P. 430. 1 3^t. (*aussi* 2, 24, 31) * deem]10. * 2 4^t. * 3 executi * 6 cum (*aussi* 23) * 12 duodecim]12. * 20 octo]8 (*aussi* 27) * 29 quatuordecim]14. * 31 5^t.

P. 431. 1 Cum * 11 Dom. * 13 17^t * 14 25^t * 19/20 expecto

MAXIMA ET MINIMA.

L. — L = copie ancienne fonds Libri (nouv. acq. lat. 2339), f° 10 verso.

Fa = *Varia*, pages 63 à 67.

A₁ = copie d'Arbogast (nouv. acq. fr. 3280, f° 143 à 145).

A = copie au net d'Arbogast (manuscrit)

De la page 133, ligne 7, { Boncompagni) pour la seconde rédaction
à la page 134, ligne 7, { A' = brouillon d'Arbogast (nouv. acq. fr. 3280) en tant qu'il diffère de A (voir page 133, note 1).

Cf. D = Lettres de Descartes, éd. Clerselier, III, 56 et 57

P. 433. *Tu-dessus du titre* : Copie d'un écrit envoyé par le R. Pere Merceinne à monsieur *en nature* des Cartes L; Ex Fermatio A₁ * 6 in notis]ignotis *Fa* L A₁, *leçon qu'il fallait peut-être conserver* : ep. page 186, 28 et 30, où toutefois le sens est différent; pour la *leçon proposée*, voir p. 140, 7 * 10 pris esse terminus *Fa* A₁ * 11/12 gradibus om. A' qj. A * 13 adficuntur L I.

P. 434. 1 adfectione L I * deinde]dehinc A * utrinque L * 4 adfirmatis L *Fa* A * 7 subjecimus A₁ * 8 rectang. *Fa* A₁ (*aussi* 12) * 9 pars]par *Fa* * ipsius om. *Fa* L * 10 Aq.]A² *Fa* A₁ (*qui conservent ensuite la notation exponentielle*) * 13 — A in E bis]²E in A *Fa*, — ²E in A A₁ * Eq.]E *Fa* * 14 rectang. *Fa* * 15 A₁ ajoute :

$$B \times A - A^2 + B \times E - 2A \times E - E^2 = B \times A - A^2$$

17 E bis]E'' *Fa* * Au lieu de cette ligne, A₁ écrit : erit $B \times E = 2A \times E + E^2$ * 19 et 21 A bis]²A *Fa* * A₁ écrit pour la ligne 19 : erit $B = 2A + E$, pour la ligne 21 : erit $B = 2A$.

P. 435. [(*Fa*, 64) * 4 punctum]OI qj. *Fa*, O qj. A₁ et (en interligne) L : peut-être faut-il ajouter ut O * 9 quad. (4 fois) *Fa* A₁ * 11 quam CE quad. ad HE quad. A₁ * quad. HE *Fa* * 12 Cum L *Fa* A₁ * 13 D]L a B et en marge : il a iey nommé B ce qu'il nomme d par apres * 16 ad]ant *Fa* * proportionem DL, rationem *Fa* A₁ * 17 bis om. A₁ *Fa* (de même 19, 22 et p. 436, 2, 4, 8); L a partout la notation E'' * 19 Aq. (la seconde fois) A quadr. L * 21 A₁ ajoute : D × A² erit

P. 136. 6 Albis] A²] *Ia*, ★ 13 proportionibus] proportione *I*, *Ia* ★ 16 Domino] Duo *L*
★ *I* porte en marge dans le sens vertical : M^r des Cartes, f. 347.

II. — Leçons des *Favia*, pages 65 à 66 (où la notation exponentielle a été adoptée).

P. 137. 9 parabola ★ 12 basis

P. 138. 1 Tom. ★ pet. 9 ★ 2 Archimed, de aquipond. cum ★ 3 eavas ★ 5 cum
(aussi 19) ★ 7 Archimedaeo ★ 9 E bis] E'' (notation qui continue ensuite) ★ 12 ad
Bpq → *Eq*, → *om*, ★ 16 ut *B* in *E*² → ad *B*² + *E*² + *E*²*EB* in *E*' ita ★ 17 aequalit[er] applicab[er]t
★ 18 $\frac{B^2 \text{ in } A \text{ in } E'' + A \text{ in } E^3 - B \text{ in } A \text{ in } E^2}{B^2 \text{ in } E'' - B \text{ in } E^2}$ ★ 20 recta] (*Ia*, 66)

P. 139. 2 Eq. bis] *E*² ★ 4 bis] La notation est désormais le coefficient en exposant à
l'avant, ★ →] - ★ 6 Le second terme est + *E*³ ★ 8 ab *E*, affecte ★ 19/20 indicare] ju-
dicare ★ 21 5] 51.

III. — Leçons des *Favia*, pages 66 à 69 (où la notation exponentielle a été adoptée).

P. 140. 7 Algebraicis ★ 8 Ac.] *A* ★ 10 quad. ★ 11 ex BEA ★ 12 E bis] *E*² (même
notation ensuite pour les coefficients) ★ 13 — Ec. om ★ 14 primō ★ 16 tamquam
★ 20 *B*² in *A* → *A*³ ★ 22 le troisième terme est : - *A*² in *E*²

P. 141. 3 Eq.] *E* ★ 14 oportet] aequationes *aj*, ★ 17 aequalē ★ 24 linea C

P. 142. (*Ia*, 67) ★ 2 refert ★ 4 ut ut ★ 11 proportionem] questionem ★ 20 crit
mit.

P. 143. 1 MN erit ★ 4 *B* in *A*] *B* ★ 22 Le troisième terme est répété.

P. 144. 7 residuum (corrigez) ★ 20 punct. N ★ 23 OMD] OND ★ 26] Ut (*Ia*, 68)

P. 145. 2 Ellipsim (aussi 7, 9, 10) ★ 3 Algebraicis ★ 5 contentam] inter punctum V
sumptum ad libitum, ajouté ★ 9 DM] DN ★ 12 quad. FO ad quad. IV ★ 14 quad.
(+ fois) ★ 16 rectang. (+ fois) ★ 18 quad. (+ fois) ★ 20 rectang. (+ fois) ★ 21 quad.
(+ fois) ★ 23 et 24 rectang. ★ 25 et 26 quad. ★ 26 erit om.

P. 146. 16 homog. ★ 17 in G om. ★ 21 eam] dem (*Ia*, 69) ★ 23 OM] ON

P. 147. 2 numer quam ★ 3 asymptoton ★ 6 Domino] D.

IV. — Leçons d'Arbogast.

I = copie au net (MS. Boncompagni, f° 78 à 81).

*I*₁ = brouillon (noty, acq. frang., n° 3280, f° 133 à 136).

*I*₂ = leçons de *A₁* écrites après coup d'une autre encré en corrections ou dans des lacunes
primitivement laissées.

P. 147. 3 Titre d'après *I* quid a en note : D'après la copie de Mersenne, *I₁* a pour
titre Méthode de maxima et minima de Fermat et en marge. D'après une copie écrite par
Mersenne et peu lisible ★ 9 synergiseos] en venvoi Viet, pag. 104. *I₁* ★ anastrophes] en
vov o Viet, pag. 135. *I₁* ★ 10 correlatarum om. *I₁* ★ 10/11 constitutione *I₂*, construc-

tione $A_1 \star 13/14$ que veteri et nova molestiam exhibuere Geometriae $A_2 \star 16$ licet [sed A_1 licet sed A_2]

A. 448. 1 *paroxysm*] monachos $\star 2$ constitutivi $I_2 \star 3$ utrinque $\star 3$ secta [*lire plutôt* seconde $\star 10$ eā conditione A_2 , ita quidem $I_1 \star 11$ supponitur I_2 , endum *erit au-*
dessus de la finale de supponitur $I \star 13$ intercipiuntur $I_2 \star 14$ alieujus $I_2 \star 17$ igitur $I_2 \star$ correllata $A \star 24$ loco $I_2 \star 26$ aeedunt $I \star 27$ semperque auctis $I_2 \star 28$ differentia *corr. de* distantia A, distantia I_1

P. 449. 1 ultimam $A_2 \star$ divisionem $I_2 \star 1/2$ *paroxysm* vel [*en lacune*] I_1 , ut $A \star 2$ unica $I_2 \star$ contingit $I_1 \star$ quum I , cum *ou* tum (?) $I_1 \star$ quantitates *om.* $A_1 \star 4$ Cum I_1 , \star igitur (*corr. de jam*) $I_2 \star$ correllatis $I_2 \star 3$ methodum Vietaeam $A_2 \star$ inquietur ipsi $I_2 \star 6$ semper $I_2 \star 14$ quadr. $\star 15$ correllata $I \star 16$ quadr. $I \star 17$ Comparantur $I_1 \star 18$ quadr. (\star *fois*) \star cubo (\star *fois*) $\star 20$ A quadr. $I \star$ Equadr. $\star 21$ constitutio I , *en lacune* $I_1 \star 23$ quadr. I

P. 450. 1 practice A, praxis $A_1 \star$ correllatarum $A_1 \star 2$ per ipsum differentiam comparari] seu ipsum differentias (*corr. de* distantias) comparari I , seu ipsum (*corr. de summan*) distantias parari A_1 *en revoi au bas de la page*; I_2 a corrigé le dernier mot *en* comparari \star ut eā ratione I_2 , ut... ratione *corr. de* constitutione $I_1 \star 3$ unicā *corr. de misere* (?) $I_1 \star$ differentiam *corr. de* distantiam I , distantiam $I_1 \star 5$ Ac.] A cub. (*même abréc.* 7, 10, 12, 16) $\star 7$ B quadr. $I_1 \star 11$ una] prima $A_1 \star 24$ Cum $I_1 \star$ inventa $I_2 \star 24/25$ constitutione A_2

P. 451. 3 libro] I. $\star 4$ L.7 I_1 lib. 7 $I \star 11 \rightarrow$ — I_1 (*même faute poursuivie dans le calcul*, 13, 17, 20, 23 et p. 452, 10, 16) $\star 18$ parte *om.* $I_1 \star 21$ communibus I_2 , aequalibus I_1

P. 452. 6 D in A in Eq.] D in A — Eq. $I_1 \star 8$ hujusmodi *corr. de* has div. $I_2 \star 14$ constitutione] constr. $I_2 \star 15$ igitur *corr. de* sive I sive $I_1 \star 20$ quippe se vel $I_2 \star 21$ non deerit $I_2 \star 24$ cerebras $A_2 \star 25$ Recurrendum $I_2 \star$ posteriorem *corr. de* positiones $I_2 \star 26$ tamen heet $I_2 \star 26/27$ facilitatem $I \star 27$ abunde *om.* $A_1 \star 29$ id genus I_2

P. 453. 1 pronunciamus \star semper et $I_2 \star 2$ autem $I_2 \star 3$ contineri $A_2 \star 8$ *Tout le vers est de* $A_2 \star 10$ tribus] 3 \star reperire *corr. de* invenire $I_2 \star$ si dueantur tres *corr. de* dueantur duae et tres I_2 (*en sorte qu'il reste si dueantur tres duae et tres*)

V. — Leçons de la copie d'Arbogast (MS. Boncompagni, f° 56 à 50v).

P. 453. 14 asymetriæ $\star 22$ *pas de parenthèses* (non plus que p. 454, 2, 8, 10, 20, p. 455, 10, 14, 16; p. 456, 4) \star quadr. (*même abréviation ensuite*)

P. 454. 17 O quadrato $\star 18$ Cum $\star 21$ asymetriæ

P. 455. 10 quadrati $\star 11$ Cum $\star 15$ et 16 lateri $\star 16$ dim. B

P. 456. 8 O plan. $\star 11$ resolvitor $\star 17$ Bq. — A quadr. $\star 18$ AB quadr. \star *fois* \star AD quadr. $\star 21$ ad quæ] quæ ad \star A quadr.

P. 457. 4 Aq. quad. $\star 5$ minima] maxima $\star 7$ Aq quad. $\star 8$ maxima] minima $\star 10$ B cubus $\star 12$ B quadrato $\star 16$ asymetrias $\star 26$ hyperbola $\star 27$ hyperbole

★ 29 a P. 158. 1 (asympotis AF, FG) *explication de* sub angulo AFC, n'est peut-être pas de Fermat.

P. 158. 4 hyperbolam ★ 5 hyperbolā ★ 9 MB]in B ★ 12 minoris]nimis

VI. D'après l'original de Fermat,

F_a = manuscrit original (moy. aép. fr., n° 3280, f° 112 à 117).

F_a , *Tarīq*, pages 69 à 75.

F = copie d'Arbogast (MS. Boncompagni, f° 68 à 73). F et A ne portent point de titre;

F_a en note 7 (D'après une copie. Cet épusule est imprimé dans les *Opera* *Tarīq* de Fermat, Toulouse, 1679).

Dans le manuscrit original F , les lettres des figures et celles qui, dans le texte, en désignent les points, sont en minuscule, sauf A, B et H, et surmontées d'un trait horizontal; les lettres alphanumériques sont au contraire en majuscule.)

P. 159. 2 Praef. F_a ★ VII]z^r F , 7, F_a ★ 4 suas corr. de ipsarum F ★ 3 lineas rectas tantum F_a ★ 8 tamen om. F ★ legitimū om. F , sufficiens F_a A ★ 14 adaequalitatem]aequalitatem F_a ★ 20 Esto (F_a , 70) ★ sc̄dit F_a

P. 160. 1 Cum F_a F ★ 12 et 17 pas de parenthèses; F_a suit la notation exponentielle. ★ 13 Cum F_a ★ Fig. 101. La ligne AU n'est pas tracée dans F_a .

P. 161. 2 E bis]E F_a (même notation ensuite) ★ 3 F_a omitt — N in E bis et supprime désormais in dans les monômes. ★ 4 Quadratum]A² F_a ★ 10 CA]A F_a ★ U]pour cette lettre, F_a et I ont toujours V. ★ AC]rectæ aj. F_a ★ 11 latitudine A ★ juncta recta EH F_a ★ 13 et 15 Nicomedea F F_a ★ 14 prolixior]proclivior F F_a ★ 16]Polus F_a , 71 ★ 17 curva F_a ★ 18 est om. F ★ NBA]BA F F_a

P. 162. 3 BI]BG F_a ★ 6 procedat]prodeat F_a ★ 7 recta (devenit CD et EH) om. F_a ★ vocetur (aprèz CD et EH)sit F_a ★ EH]EN (peu lisible dans F) F_a ★ 12 iis]his F_a ★ 14 Dominus]Dinus I , D, F_a ★ 22 aequalitas F F_a ★ 23 curva]Cycloïde aj. F_a ★ Domini]Dai F, Domi]I, D, F_a ★ 24 II corrigē de A dans F (9^e main) ★ GF]EF F_a ★ 26 est duocenda F_a ★ 29 CM]AM F_a

P. 163. 7]RD vocetur Z (data om.) F_a (p. 72) ★ 8 vocetur]sit F_a (aussi 9) ★ 9 utique F F_a ★ 13 NIVOE]none F, MOVE F_a ★ 14 et 17 adaequare]aequari F_a ★ 16 et 17 nimis]— F_a ★ 18 tres om. F F_a ★ 19 ex]et A ★ superiore F_a

P. 164. 6 triangulorum similitudinem F_a ★ 7 ipsi om. F_a ★ 8/9 aequalitas F_a ★ 11 in B]in in B F ★ consistet adaequalitas inter om. F_a ★ 12 et R in B in A]RBE F_a ★ 13 Cum F F_a ★ 14 aequatur], F_a ★ 16 ex una parte aequatur], F_a ★ ex altera om. F_a ★ 18 nempe ZBE cum F_a ★ 20 Aequetur om. F_a ★ 21 cum], F_a ★ 22 fieri igitur]et fieri F_a ★ 24 Constructio]Const. (écrit au-dessus de Ad) F, om. F_a

P. 165. 3 ideo]corr. de igitur F ★ 4 BD]DB F_a ★ 5 sive et elegantior evadet I ★ 9 vero om. F ★ 11]Sit (F_a , 73) ★ 14/13 La correction indiquée dans la note 3 peut être réellement de la main de Fermat; le texte primitif, remplacé par les mots fiat, . . . ad rectam NO, semble avoir été, autant qu'on peut le discerner sous la rature: portioni quadrantis MD rectam NO constituimus aequarem. En fait, c'est la projection de IO sur la perpendiculaire au rayon MI qui doit être égale à l'arc MD.

P. 166. 1 Nicomedea F F_a ★ 2 Domini]Dni F ★ 3 pertinent F (à corriger)

$\star 8$ in sequenti figura om. $E\Gamma \star 9$ applicato $\Gamma \star 19$ cum $E\Gamma La \star$ forme{for-
marum La

P. 467. 2 uterque $E\Gamma \star 5$ statione] ratione $La \star 8/9$ Domino de Roberval om. La
Dom de Roberval E .

VII. — Texte d'après le MS. Vieq-d'Azur-Boncompagni, f° 17v-18r — B.

A = copie d'Arbogast (MS. Boncompagni, f° 8v-9r).

H : Nationale, fonds latin 11197, f° 17v-18r.

Titre seulement dans H avec l'abréviation AD R. P. M.

P. 467. 20 semicirclo $H \star 21$ et [plus] $HH \star$ Après cylindri, H ajoute : (Similis est
rectangulo DEA plus dimidio quadrati ex DE et omnibus duplatis), avec la note marge-
nale : Quod inclusum est hoc addidi ad explicationem.

P. 468. 3 aequatur [aequale] H (aussi 4) $\star 6$ adPLICatis $H \star 9$ satisfacit $H \star 13$ Cum
 $1BH$ (aussi 23) $\star 18$ autem om. HH

P. 469. Eut majus [majus ut $H \star 2$ sectio] divisio $H \star$ minus] Vide in altera paginā
ag. $H \star 7$ determinatione [demonstratione] $H \star 8$ questioni] proposito $\Gamma \star$ quan-
doque [quandoquidem $H \star 10$ Cum $1BH \star 12$ questionem] propositum H

VIII et IX. — G : copie d'après Clerselier (nouv. acq. fr., n° 3280, f° 87 suiv. et 78 suiv.)

D : Lettres de Descartes, ed. Clerselier, III, 5r. Dans ces deux sources, pour le
morceau VH, la notation cartésienne a été complètement adoptée (exposant
simple juxtaposition des lettres dans chaque monôme, coefficient numérique en
avant du terme), mais avec des lettres majuscules.

P. 470. 3 AFDB|ADFB C, ADB D $\star 8$ et 13 cum $\star 12$ rectam om. D

P. 472. 1 et 3 10 C, OI D $\star 3$ et 6 latius quad.] radix quadrata $\star 4$ La parenthèse
n'est pas fermée D; pas de parenthèses C, $\star 6$ Pas de parenthèses, $\star 10$ fier $\star 13$ abrupt-
us [et rupris $\star 22$ vergit D $\star 23$ invento et theoremati C

P. 473. 8 luminis om. C $\star 12$ ἡπεραστοῦ πος D

P. 474. 3 duo illa D $\star 6$ Cum (aussi 21) $\star 9$ ad rationem temporis motus $\star 20$ in
summa] corr. de ut summan C, ut summan D

P. 475. 12 in medio denso C, in superficie mediū densi D $\star 15$ pure D, pene C
 $\star 16$ C place ici la fig. 109 avec les mots : In figura avant Esto, $\star 25$ C a en marge :
in 1^{re} fig.

P. 476. 4 minor est D \star NV[NR] C $\star 3$ emm (aussi 7, 14, 20) $\star 11$ rectan-
gulo om. C $\star 12$ MN[NM] C $\star 13$ quadratun D, quadratoquadratum C $\star 39$ et
om. D

P. 477. 3 cum $\star 7$ ut om. C $\star 11$ NS[SN] C $\star 14/15$ rectangle RNV bis (peut-
être mieux; aussi 17/18) C $\star 21$ C a en marge : V, in 2^{re} fig.

P. 478. 3 aequalur $\star 11$ IN[C] ajoute ita et omel les lignes 12 et 13 $\star 13$ IN D
 $\star 24$ NR[M] C

METHODE D'ELIMINATION.

Fa — Varia Opera, pages 58 à 64.

P — MS. Nationale, fonds latin 1116, f° 46 à 53.

L — MS., nouv. acq. latin 9339, f° 17 à 20.

(Cette dernière copie emploie constamment la notation cartesienne complète,
à partir de la page 181, ligne 15.)

P. 181. *I* *T* ajouté : A Domino de Fermat ad Dominum de Careavi die 20^a Aprilis anno 1650 missus ★ 5 Reductio *L* ★ 6 Algebraicis ★ 12 Eq. ★ N qdto *L* ★ 14 quecumque *L* ★ 15 et 19 cum ★ 16 *Z* sol. *Fa P*, *Z* *L* ★ 18 *Z*, *S Fa*, *Z* sol *P*; (*de même enuite*) ★ 23 abs *E L* ★ ab secunda *Fa L*

P. 182. *I* hujusmodi *P* ★ 3 Cum ★ 4 tanquam et *L* ★ 8 *Fa* marque + devant le premier terme, ★ 10 toties *om.*, *L* ★ 11 omnino] continuo *L* ★ 16 affici *Fa P* ★ 17 abs *E Fa* ★ *E* qdttm *L* ★ 22 ut *L*, et *Fa P* ★ quomodounque *L* ★ affecta ★ 23] Erit (*Fa*, 59) ★ 27 ut diximus *om.*, *L*.

P. 183. 5 Cum (*de même* 17, 22) ★ 6 tamquam *Fa P*, ut tanquam *L* ★ 8 *P a* désor- mais l'abréviation *Zs.* ★ 9 *Nq.* in *B*] *Nq.* — in *B*, *Fa* ★ 14 in *A* — in *E* *Fa* ★ 23 Pour le troisième terme du dénominateur, *L a* : — *BAN*²

P. 184. 3 cum ★ secundum *L* ★ 12 et cest. *P* ★ 13 (*Fa*, 60) ★ 15 Algebraicis ★ symetrica *PL* ★ climatismus *Fa L* ★ 13/16 Vitea *P* ★ 17 sufficiens [superficiens *L* ★ est *om.*, *L* ★ 19 latus cubicum (*B* in *A* qu., — *A* cub.) *Fa P* ★ *L a* latus cubicum, latus quadratum ★ *Z*] *Fa* (*de même enuite*) ★ 20 latus (*2 fois*) *Fa P* ★ latus quadratoquadratum *L* ★ latus quadratum *L* ★ *D* cub. *Fa* ★ *A* qu., qu., *Fa P*.

P. 185. 7 *A* qui, *Fa P* (*de même* *E* qui, 20, *B* qui, 22) ★ *A* cub. (*la 1^{re} fois*) *Fa P* (*de même* 10, 14, 28; aussi *E* cub., 28) ★ — *Ae*, *om.*, *L* ★ — lat.] — *L*, *Fa L* ★ 13 haec enim una *L* ★ 20 *D* cubus *Fa P* (*de même* *E* cubus 22, *A* cubo 22) ★ 21 sed et ex *L* ★ 24, 25 conjiciundi *P* ★ 28 *B*] *Fa* ★ 29 radice *Fa*.

P. 186. 4 inutilia]mutila *L* ★ 6 tertius, quartus *L* ★ et cest. *P* ★ 7 tanquam se] cum-dam (*Fa*, 61) ★ 10 fuerint *Fa* ★ reducta fuerint *L* ★ reduces *om.*, *L* ★ 11 denique] deinde *L* ★ 13 exulare ★ 14 innumerosa *Fa* ★ 13 resolutione, ..., asymmetria *om.*, *F* ★ enim *om.*, *P* ★ 18 cum ★ 19 quandiu *Fa L* ★ 26 constituendum *L* ★ 28 num- quam *L* *Fa*

P. 187. I dumtaxat *Fa L* ★ 3 et cest. *P* ★ 3 data *om.*, *P* ★ 13 exposcat] exposuit *L* 14 que]neque *P* ★ 19 *B* qui *Fa P* (*de même* 23) ★ *Z* qui, *P* 2 qui, *Fa* ★ 20 cum ★ 21 deficientes *P* ★ 23 *A* qq., *Fa P*, ★ 24 ex]de *L*

P. 188. I Patetib[il corrigé de Ita erit *P* ★ 3 cubica, quadratoquadratica *om.*, *Fa* ★ et cest. *P* (*de même* 20) ★ ejus]ejus *L* ★ 12 inveniunt, ..., solidum (13) *om.*, *L* ★ 13 cum ★ 14 sumatur *L* ★ 17 quecumque *L*

PROBLÈME D'ADRIEN ROMAIN.

Leçons de l'original (Ms. Huygens 30 de l'Université de Leyde) : collation de M. Bierens de Haan.

La distinction des u et v, i et j n'existe pas dans l'original.

P. 189. 7 cepi ⋆ 190. 12 quintisectionem ⋆ 192. 3 + (pour et?) radici cubicae ⋆ 13 + radici quadratocubicae ⋆ 22 + radici quadratoquadratocubicae ⋆ 194. 2 primogenitam ⋆ 3 Idesse : pour Monsieur

Huggens.

QUESTIONS DE CAVALIERI.

Leçons de A = MS. Arborgast Boncompagni, fol. 25 à 36.
B = MS. Vieq-d'Azyr-Boncompagni, fol. 18.

P. 195. 4 primi I ⋆ 5 D^m I duo B ⋆ 6 D^m I dūm B ⋆ 8 felicissimum Z

P. 196. 2 feliciter B ⋆ 6 cum B (aussi 23) ⋆ 8 pronunciamus ⋆ 14/15 I intervenerit les deux membres de la phrase. ⋆ 16 summan ⋆ 20 v. g. B

P. 197. 3 nempe jitemque I ⋆ 4 cum B ⋆ 7 parabolam (aussi 8) ⋆ 14 applicatis (2 fois) B ⋆ 27 ambiens IB et Merseenne (voir p. 195, note 1) ⋆ 29 Dominio] D^m I, D, B ⋆ exequemur.

P. 198. 1 parabolam ⋆ 2 proprietates ⋆ 3 impossible] I a verit ensuite, puis raye, verum est ⋆ 4 ellipses B

PROPOSITIONS À LALOUVÈRE.

Leçons de Lalouvère (*de Cœloides*, pages 391 à 395).

Les lettres des figures sur celles-ci et dans le texte sont minuscules. Les renvois aux figures sont faits dans le texte, les figures 112 à 119 de notre édition étant d'ailleurs numérotées 105 à 112 par Lalouvère.

P. 199. 3 hyperbola ⋆ 6 parabolæ (aussi 205, 10/11, 206, 22, 207, 9, 209, 15) ⋆ 6 hyperbolæ (aussi 200, 7, 13) ⋆ 202. 6/7 v. g. ⋆ 203. 3 quarta] 107. ⋆ 8 quinta] 108. ⋆ 11 quarta] 108. ⋆ 204. 3 quinta] 109. ⋆ 8 AM] cm ⋆ 18 sexta] 110. ⋆ 20 tertia] 107. ⋆ 21 hac] hoc ⋆ 22 eundem ⋆ 205. 2 AC] de ⋆ 14 AN] au ⋆ 13 AB] nb ⋆ RU] zu ⋆ 18 Le numero VI est reporté 206, 1 ⋆ 206, 1 sexta] 110 ⋆ 4 parabola (aussi 7, 207, 20, 208, 4, 24, 28, 209, 4) ⋆ 206, 12 septima] 111. ⋆ 207, 4 ejusdemque ⋆ 14 aequetur ⋆ 19 quocunque ⋆ 208, 12 aequetur ⋆ 26 trienbus ⋆ 209, 14 diminuta.

DISSERTATION M. P. E. A. S.

(Lectens des *Faria*, pages 89 à 109.)

P. 211. 3 *La porte en marge* : Haec Dissertation typis edita fuit anno 1660, occulto Autore nomine.

P. 212. 4 cum ★ 13 L|PRIMA, ★ 15 eava|eurya ★ 19 portio|nem (*ta*, 90)

P. 213. 1 cum ★ 3 basem ★ 4 BI|KI ★ 7 quam recta ab H ad R ducta|qua recta ab HR ad R ductam ★ 10 eandem

P. 214. 3 Demonstrationem (corrigez) ★ 10 | Exponatur (*ta*, 91) ★ secunda|a, ★ 11 AG|AF ★ quodlibet ★ 20 tercia|3. (*en marge* : Deest hoc loco figura 3, quam ad calceum libri lector inveniet.) ★ 21 eundem

P. 215. 9 cum (*de même* 11, 13) ★ 10 utrumque ★ basis (*aussi* 16, 26 *deme fois*) ★ 12 s, et 3. Figurae (*de même* 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, pour secunda ou seconde, 3, pour tercia, ac, au) ★ 23 aequales ★ 26 aequales (*ta*, 92)

P. 216. 2 secunda|a, ★ 3 basis (*aussi* 10) ★ ipsius|ipsi ★ 6 cum (*de même* 16, 22) ★ 14 basi

P. 217. 3 quarta|a, ★ 14 parabola

P. 218. 24, ut (*ta*, 93) ★ 26 rectarum|rectae ★ 29 IF|IE

P. 219. 12 quinta|5, ★ parabola ★ Fig. 19|. Les lettres β et δ sont en majuscule grecque.

P. 220. 3 directu ★ recta ★ 15 KI|HK ★ 19 et sit|et fit ★ parabola ★ 21 parabolæ (*aussi* 28) ★ 22 FX|EX ★ 26 | sed (*ta*, 93) ★ 27 IK in KI|HK in KIS ★ 30 cum ★ 32 V|U (*de même dans la page 221, mais non plus loin*)

P. 221. 9 cum

P. 222. 1 parabolam ★ 12 Les lettres grecques β, δ et plus loin γ, θ, ι, ς de la figure 19 et du texte sont en majuscule ; dans l'édition anonyme, toutes les lettres romaines ou grecques, sont en minuscule. ★ 17 posit ★ 23 cum ★ 26 minori ★ eandem

P. 223. 9 parabolæ ★ |perpendiculares (*ta*, 95) ★ 16 γE|θE

P. 224. 9 minor|minorum ★ 12 cum

P. 225. 1 cum (*de même* 12, 18 et cum 23) ★ 6 parabolam (*aussi* 25) ★ 17 |aequale (*ta*, 96) ★ 26 paraboles (*aussi* 27)

P. 226. 3 parabolas ★ 3 reliqua ★ rectas ★ 6 aequalis seu applicatio semibasi ★ 17 ad (*ta*, 97)

P. 227. 6 septima|γ, ★ 8 DM, NL, EK, HI ★ 9 hac |ayontz priore ★ 16 quarta,a|a,a

P. 228. 3 cum ★ 15 (*ta*, 98) ★ 16 in Fig. 8,

P. 229. 14 recta|eurya ★ 27 cum ★ RC|RE

P. 230. 3 autem (*ta*, 99) ★ 27 PQ|QP

P. 231. 1 in 9, Fig. ★ 3 AC|AG

P. 232. 6 cum enim cetera latera ★ 8 | FI (*Fa*, 100) ★ 26 in 3. v. g. ★ quod (corrigere)

P. 233. 9 in Fig. 10.

P. 234. 1 parabola simplex (*Fa*, 101) ★ 2 parabola ★ 3 cum ★ 12 parabola
★ 26 in 4.

P. 235. 6 parabole (aussi 13, 15) ★ 11 in 4. ★ 16 [quotas] quot ★ 18 g. sit in 4.
Fig. ★ 21 in (*Fa*, 102)

P. 236. 3 parabola ★ 7 quartaria 1. ★ 9 est 1. ★ 22 rectae datae ★ 33 cum

P. 237. 7 in 4. ★ 9 basis (aussi 17) ★ 12/13 secunda (*Fa*, 103)

P. 238. 6 (*Fa*, 104) ★ Les figures de l'Appendix sont à la fin du volume. ★ 10 PRIMA
★ 13 1/4, 5. ★ rectae recta

P. 239. 1 1/4 ★ 12 AIF | AF ★ 13 M | ut ★ 31 1/67 (*Fa*, 105) ★ cum

P. 240. 7 cum (aussi 13, 19) ★ 29 En marge : Figura 2.

P. 241. 3 YX | IX

P. 242. 19 cum ★ 26 | sit (*Fa*, 106)

P. 243. 6 tertia 3. ★ En marge : Figura 3.

P. 244. 10 cum ★ 23 quarta 1. ★ En marge : Figura 4.

P. 245. 9 III | tercia ★ 20 cum

P. 246. 1 | ergo (*Fa*, 107) ★ 14 quinta 1/5. ★ En marge : Figura 5. ★ 22 basis

P. 247. 3 En marge : Figura 6. Dans l'édition de 1663, la figure est numérotée 5, comme la précédente. ★ 8 construator parabole ★ 9/10 parabolam (aussi 10, 11)
★ 13 cum

P. 248. 3 biseca ★ 12 VI | sexta

P. 249. 10 | tangens (*Fa*, 108) ★ Les lettres grecques qui suivent dans les figures et le texte sont en minuscule.

P. 250. 1 cum ★ 4 axi 98 ★ 13 cum

P. 251. 3/4 semibasis ★ 16 VI | sexta

P. 252. 10 cum (aussi 23) ★ 16 con | strunctione (*Fa*, 109) ★ 17 et 18. Par excep-
tion 17 est en minuscule. ★ 20 parabola ★ 21 parabolae

P. 253. 1 parabole (aussi 2, 4, 5) ★ 2 basis ★ 3 parabola (aussi 4, 6) ★ II | se-
cunda ★ 4 cum (aussi 10)

P. 254. Lettres grecques en minuscule : 1 ο, 2 οπζ, 3 οδ, 9 βωθ, 12 δλ. ★ 6 basis
★ parabola (aussi 13, 14) ★ 7 cum ★ 11 basim | basein ★ 14 parabolae

Les figures à la fin du volume (première planche) ne sont pas numérotées, mais indi-
quées comme suit : Fig. Pag. 91, pour notre Fig. 122 (3); ★ Fig. Pag. 104, pour 134 (1);
★ Fig. Pag. 105, pour 133 (2); ★ Fig. Pag. 106, pour 136 (3); ★ Fig. Pag. 106, pour 137
(4); ★ Fig. Pag. 107, pour 138 (5); ★ Fig. Pag. 107, pour 139 (5); ★ Fig. Pag. 108,
pour 140 (5) et 141 (5). Sur cette dernière, la lettre ζ est minuscule, pour ζ on lit 6, et
le chiffre 12 n'est pas marqué.

MÉTHODES DE QUADRATURE.

(Léons des *Taria*, pages 44 à 57.)

P. 255. 11 dūntaxat ★ 16 parabolam

P. 256. 7 asymptoton ★ 11 soſolum (*Ta.* 45) ★ 12 3, et 4, ★ 17 hyperbola ★ Fig. 142. *Les lignes ponctuées ne sont pas tracées et le point B n'est pas coté.*P. 257. 8 Archimedea[m] ★ 9 GH[E]GHE ★ 10 *Iprès aequetur., à la ligne GE, in GH, puis Item commence un nouvel alinéa.* ★ 13 Archimedea ★ 16 eum ★ 17 Ali ad AO]AH, AO ★ 23 cùm ★ parallelogrammi ★ parallelogramnumP. 258. 14 ergo (*Ta.* 46) ★ 22 parallelogrammos ★ 23 Archimedea ★ 24 curva in INDP. 259. 4 Archimedea ★ 6 hyperbola[*e*] (aussi 10) ★ 22 *Entre GE et ad est intercalé : ad parallelogramnum sub GE, in GH, ita parallelogramnum sub GE, in GE* ★ GA]GHP. 260. 2 hyperbola (*aussi 6, 11*) ★ 8 eum ★ 13 cùm ★ 19 parabola ★ 22] Sit (*Ta.* 47) ★ AGRC]AGRE ★ 26 GE]ECP. 261. 4 eum ★ Fig. 143. *Les lettres V, Y ne sont pas inscrites.* ★ 20 EN]EV

P. 262. 6 YC]BC ★ 27 ARCB]AROB

P. 263. 2 quod]qua ★ 2/3 representates ★ 3 ad]o (*Ta.* 48) ★ 3 Archimedeo ★ 13 AIGC]AICB ★ Fig. 144. *Les lignes AD, DC ne sont pas tracées.*P. 264. 3 eum (*aussi 9, 21*) ★ 4 GE]ECP. 265. 14 parallelogramnum [ut ajouté devant.] ★ 20] nempe (*Ta.* 49) ★ 22 parallelogramnum ★ 27 3;]B, ★ 28 2;]3,

P. 266. 4 hyperbola ★ 11 potestatis]quantitatifs

P. 267. 3 q.]quad. (*trois fois; même abréviation par la suite*) ★ 10 U]V (*de même ensuite*) ★ 11 cùm ★ 14 — Aq.]A — quad. ★ 18 -- om. ★ 28 Aq.]AGP. 268. 2 3 E, quad. ★ 6 e.]cub. (*même abréviation par la suite*) ★ 10 aequale ★ 16 quad.P. 269. 1 [loco (*Ta.* 50)] ★ 3 quad. ★ 14 ee.]cub. cub. (*deux fois; même abréviation par la suite*) ★ qe.]QG ★ qq.]quad. quadr. (*aussi 19; mais QQ 21, qu. qu. 22, 23, qu. qua. 25*) ★ aequalis]z ★ 19 qe.]QV, cub. (*mais quad. cub. 25*)P. 270. 3 qe.]QG *la 1^{re} fois; qu. cub la seconde et par la suite* ★ qq.]qu. qu. (*aussi 7, mais qua. qua. 10*) ★ 8 hyperbola ★ 10 q.] *L'abréviation ordinaire est désormais qu.; toutefois qua. la 1^{re} fois, 23)* ★ 14 parabole ★ 20 correlatis ★ 23 — | + ★ 27 sive $\frac{B \text{ qu. cu.}}{AQ}$ aequalisP. 271. 1 (*Ta.* 51) ★ 2 aequalis ★ 3 ex]de ★ 3 B, cub. aequali $\frac{B \text{ qu. in } Y}{A \text{ cub.}}$ ★ 7 B qu. qu. ★ Fig. 145. *La courbe HOPN n'est pas tracée et la lettre O n'est pas inscrite.*

P. 272. 7 potestatibus]præstantibus ★ 9 ignotarum]ignoratum ★ 15 FC]FG ★ 22 statum ★ 23 applicato ★ 28 B, quad. — A qu. æquale E, quad. ★ 30 cùm ★ 32 ad basim HN, sive ad D applicatis est intercalé 31 après applicata

P. 273. 1 ad B applicata est rejeté² après æqualia ★ dato]curvo ★ 5]erunt (*Fla*, 52) ★ 9 cùm (*aussi* 17, 23) ★ U]V (*de même ensuite*) ★ 17 autem] ergo ★ q:] abréviation : qu, *jei* et 23, *la seconde fois*, pour *Bq.*, 18, 21 et 23 pour *Eq.*; quad, *ailleurs et par la suite jusqu'à indication contraire*. ★ 21 qq.]quad, quad, (*mais qu, qu, 23*)

P. 274. 3 omnium ★ 7 aquatur]æqualis ★ 11 exsequamur]sequamur ★ 12 B, quad, cub, cub, cub, cub, ★ 14 cùm ★ 3 B, qu. ★ 15 B, quadratum ★ 21]sit (*Fla*, 53) ★ 23 basim]MV ajouté

P. 275. 3 cùm ★ 3 MV]MN

P. 276. 3 qc.]quad, cub, ★ æquale E, cubo ★ 6 q.]désormais l'abréviation est qu., *sans indications contraires*. ★ 7 valore ★ 10 æquale ★ 12 curva AKOGDCH ★ 13 autorem ★ 13 ex]de

P. 277. 1 quarta] ; ★ 3 B, quad, ★ E, quad, ★ 5 E qu, quad, ★ V quad, ★ 10 quadratura ★ priori ★ 20 ex]de ★ 24 B qui]in E, qu. — E qu, qu. (*Fla*, 54) ★ 30 E, quad, quad,

P. 278. 1 abs ★ 12 B, qu, cub, in V, quad, ★ 19 inter]in ★ 25 hyperbole

P. 279. 2 quad, cubi ★ 3 proxim ★ 4 tam quam ★ praecedentes ★ 6 curvæ]enra ★ 9 A, quad, ★ B, qua, ★ 14 O quad, (*aussi* 20) ★ 17 B, qu, qu, ★ A, Qu, ★ 26 B, q, qu, ★ V, quad ★ 27 B, quad, ★ 28 Uq.]A, quad,

P. 280. 4 idque]id que ★ 6]Hac (*Fla*, 55) ★ 9 ADB]A, B, C, ★ 11 ipsi in]ipsi sic ★ 24 B, quad,

P. 281. 7 cùm (*aussi* 23) ★ 22 E cub,]cubo (*Fla*, 56)

P. 282. 4 et 6 V, quad, ★ 6 E, q, ★ 7 omnes E quadrati ★ 10 E, quad, ★ 12 Y, quad, ★ 13 cùm ★ omnes E, qu, ★ 15 cùm ★ 24 synthesim ★ 27 expatiandum

P. 283. 3 cùm ★ 4 omnes B in A ★ 5 omnes ★ 6 et 13 Oq, ★ 7 æquatio]equ, ★ 8 E, q, ★ 10 omnes O quadrati ★ 13 V, quad, ★ 14 tertia]quarta ★ 18 Y, quadrato

P. 284. 2 et 9 quad, ★ 3 et omnis, ★ 5 quarta]quinta ★ omnes V quadr, ★ 6 illo ★ 10 quinta]sexta ★ Y]1 ★ 16 aqua]le (*Fla*, 57) ★ 17 sexta]septima ★ 20 I, quadratum ★ 21 septima]octava

P. 285. 4 Aq, ★ Bq, in Oq, ★ 3 A: qu, ★ octava]nona ★ 7 cùm ★ 11 V quad, ★ 12 nonam]decimam ★ 18 novem]decem

FRAGMENT SUR LA CISSOÏDE.

[Leçons de M. Ch. Henry (*Pierre de Carcagy*, pages 38-40).]

P. 285. 21 yssois ★ 22 perpendicularus ★ 23 yssoidis ★ 24 yssode ★ asympto

P. 286. 7 yssodi ★ 10 M et D]MBD ★ 13 yssoidale ★ 17 KI]KL

P. 287. Lyssoidem ⋆ applicatis ⋆ ex [de] ⋆ 2 yssoidis ⋆ 4 III|LH ⋆ 7/8 ad sum-
mam rectarum III, HV, ita recta NO *repete*. ⋆ 8, 10, 12, 23, 26, 28 VO|NO ⋆ 13 yssoidis
⋆ 19 recta ⋆ 22 cum ⋆ HG|HC ⋆ 23 eandem

P. 288. 1, 4, 8 NO|VO ⋆ 3 omia ⋆ 11 yssoidale

OBSERVATIONS SUR DIOPHANTE.

(Legons de l'édition de Samuel Fermat; 1670; cf. S.)

On a reproduit en caractères plus petits les textes de Bachet (traduction ou commen-
taires), auxquels se rapportent les observations de Fermat. Les leçons de Bachet sont don-
nées d'après l'édition de Diophante par Bachet, (62) = Ba.

Le numérotage des observations de Fermat et les renvois entre parenthèses sont
ajoutés.

Dans le Diophante de Samuel Fermat, les notes de son père sont imprimées en italique,
et précédées chaîne de la mention : OBSERVATIO D. P. F. (DOMINI PETRI DE FERMAT
pour II). — Les indications de pagination (S avec le n°) ne se rapportent qu'au texte de
Fermat.

P. 291. 4 equibuseunque ⋆ cùm ⋆ 17 duas[duos] ⋆ 22 duos *Ba, om. S.*

P. 292. 2 lib. 4. ⋆ 8 et 17 quatuor[4] ⋆ 10 36[3] ⋆ 16 31^{am}]tertiam ⋆ 23 Extat
⋆ V[quinto] ⋆ 23 5[quinta]

P. 293. 1 tres[3]. ⋆ 2 corundem ⋆ 7 Primus[1]. ⋆ Secundus[2]. ⋆ Tertius[3].
⋆ 8 Diophantaeum ⋆ 11 quatuor[4] ⋆ 13 5^{am}]5 ⋆ lib. 5. ⋆ 19 (S. 19) ⋆ 22 VI[sexti]

P. 294. 2 ter[3]. ⋆ quater[4] ⋆ 7] etiam (S. 198) ⋆ 13 v. g.

P. 295. 1 loco[loci] ⋆ v. g. ⋆ 12 quoteunque

P. 296. 3 datuſ[ductuſ] ⋆ 7 et *omis.* ⋆ 18 tres[3]. ⋆ 18/19 qui nempe unitate *su-*
perant quaternarium *entre parenthèsēv.* ⋆ 19 v. g. ⋆ 25/26 nempe quaternarium unitate
superantes *entre parenthèsēv.* ⋆ 27 productus.

P. 297. 1 tres[3]. ⋆ 11 v. g. ⋆ 19 preseribitur

P. 298. 7 cùm ⋆ 17] differentiam (S. 134)

P. 299. 10 iterationem]operationem

P. 300. 6 sequentis ⋆ 13 duo quadratoquadrata ⋆ 16 quadratoquadrata

P. 301. 3 operationem]aequationem ⋆ 10 multiplus ⋆ 22 V. G.

P. 302. 2 cùndem ⋆ 4 quatuor[4] ⋆ 12 superiori ⋆ 23 v. g.

P. 303. 4 $\frac{7}{5} \frac{15}{18} \frac{5}{18} \frac{5}{18}$ ⋆ 6 vigesima[secundae] ⋆ 8 cùm ⋆ 13 v. g. ⋆ 17] condi-
tione (S. 162) ⋆ 23 VI[6].

P. 305. 14 esse (S. 181) ⋆ 16 poligonis

P. 306. 3 utenque ⋆ 5/6 v. g. ⋆ 8 tertia[3]. ⋆ 13 cùm

P. 307. 1 et 2 v. g. ⋆ 13/14 confiant]constituant (*à corriger*) ⋆ 16 et 19 cùm

- P. 308. 3 et 7 cùm \star 17 6|N - 3 (S. 930) \star 20 cùm \star 28 quatuor| \ddagger \star producitur (*corrigez*)
- P. 309. 1 24. \star 2 lib. 6. \star 4 lib. 31. \star cùm \star 14 quatuor| \ddagger
- P. 310. 1 v. g. \star 18 hypothet. \star 20 perpendic. \star 21 eundem \star quatuor| \ddagger
- P. 311. 2 Diophantaeos
- P. 312. 9 31. quastione lib. 4.
- P. 313. 7 possunt S \star 13 cùm \star 24 Veruntamen
- P. 314. 1 et 24 cùm \star 8 quau[quà] \star 13 eundem \star 13 authore \star 30 quadruplicat[quadrati] \star unitate| \ddagger
- P. 315. 3| Deinde (S. 933) \star 13 quarto| \ddagger
- P. 316. 29 Diophantaeam
- P. 317. 2 v. g. \star 12 duntaxat \star 17 cùm \star 23 Diophantaeis
- P. 318. 1 IV| \ddagger . \star 2 feliciter \star 19 eundem
- P. 319. 3 (0 *Fatic.*) est la leçon indiquée dans le commentaire de *Ba*. \star 4 *Les mots entre parenthèses sont tirés de la marge de S et déduits du commentaire de Ba*. \star 13 productum
- P. 320. 14| primum (S. 950) \star 22 v. g.
- P. 321. 4 quadrupla \star 24 $\frac{64}{798}$ S
- P. 322. 4 οὐσιῶς *Ba* \star 27 τιττεψθων *Ba* \star 33 productum
- P. 323. 3 vere|vero
- P. 324. 1 (S. 252) \star 9 cùm \star 13 A. quadratum (*première fois*) \star 16 D. C. = B bis C.
19. 23 et 25 minus|+ \star 20 minus omis.
- P. 325. 1 + 9C} = 1C \star 6|N plus|A \star excessus
- P. 326. 12 9|25 (aussi 14. 13) \star 13 = |+ \star 14 et 15 6|10 \star 18 propositis \star 23 cùm
- P. 327. 2/3 vigesimam quartam libri sexti. \star 18 quadratoquadrata
- P. 328. 3 Diophantae. \star 16 et 22 cùm
- P. 329. 3 v. g.
- P. 330. 4 quæsus triangulus S. lisez quæsum triangulum \star 14 (S. 291) \star quatuor| \ddagger .
- P. 331. 3 triang. rectang.
- P. 332. 7 Diophantæo. \star 10 et 14 eundem \star 17 cùm
- P. 334. 4 supetunt \star 20 τριπλασιοῦσι

- P. 335. 2 v. g. ★ 13 numerus ★ 14 accedunt ★ 18 lib. 5.
- P. 336. 11 Formatus
- P. 337. 1 a (*première fois*) omis. ★ 6 39] 29.
- P. 338. 14 vigesimam quartam ★ 13 sexti ★ 18 exceptu
- P. 339. 3 Diophanteam ★ 8 utrinque
- P. 340. 7] laboriosā (N. 339) ★ 11 quadratos] quadrata
- P. 341. 23 multati
- P. 342. 1 et 2 multati
-

ERRATA^(*).

- Page 86, ligne 4 : Supprimer la virgule après RD.
- 109 " 9 : Mettre point-virgule après *bis*.
- 154 " 8 : La lettre O devrait être en italique.
- 167 " 4 de la note 2. — Au lieu de *20 avril*, lire *26 avril*.
- 211 " 5 de la note 2. — La découverte de Neil a été publiée par Wallis dès 1659, dans la seconde Partie du Volumo intitulé : *Johannis Wallisi S. S. Th. D., Geometriae Professoris Saciliani Oxonie. Tractatus duo. Prior de Cycloide et corporibus inde genitis. Posterior epistolaris, in quo agitur de cissoidae et corporibus inde gentis et de curvarum tum linearum εθησεων, tum superficierum πλατωσηον. Oxonie. typis Academicis Lichfeldianis. Ann. Dom. 1659. LIX.* — Cette seconde partie est d'ailleurs une réponse à une lettre d'Huygens du 9 juin 1659 et, lorsqu'il l'écrivit, Wallis avait déjà pris connaissance de l'édition latine de la *Géométrie* de Descartes par Schooten.
- 218 " 17, mettre une virgule après *ducatur*.
- 316 " 4, mettre une virgule après *ωτῶν*.
- 338 " 2 de la note 2 en remontant. Au lieu de *débit*, lire *dedit*.
- 377 " 10. Au lieu de *Pyrhonianum*, lire *Pyrhoniūm*.
- 388, note 1. Vérification faite, la pièce du Ms. fr. n. a. 3280 est l'original. L'adresse en est : *Clarissimo viro Petro Danieli Huetio Petrus Fermat S. T.*

(*) Consulter les *Variantes* qui précèdent, notamment pour les pages 70 à 76, la découverte des signaux ayant été postérieure à l'impression.



TABLE DE CONCORDANCE
ENTRE L'ÉDITION DES ŒUVRES DE FERMAT DE 1679
ET LA PRÉSENTE EDITION.

Folio	Pagination de l'édition de 1679.	Renvois à la présente édition (*).	Pages
1 non numéroté.	TITRE.....		IV
2	CELSISSIMO S. R. I. PRINCIPI FERDINANDO ETG.....		350
3 recto.	De celsissimo principe etc.....		352
3 verso, ligne 1.	De principiis ejusdem etc.....		353
3 verso, ligne 13.	De eodem principe etc.....		354
4	(Préface) : ERUDITO LECTORI.....		355
5 recto.	Éloge de Monsieur de Fermat etc.....		359
5 verso, ligne 8.	Observation de Monsieur de Fermat sur Synésius etc.		362
6 recto, ligne 25.	Lettre de Monsieur Descartes à Monsieur de Fermat. p. 347, tom. 3 des Lettres de Monsieur Descartes.		XXXII
6 verso.	P. Herigonius, tom. 6. Cursus Mathematici p. 68. <i>De Marinis et Minimis</i>		171
6 verso, ligne 8.	D. Ismael Bullialdus Exercitatione de Porismatibus.		77
6 verso, ligne 28.	R. P. Mersennus Ordinis Minimorum, Reflexionum Physico-mathematicarum pag. 215	Avertissement, / p. x, note i.	
6 verso, ligne 34.	Samuel Sorberius in præfatione operum Gassendi..		LXII note.
Pages			
1 <i>Varia Opera Mathematica D. Petri de Fermat Senatoris Tolosani.</i>			
9	Ad locos planos et solidos Isagoge.....		90
12	Appendix ad Isagogem topicam etc.....		103
	Apollonii Pergei Libri duo de Locis planis restituti .		3

(*) Les chiffres modernes indiquent les pages du présent Volume; les chiffres romains en grandes capitales les numéros des pièces de la Correspondance qui seront publiées dans les Volumes suivants.

Pagination de l'édition de 1679.		Références à la présente édition. — Pages
28	Apollonii Pergai Propositiones de Lociis planis restituta. Liber II.	29
44	De aequationum localium transmutatione etc.	255
58	Novus secundarum et ulterioris ordinis radicum etc.	181
60	Appendix ad superiorem methodum	184
63	Methodus ad disquirendam maximam et minimam.	133
63 1, 3 en rem.	De tangentibus linearum curvarum.	134
65	Centrum gravitatis, parabolici conoidis, ex eadem me- thodo.	136
66	Ad eandem methodum. — Volo etc.	149
69	Ad eandem methodum. — Doctrinam etc.	158
70	De contactibus sphæricis.	59
89	De linearum curvarum cum lineis rectis etc.	211
104	Appendix ad dissertationem de linearum etc.	338
111	De solutione problematum etc.	148
116	Porismatum Euclidea ornatum renovata doctrina etc.	76
121	<i>Lettres de Monsieur de Fermat, avec quelques-unes de celles qui lui ont été écrites par plusieurs personnes de grand savoir sur divers sujets de Mathématiques ou de Physique</i>	xx
	Lettre de M. de Fermat au R. Père Mersenne Minime. Du 3 juin 1636.	III
122	Au R. P. Mersenne Minime. Du 24 juin 1636.	IV
123	Au R. P. Mersenne Minime. Du 2 septembre 1636.	X
124	Lettre de Messieurs de Pascal et de Roberval à M. de Fermat. A Paris, le 16 aoust 1636.	VIII
130	Lettre de M. de Fermat à Messieurs de Pascal et de Ro- berval. Du 23 aoust 1636.	IX
133	A Monsieur de Roberval Professeur aux Mathématiques à Paris.	VII
134	A Monsieur de Roberval Professeur aux Mathématiques à Paris. Du 16 septembre 1636.	XI
136	A Monsieur de Roberval Professeur aux Mathématiques à Paris. Du 22 septembre 1636.	XIII
138	Lettre de Monsieur de Roberval à Monsieur de Fermat. Du 11 octobre 1636.	XIV
141	Objecta a D. de Fermat, adversus propositionem Mecha- nicanam D. de Roberval.	XVI
142	Nova in Mechanicis Theorematu D. de Fermat.	V et VI

Pagination de l'édition de 1679. —		Révois à la présente édition. — N°
Pages		
13	Propositio Geostatica D. de Fermat.....	II
16	Propositio D. de Fermat circa parabolam.....	84
15	Lettre de M. de Fermat au R. Père Mersenne de l'Ordre des Minimes.....	VI
16	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Roberval à Paris. Du 4 novembre 1636.....	XV
17	A Monsieur de Roberval. Du 7 décembre 1636.....	XVII
18	A Monsieur de Roberval à Paris. Du 16 décembre 1636.	XVIII
19	A Monsieur de Roberval.....	XIX
20	Lettre de Monsieur de Roberval à Monsieur de Fermat. Du 4 avril 1637.....	XX
23	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Roberval à Paris. Du 26 avril 1637.....	XXI
24	Lettre de Monsieur de Roberval à Monsieur de Fermat. Du 1 ^{er} juin 1638.....	XXIX
26	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de ****.	CXVI
28	Démonstration dont il est parlé dans la lettre précédente.	CXVII
29	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Roberval à Paris.....	NLII
30	A Monsieur de ****. Du 18 octobre 1640.....	NLIV
35	Lettre de Monsieur de Roberval à Monsieur de Fermat. Du 4 aoust 1640	XLI
36	Lettre de Monsieur de Frenicle à Monsieur de Fermat. Du 2 aoust 1641	NLIX
39	Lettre de M. de Frenicle à M. de Fermat. Du 6 septembre 1641.....	I
43	Lettre de M. de Fermat au Révérend Père Mersenne de l'Ordre des Minimes. A Paris.....	XXXVIII
46	Lettre de Monsieur de Fermat au Révérend Père Mersenne de l'Ordre des Minimes. A Paris.....	XI.
48, 1, 3	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Carcavi Conseiller au Grand Conseil. A Paris.....	LIII
48, 1, 4 en rem.	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Carcavi Conseiller au Grand Conseil. A Paris.....	LXI
49	Lettre de Monsieur Pascal à Monsieur de Fermat. Le 29 juillet 1654.....	LXX
83	Table dont il est fait mention dans la Lettre précédente.	LXXA
84	Lettre de Monsieur Pascal à Monsieur de Fermat. Du 24 aoust 1654.....	LXXII

L'agitation de l'édition de 1670.		Révoirs à la présente édition. — N°
P. 1.		
188	Lettre de Monsieur Pascal à Monsieur de Fermat. Du 27 octobre 1654.....	LXXV
188	Problematum propositum à D. de Fermat.....	LXXIX
189	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur le Chevalier Kenelme Digby. Du 20 avril 1657.....	LXXXII
190	Problema propositum à D. de Fermat.....	LXXXI
191	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur le Chevalier Kenelme Digby. Du 20 juin 1657.....	LXXXIII
191	Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur le Chevalier Kenelme Digby. Du 15 aoust 1657.....	LXXXIV
193	Remarques de M. de Fermat sur l'Arithmétique des Infinis de Monsieur Wallis Professeur de Géométrie en Angleterre dans l'Université d'Oxford.....	LXXXV
196	Lettre de Monsieur le Chevalier Digby à M. de Fermat. Du 5 décembre 1657.....	LXXXVII
197	Lettre de Monsieur le Chevalier Digby à M. de Fermat. Du 12 décembre 1657.....	LXXXVIII
197	Lettre de Monsieur le Chevalier Digby à M. de Fermat. Du 13 février 1658.....	LXXXIX
198	Lettera del Signor Digby al Signor di Fermat. Di 15 maggio 1658.....	XCI
200	Lettre de Monsieur Pascal à M. de Fermat. De Biennassis le 10 aoust 1660.....	CVII
201	Viro Clarissimo Dom. Gassendo Petrus de Fermat. S. P. De proportione quā gravia decidentia accelerantur....	LXII
204	Lettre de Monsieur Gassendi à Monsieur de ***.....	LXII _a
205	Lettera del Signor Benedetto Castelli Abbate di Verona, al Signor di ***	V _a
205	Viro Clarissimo Dom. de Ranechin, sen. Thol. Petrus de Fermat S. P.....	366
208	Viro Clarissimo D. de Pellisson, Libellorum supplicium magistro. Samuel de Fermat, S. P.....	373
après 210. 2 Fol. non numérotés	Cede Deo seu Christus moriens. D. Petri de Fermat Carmen amoebaeum ad. D. Balzaeum	390
	Cinq planches de figures géométriques.	

FIN DU TOME PREMIER.

Saway, W. George
professeur à Queen's college
24 March, 1891.
gol

ŒUVRES DE FERMAT

PUBLIÉES PAR LES SOINS DE

MM. PAUL TANNERY ET CHARLES HENRY

SOUZ LES AUSPICES

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

TOME PREMIER.

ŒUVRES MATHÉMATIQUES DIVERSES. — OBSERVATIONS SUR DIOPHANTE.



PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES
DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,
Quai des Grands-Augustins, 55.

M DCCC XCI



